



FLORAI SON HIVERNALE
DE L'APONOGETON DISTACHYUS L.f.
EN CHARENTE MARITIME

Famille : Aponogétonacées par M. SANDRAS

Dans un petit étang, jamais asséché, au lieu-dit Pimbert, sur la commune d'Athenac (canton d'Archiac), prospère une importante colonie d'Aponogeton distachyus L.F. Cette espèce indigène en Afrique australe, est assez souvent cultivée comme plante d'ornement aquatique, et se naturalise parfois dans le midi méditerranéen, le Sud ouest et l'Ouest de la France.

La plante a envahi totalement le petit plan d'eau, et au moment de la floraison estivale, dégage une odeur douceâtre qui rayonne à quelques dizaines de mètres.

Trompée par l'hiver peu rigoureux ou en veine d'expérience, la plante a fleuri cette année en février, époque à laquelle j'ai pu observer une centaine d'épis floraux. Le propriétaire de l'étang m'a affirmé que cette floraison hivernale est tout à fait inhabituelle.

UNE LOCALITE
D'ADIANTUM CAPILLUS VENERIS L.

NOUVELLE pour la CHARENTE MARITIME

Famille : Ptéridacées par M. SANDRAS

L'école communale d'Archiac, au centre du bourg, présente un puits très ombragé fermé par du grillage. Ce puits s'orne d'une couronne d'Adiantum Capillus Veneris L. et de Scolopendrium vulgare Sm.

L'Adiantum s'étage de 0,75 m à partir de la margelle jusqu'à une profondeur de deux mètres, le Scolopendrium descend bien plus bas, jusqu'à six mètres environ.

La station d'Archiac se situe à égale distance des localités de Pons (Charente-maritime), où la plante n'a pas été revue récemment, et de Châteauneuf (Charente).