

COMPTES - RENDUS

DES EXCURSIONS MYCOLOGIQUES

Les sorties mycologiques 1973 furent effectuées, pour la plupart, en commun avec les Membres de la Société des Sciences Naturelles de la Charente Maritime comme les années passées et les Naturalistes Niortais se joignirent à nous pour celle de la Forêt de l'Hermitain.

Ces sorties furent suivies par de très nombreux mycologues et mycophages en particulier celle de l'Ile d'Oléron qui connaît toujours beaucoup de succès.

Le beau temps fut presque toujours de la partie sauf pour l'excursion du Bois des Héros près de Saint-Porchaire qui fut très copieusement arrosée.

Les récoltes se révélèrent remarquables en quantité et en variété: certains champignons furent récoltés pour la première fois et d'autres, très rares les années passées, se montrèrent abondants cet automne.

Dimanche 5 Novembre 1972

EXCURSION MYCOLOGIQUE EN FORÊT DE LA PALLIÈRE (LE CLAPET)

ET EN FORÊT DE LA COURBE (près D.25 et D.268) Sect. N.E.

La promenade du matin dans les parages du carrefour du Clapet permit de retrouver la plupart des espèces déjà citées dans ces stations, notamment dans les genres: *Russula*, *Psalliota*, *Gymnopilus*, *Hebeloma*, *Hygrophoropsis*, *Clitocybe*, *Laccaria*, *Panellus*, *Gomphidius*, *Boletus* et *Tricholoma*. Par contre les genres: *Collybia*, *Lactarius*, *Amanita*, *Rhodophyllus* et *Marasmius* étaient peu représentés en nombre et en espèces.

Quelques découvertes intéressantes peuvent être mentionnées: *Lepiota brunneoincarnata*, *Galera mycenopsis*, *Inocybe dulcamara*, *Marasmius androsaceus*, *Hyena capillaries* et *rubromarginata* (déjà notés à Oléron), *Leptoglossum muscigenum*, *Pleurotus columbinus*, *Geopetalum Rickenii* et *Clitocybe brumalis*.

Certaines de ces espèces sont rares ou peu communes et plusieurs d'entre elles vues pour la première fois par le Dr Bouchet.

Le signe " placé après le nom d'espèce signifie: espèce vue seulement au Clapet. Le signe " placé dans les mêmes conditions signifie: espèce vue dans le secteur N.E. des D.25 et D.268, sans que l'on puisse encore en tirer de conclusions.

Les espèces suivantes ont été récoltées: (1)

Lactarius - deliciosus, hepaticus Plowright
Russula - fragilis, torulosa, erythropoda (var. de xerampelina) laricina
velenovsky (= cessans Pearson)
Amanita - gemmata"
Psalliota - silvatica (ss. lato.), purpurascens, semota"
Lepiota - mastoidea", excoriata" (dans un pré), brunneoincarnata"
Cystoderma amianthinum
Coprinus - comatus", atramentarius"
Dryophila carbonaria
Gymnopilus - penetrans, sapineus, spectabilis
Galera - hypnorum, marginata, mycenopsis"
Cortinarius - mucosus, elator, orichalceus", semisanguineus, cinnamomeus,
azureus", anomalus, subbalaustinus, acutus", striatulus", obtusus
Hebeloma - mesophaeum, crustuliniforme
Inocybe - dulcamara", geophilla, (var. lilacina), scabella, caesariata
Rhodophyllus cetratus"
Rhodopaxillus nudus"
Tricholoma - sulfureum, equestre, focale, terreum, saponaceum"
Lyophyllum infumatum
Hygrophoropsis aurantiaca
Clitocybe - inversa, nebularis", phyllophila", brumalis, vibecina, dicolor
Laccaria - laccata, amethystina
Collybia - maculata", butyracea
Marasmius - androsaceus", dryophilus
Mycena - pura, Seynii, capillaripes", rubromarginata", vulgaris
Leptoglossum - muscigenum"
Pleurotus - ostreatus", colombinus"
Geopetalum Rickenii"
Hygrophorus - agathosmus", conicus"
Paxillus - involutus, atrotomentosus
Gomphidius - viscidus, roseus"
Boletus - bovinus, granulatus, littoralis
Leptoporus - albidus"
Phaeolus Schweinitzii"
Calodon - ferrugineum, nigrum
Phylacteria terrestris"
Lycoperdon perlatum
Calocera viscosa"
Helvella - sulcata, lacunosa"
Sepultaria - arenosa"

La promenade de l'après-midi n'a pas fait apparaître autant d'espèces que celle du matin. La forêt autour du Clapet est composée de bois mêlés, alors que celle qui avoisine les routes D 25 - D 268 est essentiellement constituée de conifères. C'est dans le même endroit que furent effectuées les recherches en novembre 1970; il serait intéressant de comparer maintenant les récoltes.

J. Dromer.

(1) Nomenclature Kühner et Romagnési: Flore analytique des champignons supérieurs.

7 Octobre 1973

Forêt de MERVENT (Vendée)

On peut noter la relative pauvreté de la mycoflore, due à la sécheresse mais un début de poussée et le nombre de collecteurs arrivent à composer un tableau honorable. Pas de raretés mais des espèces intéressantes notées: "...."

Boletus: "cramesus" (1) "piperatus" - aereus - edulis - leucophaeus - chrysenteron
- versicolor - erythropus - badius - luteus - granulatus - bovinus - aurantiacus.

Paxillus: - involutus - atromentosus.

Lactarius: - deliciosus - quietus - camphoratus - uvidus - controversus.

Russula :- cyanoxantha - grisea - amoena - graveolens - fusca - lutea -
- silvestris - pectinatoides - "livescens" - "decipiens".

"Rhodophyllus icterinus" (legit Frouin junior)

"Auriscalpium vulgare". (legit Dr Frouin)

Cortinarius : - elator - mucifluus - alboviolaceus - purpurascens - "vibratilis"

Inocybe : - fastigiata - lilacina - "lanuginosa".

Clitocybe : - infundibuliformis - tabescens - viridis.

Collybia : - platyphylla - maculata - distorta - fusipes.

Mycena : - galericulata - polygramma - sanguinolenta - seynii - galopus -
pura rosea.

Marasmius :- dryophilus - peronatus - bulliardi - rotula - candidus - ramealis.
erythropus

Amanita :- "porphyria" (abondante) - muscaria var formosa - citrina et sa variété
alba - pantherina - rubescens - fulva.

Pluteus cervinus.

Lepiota : - procera - clypeolaria - cristata.

"Psalliota semota".

Tricholoma : - pseudo album - sulfureum.

Hypholoma : - fasciculare - sublateritium

Drosophila hydrophilum - Peziza aurantiaca

Leptorus : - caesius - albidus.

Heteroporus biennis - Hydnum repandum - Lenzites tricolor.

Scleroderma vulgare - Hygrophoropsis aurantiaca

Dr C. Kerhoas.

(1) legit Melle Roy

Vendredi 12 Octobre 1973

et

Dimanche 14 Octobre 1973

Bois des Héros

à l'Est de Saint Porchaire (17)

(d'Ouest en Est)

Le vendredi 12 octobre 1973 (première visite)

J'ai effectué cette promenade dans le Bois des Héros à partir de la D-237 E.3, en marchant vers l'est et en restant au nord des lignes à haute tension.

Venant peu après les pluies du début du mois, la poussée fongique était sans doute à son maximum et les champignons se trouvaient en bon état de végétation; cependant les russules étaient peu nombreuses et déjà vieilles et finissantes, les bolets se faisaient rares. Le genre cortinaire par contre était remarquablement représenté en cette mi-octobre: certaines espèces, rares ou peu communes d'ordinaire, poussaient presque en abondance. Parmi les plus remarquables, se trouvaient: Cortinarius turmalis, prasinus, violaceus, cotoneus, decoloratus et Bulliardii. Les stations de Cortinarius turmalis, decoloratus et cotoneus sont situées sur la pente boisée au dessus de la D. 237 E.3, près de la route et de ligne électrique, au milieu de Hebeloma sinapizans. J'ai récolté les Cortinarius violaceus et prasinus loin à l'intérieur du bois. Cortinarius Bulliardii pousse au milieu du bois sur les pentes inclinées vers l'est d'un vallon humide.

Au sommet de la pente qui permet de rejoindre le plateau intérieur, se trouve une clairière isolée et de peu d'étendue. Près de sa bordure ouest et entre des stations de Clitocybe odora, j'ai pu récolter Drosophila pyrrhotricha, bien reconnaissable à son mamelon fibrilleux roux-orangé, et Drosophila spadiceogrisea. Dans le même secteur, j'ai récolté un exemplaire unique de Rhodophyllus eximius qui, vu du dessus, ressemble étrangement à un Inocybe par son chapeau conique et pointu et, près de là, un Hygrophorus leucophaeus. Cette partie du bois est éloignée d'environ 500m de la D 237 E 3: elle présente un intérêt certain.

Au delà du chemin Nord-Sud qui traverse le plateau, se trouve le vallon humide riche en Cortinaires de toutes espèces et qui est le lieu d'élection de Clavaria bostrytes, de Cantharellus cornucopioides et sinuosus.

Le 14 octobre 1973 (Sortie publique)

Venant de la D.127, j'ai retrouvé ce même vallon; sur la pente descendante vers l'Ouest (côté Est du vallon) existe une station de Tricholoma columbetta, et très curieusement, juste en face, sur le côté Ouest, une station d'Hygrophorus virgineus dont la blancheur leur est presque égale, si bien que vus au sol, il n'est pas possible de les reconnaître au premier coup d'oeil, car les chapeaux sont fendus ou éclatés dans les deux espèces. Je n'ai pas fait la réaction au Chlorostannate d'éthyle, mais il est évident qu'il s'agit bien du "virgineus" ss. Bataille, par les caractères tirés du chapeau qui n'est jamais jaune au disque. Par contre l'examen des lames permet la différenciation immédiate avec le T. columbetta. Les stipes des tricholomes n'étaient pas tous tachés de bleu-vert, ce caractère ne semble pas absolu.

Dans la partie située entre la D 127 et une grande vigne à l'intérieur du bois se trouve une belle station de Psalliota silvicola. Dans la même zone, j'ai vu beaucoup de Cort. trivialis et elator, des Inocybe scabella var. minor et une petite station de Marasmius foetidus.

De l'autre côté de la D 127 Mr Charron a découvert un sujet isolé de Cort. phoe-

niceus et sans que je puisse les situer des espèces telles que: Lact. fulvissimus, Cort. mucifluus, Helvella sulcata et surtout Lachnea hemispherica reconnaissable à ses poils très longs dressés au bord de la coupe.

Pour sa part M. Sandras a récolté lui aussi des champignons assez rares ou peu communs: un Plutée du groupe nanus - peut-être le P. rivulosus Romag. un Cortinarius praestans très beau, un Hygrophorus virgineus (petit pour l'espèce) et plusieurs Hygro. russula.

Liste des champignons récoltés (1)

les 12 et 14 octobre 1973

<u>Lactarius</u>	- <u>vellereus</u> , <u>flavidus</u> , <u>uvidus</u> , <u>quietus</u> , <u>fulvissimus</u> , <u>zonarius</u> , <u>chrysorrheus</u> , <u>blennius</u> .
<u>Russula</u>	- <u>nigricans</u> , <u>delica</u> , <u>virescens</u> , <u>cyanoxantha</u> , <u>lutea</u> , <u>aurata</u> .
<u>Amanita</u>	- <u>vaginata</u> , <u>rubescens</u> , <u>citrina</u> , <u>pantherina</u> , <u>phalloides</u> .
<u>Pluteus</u>	- <u>cervinus</u> .
<u>Psalliota</u>	- <u>silvicola</u> .
<u>Lepiota</u>	- <u>mastoidea</u> , <u>clypeolaria</u> , <u>cristata</u> .
<u>Drosophila</u>	- <u>hydrophila</u> , <u>velutina</u> , <u>pyrrhotricha</u> , <u>spadiceogrisea</u> .
<u>Cortinarius</u>	- <u>trivialis</u> , <u>elator</u> , <u>mucifluus</u> , <u>infractus</u> , <u>cephalixus</u> , <u>praestans</u> , <u>nemorensis</u> , <u>turmalis</u> , <u>purpurascens</u> , <u>calochrous</u> , <u>prasinus</u> , <u>multiformis</u> , <u>cotoneus</u> , <u>phoeniceus</u> , <u>violaceus</u> , <u>alboviolaceus</u> , <u>anomalus</u> , <u>decoloratus</u> , <u>bulliardii</u> , <u>torvus</u> .
<u>Hebeloma</u>	- <u>radicosum</u> , <u>sacchariolens</u> , <u>sinapizans</u> , <u>crustuliforme</u> .
<u>Naucoria</u>	- <u>conspersa</u> , <u>pellucida</u> .
<u>Inocybe</u>	- <u>scabellata</u> var. <u>minor</u> .
<u>Rhodophyllus</u>	- <u>lividus</u> , <u>nidorosus</u> , <u>eximius</u> .
<u>Clitopilus</u>	- <u>prunulus</u> .
<u>Tricholoma</u>	- <u>sulfureum</u> , <u>acerbum</u> , <u>album</u> , <u>columbetta</u> , <u>ustaloides</u> , <u>saponaceum</u> .
<u>Cantharellus</u>	- <u>cornucopioides</u> , <u>sinuosus</u> .
<u>Clitocybe</u>	- <u>odora</u> , <u>infundibuliformis</u> .
<u>Collybia</u>	- <u>platyphylla</u> , <u>radicata</u> .
<u>Marasmius</u>	- <u>rotula</u> , <u>ramealis</u> , <u>foetidus</u> , <u>peronatus</u> , <u>confluens</u> , <u>dryophilus</u> .
<u>Mycena</u>	- <u>galopoda</u> , <u>sanguinolenta</u> , <u>pura</u> , <u>pelianthina</u> , <u>galericulata</u> .
<u>Omphalia</u>	- <u>fibula</u> .
<u>Crepidotus</u>	- <u>variabilis</u> .
<u>Hygrophorus</u>	- <u>virgineus</u> , <u>russula</u> , <u>leucophaeus</u> , <u>cossus</u> .
<u>Paxillus</u>	- <u>involutus</u> .
<u>Boletus</u>	- <u>Queletii</u> , <u>aurantiacus</u> , <u>leucophaeus</u> .
<u>Leptoporus</u>	- <u>caesius</u> .
<u>Lenzites</u>	- <u>tricolor</u> .
<u>Hydnum</u>	- <u>repandum</u> , <u>rufescens</u> .
<u>Calodon</u>	- <u>ferrugineum</u> , <u>graveolens</u> .

Stereum - hirsutum
Clavaria - botrytes , stricta , cristata
Lycoperdon - perlatus
Helvela - sulcata
Lachnea - hemispherica

J. Dromer

(1) Nomenclature Kühner et Romagnési : Flore analytique des champignons supérieurs.

:-:-:-:-:-

Note complémentaire

Messieurs Bernier Jacques et Couvertier ont pu identifier un nombre important de Cortinaires: mucifluus, elator, trivialis, infractus, salor, causticus, odoratus, prasinus, cyanopus, arcuatorum, multiformis, elegantissimus, largus, praestans, violaceus, Bulliardii, bolaris, albo-olivaceus, torvus.

Presque toutes ces espèces ont été notées par ailleurs par M. Dromer.

Monsieur Redon a récolté une amanite peu commune: Amanita echinocephala et surtout un très bel exemplaire du rare Boletus leoninus caractérisé par sa couleur de lion et son odeur très particulière.

L'Hygrophorus russula a été découvert en bordure de la D 237 E3, trois cents mètres environ avant la ligne à haute tension en venant de Port d'Envaux, sur la droite. Une vingtaine de carpophores ont pu être recueillis sur une légère pente sous les charmes. H. Romagnési l'indique habitant les hêtraies. Il ne semble pas commun en Charente Maritime. Sur la même station citons encore Inocybe corydalina.

Enfin sous chênes verts, près de Saint Porchaire lieu de Rendez-vous, a été observé un tout petit Rhodophylle au pied d'un beau vert: Rhodophyllus incanus = R. euchlorus.

M. Sandras

:-:-:-:-:-

EXCURSION MYCOLOGIQUE DU 21 OCTOBRE 1973

(La Mothe St-Heray) (D.S.)

--:--:--:--

Venant à la suite d'une période pluvieuse dont le dernier épisode, un petit crachin matinal, eut la bonne idée de s'arrêter dès le début de la cueillette, cette manifestation s'annonçait sous les meilleurs auspices, et fut en effet un succès, tant par le nombre des participants (près d'une centaine), que par celui des espèces récoltées. Parmi les membres de la Société présents, on notait MM. Daunas, Sandras, Frouin, Barbier, Bonnin, Biget, Baron, etc.....

Le matin, en forêt de l'Hermitain, furent trouvées notamment:

Amanita phalloïdes
 " *vaginata*
 " *livido-pallescent*
 " *citrina*
 " *citrina* var. *alba*
 " *pantherina*
 " *rubescens*
Lepiota procera
 " *acutesquamosa*
 " *clypeolaria*
Pluteus cervinus
Agaricus silvicola
Drosophila hydrophila
Hypholoma fasciculare
 " *sublateritium*
Stropharia aeruginosa
Hebeloma crustuliniforme
 " *radicosum*
Cortinarius elatior
 " *delibutus*
 " *infractus*
 " *multiformis*
 " *violaceus*
 " *alboviolaceus*
Entoloma lividum
 " *nidorosum*
Laccaria laccata
Collybia platyphylla
 " *distorta*
 " *butyracea*
 " *dryophylla*
 " *acervata*
Marasmius peronatus
 " *epiphyllus*
 " *rotula*
 " *ramaelis*
Mycena pura
 " *galericulata*
 " *polygramma*
 " *galopoda*
 " *inclinata*
Rhodopaxillus nudus
Tricholoma rutilans
 " (*Lyophyllum*) *aggregatum*

Clitocybe odora
 " dealbata
 " infundibuliformis

Lepista inversa

Clitocybe nebularis

Lactarius plumbeus

" chrysorheus

" rufus

Russula nigricans

" vesca

" fragilis

" atropurpurea

Hygrophorus cossus

Paxillus involutus

Boletus chrysenteron

" badius

" parasiticus

" duriusculus

" edulis

" erythropus

Polyporus frondosus

Leptoporus betulinus

Fistulina hepatica

Cantharellus cibarius

Lycoperdon gemmatum

" excipuliforme

plus divers cortinaires (largus (?), flexipes (?)), inocybes, mycènes, clitocybes (dicolor (?)), russules (luteotacta (?)) de détermination incertaine.

L'après midi, dans les bois du Fouilloux:

Amanita phalloïdes

" pantherina

Lepiota gracilentia

Agaricus silvicola

Coprinus picaceus

" micaceus

Cortinarius praestans

" splendens

" cyanescens

" armillatus

" hinnuleus

Entoloma lividum

" rhodopolium

Mucidula radicata

Tricholoma sejunctum

" sulfureum

" acerbum

Lectarius pallidus

" fulvissimus

" serifluus

Russula emetica

" aurata

Hygrophorus chrysodon

" olivaceo-albus

" chlorophanus

Boletus elegans
Cantharellus cinereus
Xylaria hypoxylon
et de nombreuses autres espèces, (inocybes, formes
diverses d'Hebeloma, etc.....)

Y. Baron

Note complémentaire:

Sur le chemin du retour un arrêt dans une coupe faite en 72 m'a permis de recueillir plusieurs spécimens de Boletus piperatus sous châtaigniers et bouleaux alors que Maublanc et Blum le signalent sous les pins. Sur le même emplacement fructifiaient avec exubérance Lactarius plumbeus Bul. qui donne une belle réaction violette avec l'ammoniaque et Amanita muscaria.

M. Sandras

Sortie Mycologique à Montendre

1^{er} Novembre 1973

Sortie improvisée avec M^{elle} Fleurenceau, MM. Bourasseau et Chézeau.

Nous ne mentionnons que les espèces les plus intéressantes:

- Amanita gemmata, commune dans cette station.
- Cortinarius concinnus, sous des saules dans la tourbière (probablement synonyme de C. uliginosus décrit par Marcel Bon dans le fascicule 3, année 65, de la Société Mycologique de France). Monsieur Bouchet nous parle par ailleurs de ce rare cortinaire.
- Cortinarius penicillatus, près de la tourbière et Croix-Gente.
- Cortinarius hinnuloïdes, évoque hinnuleus mais odeur de fleur d'oranger très marquée (Croix-Gente).
- Lactarius impolitus, petit lactaire très pâle à forte odeur de noix de coco, sous bouleaux dans la tourbière.
- Boletus felleus.
- Anthurus aseroiformis.

M. Sandras

Dimanche 28 Octobre 1973

Excursion mycologique dans le bois des Alassins

côte Ouest de l'île d'Oléron

Cette très belle journée de fin octobre a favorisé une très large participation à cette excursion qui est toujours bien suivie par les membres de notre Société.

Le bois des Alassins toujours riche en espèces mycologiques propres aux conifères, n'a pas révélé cette année beaucoup de nouveautés. La plupart des espèces communes ont été retrouvées.

On peut citer quelques espèces remarquables, moins communes que d'autres et en tout cinquante huit espèces parmi lesquelles: Lactarius sanguifluus et mitissimus : le lait de "mitissimus" ne jaunit pas du tout, même sur mouchoir blanc après plusieurs heures, contrairement à celui de "fulvissimus" qui jaunit sur mouchoir après un temps prolongé. Notons encore: Amanita solitaria, Psalliota purpurascens, Hebeloma edurum - belle espèce de ce bois - Inocybe caesariata (=carpta) ss Heim (cet inocybe est spécial aux terrains sableux sous les pins), puis Phyllotopsis nidulans - assez rare - et Sarcodon amarescens - vraiment très amer ! et justifiant son nom.

L'excursion de l'après-midi s'est effectuée dans le bois d'Avail - au Nord-Ouest de Vert Bois -. Je n'ai pu participer à ses recherches ni voir les récoltes, mais selon M. Charron le terrain était très sec et n'a fourni qu'un très petit nombre d'espèces dont aucune n'était remarquable.

Il me semble que l'extrémité Sud de l'île d'Oléron qui est entièrement couverte par les pins sur une vaste étendue pourrait elle aussi être visitée ainsi que certains bois sur la route de Saint Pierre. Nous avons peut-être tort de prospecter toujours les mêmes stations, diminuant ainsi nos chances de faire des découvertes !

Liste des Champignons récoltés (1)

<u>Lactarius</u>	<u>deliciosus</u> , <u>sanguifluus</u> , <u>mitissimus</u> , <u>chrysorrhoeus</u>
<u>Russula</u>	<u>delica</u> , <u>amenolens</u> , <u>fragilis</u> , <u>torulosa</u> , <u>laricina</u> (=cessans)
<u>Amanita</u>	<u>muscaria</u> , <u>solitaria</u> , <u>citrina</u> et var. <u>alba</u> , <u>phalloides</u>
<u>Psalliota</u>	<u>silvatica</u> , <u>purpurascens</u>
<u>Cystoderma</u>	<u>amianthinum</u>
<u>Geophila</u>	<u>fascicularis</u>
<u>Cortinarius</u>	<u>elator</u> , <u>infractus</u> , <u>cinnamomeus</u> , <u>semisanguineus</u> , <u>torvus</u>
<u>Hebeloma</u>	<u>sinapizans</u> , <u>sacchariolens</u> , <u>edurum</u>
<u>Inocybe</u>	<u>scabella</u> , <u>caesariata</u>
<u>Rhodopaxillus</u>	<u>nudus</u> , <u>sordidus</u>
<u>Tricholoma</u>	<u>rutilans</u> , <u>sulfureum</u> , <u>equestre</u> , <u>focale</u> , <u>pessundatum</u> , <u>terreum</u>
<u>Lyophyllum</u>	<u>immundum</u>
<u>Clitocybe</u>	<u>mellea</u> , <u>inversa</u> , <u>infundibuliformis</u>
<u>Laccaria</u>	<u>laccata</u>
<u>Collybia</u>	<u>radicata</u> , <u>butyracea</u>
<u>Marasmius</u>	<u>dryophilus</u>

Hygrophorus olivaceoalbus

Gomphidius viscidus

Paxillus panuoides, retromentosus

Boletus bovinus, granulatus, leptopus, chrysenteron

Phaeolus schweinitzii

Sarcodon amarescens

Scleroderma vulgare

Calocera viscosa

J. Dromer

-
- (1) - Pour les champignons supérieurs, nomenclature de Kühner et Romagnesi :
" Flore analytique des champignons supérieurs".
-

Note complémentaire

Sous les chênes à Avail plusieurs participants ont pu récolter, l'après-midi Cortinarius rufoolivaceus Pers. Ce beau cortinaire au chapeau rouge-cuivré, à bulbe taché de rouge et aux lames vert-olive se rencontre sous feuillus sur sol calcaire selon Romagnési. Il s'est manifesté cette année sur plusieurs stations. En dehors de Saint-Trojan je l'ai récolté au Douhet (17) avec Monsieur Bourasseau et à Saint Maigrin (17).

M. Sandras

Voir note à la fin des comptes-rendus sur la sortie mycologique en Forêt de la Coubre du 4 novembre 1973.

Journée Mycologique

aux bois de St Pierre près Poitiers

28 Octobre 1973

Situés à quelques kilomètres au sud-est de Poitiers, les bois de St Pierre ont été achetés par cette ville, et aménagés en Parc de Loisirs. Un "Centre aéré" vient d'y être construit, et une Association de Gestion instituée, au sein de laquelle a été émise l'idée d'une "journée mycologique".

Des contacts ont ainsi été pris par les membres poitevins de l'Association des Professeurs de Biologie-Géologie et de la Société Botanique du Centre-Ouest, et le dimanche 28 novembre a été retenu.

Convié le matin à une exploration du Parc, le public (une trentaine de personnes, dont de nombreux étudiants) fut réparti en deux groupes, animés par MM. Godet et Caillon d'une part, M. Baron et M^{lle} Guiet d'autre part. Un maximum des biotopes si variés de ces bois put ainsi être prospecté en peu de temps.

La récolte, très abondante, devait être exposée l'après-midi dans la "Hutte de la Découverte". Mettant à profit le beau temps, un public très nombreux, à dominante familiale cette fois, y rendit visite, apportant souvent ses propres cueillettes à déterminer, comme un article de presse l'y avait incité.

Avec des appoints extérieurs, initialement prévus pour combler d'éventuelles lacunes, mais qui, étant donné la richesse fongique locale ce jour-là, n'apportèrent que fort peu d'espèces supplémentaires, plus de 120 espèces purent être présentées.

De multiples questions furent posées aux animateurs de permanence, occasions pour ceux-ci d'autant de mises au point, échantillons à l'appui: identification des amanites dangereuses - toutes présentes -, problème des bolets bleuissants, distinction de l'entolome livide vis à vis du clitocybe nébuleux, etc...

Quelque peu improvisée cette année, une telle manifestation pourrait être reconduite et étoffée à l'avenir, par la réalisation de panneaux, une présentation par thèmes, un étalement sur plusieurs jours, d'autant qu'elle trouvera en ce lieu un cadre merveilleusement adapté, en même temps qu'un public habitué.

Sans vouloir donner ici la liste exhaustive des espèces présentées, mentionnons les plus intéressantes ou remarquables:

parmi celles trouvées sur place,

Rhodophyllus madidus
Cortinarius praestans
" phoeniceus
" venetus
" Bulliardii
Hygrophorus coccineus
Boletus cramesinus (= sanguineus)
Leptoporus caesius

parmi celles amenées de l'extérieur,

Amanita solitaria
Russulea sanguinea
Lactarius pallidus
Cortinarius armillatus
Leucocortinarius bulbiger

Y. Baron

Dimanche 4 Novembre 1973

Excursion Mycologique en Forêt de la Palmyre (Le Clapet)
de la Coubre (inters. D 25 - D 268 - secteur Ouest)
et de Saint-Augustin (voisinage de la route -Les Mathes-St. Augustin,
suivant la lisière de la Forêt)

L'année 1973 a été marquée par une forte poussée fongique dans les bois feuillus de notre région, par contre les bois de conifères n'ont pas montré la même richesse. Nos recherches conduites en trois zones éloignées entre elles ont permis de retrouver bon nombre des espèces déjà bien connues dans ces forêts, notamment parmi les lactaires, russules, amanites, cortinaires, hébelomes, tricholomes, gymnopiles, clitocybes, collybies, hygrophores, bolets. Tout au plus, peut-on citer quelques espèces qui n'ont peut-être pas été mentionnées jusqu'ici bien qu'elles ne soient pas rares ni critiques. C'est ainsi qu'il faut noter: Lactarius mitissimus - Amanita inaurata (= strangulata) - Psalliota variegata - Drosophila gracilis - Cortinarius mucifluus et privignoides - Rhodophyllus staurosporus - Clitocybe pityophila - Pleurotus dryinus - Calodon graveolens - Geastrum fimbriatum.

L'ensemble des espèces récoltées se présente comme suit: (1)

<u>Lactarius</u>	<u>deliciosus</u> , " <u>mitissimus</u> ", " <u>hepaticus</u> ", <u>chrysorrheus</u>
<u>Russula</u>	<u>"adusta"</u> , <u>fragilis</u> , <u>sardonia</u> , <u>torulosa</u> , <u>erythropoda</u> , <u>cyanoxantha</u>
<u>Amanita</u>	<u>"inaurata"</u> , <u>vaginata</u> (<u>plumbea</u>), <u>muscaria</u> , <u>gemmata</u> , <u>citrina</u> , <u>phalloides</u>
<u>Volvaria</u>	<u>speciosa</u>
<u>Psalliota</u>	<u>silvicola</u> , " <u>variegata</u> "
<u>Lepiota</u>	<u>procera</u>
<u>Cystoderma</u>	<u>amianthinum</u>
<u>Drosophila</u>	<u>velutina</u> , " <u>gracilis</u> "
<u>Geophila</u>	<u>fascicularis</u>
<u>Gymnopilus</u>	<u>spectabilis</u> , <u>penetrans</u>
<u>Galera</u>	<u>marginata</u>
<u>Cortinarius</u>	<u>mucosus</u> , <u>elatior</u> , " <u>mucifluus</u> ", <u>infractus</u> , " <u>orichalceus</u> ", <u>semisanguineus</u> , <u>anomalus</u> , <u>hinmuleus</u> , <u>torvus</u> , " <u>privignoides</u> ", <u>subferrugineus</u> , <u>subbalaustinus</u>
<u>Hebeloma</u>	<u>sinapizans</u> , <u>crustuliniforme</u> , <u>sacchariolens</u>
<u>Rhodophyllus</u>	<u>"staurosporus"</u>
<u>Rhodopaxillus</u>	<u>nudus</u>
<u>Tricholoma</u>	<u>sulfureum</u> , <u>equestre</u> , <u>focale</u> , <u>pessundatum</u> , <u>terreum</u> , <u>atrosquamosum</u> , <u>saponaceum</u>
<u>Cantharellus</u>	<u>lutescens</u>
<u>Hygrophoropsis</u>	<u>aurantiaca</u>
<u>Clitocybe</u>	<u>mellea</u> , <u>nebularis</u> , <u>inversa</u> , " <u>pityophila</u> ", <u>dicolor</u>
<u>Laccaria</u>	<u>amethystina</u>
<u>Collybia</u>	<u>maculata</u> , <u>butyracea</u>
<u>Geopetalum</u>	<u>geogenium</u>
<u>Pleurotus</u>	<u>"dryinus"</u> , <u>ostreatus</u>
<u>Lentinus</u>	<u>tigrinus</u>
<u>Hygrophorus</u>	<u>olivaceoalbus</u> , <u>eburneus</u> , (var. <u>cossus</u>)
<u>Paxillus</u>	<u>atrotomentosus</u>
<u>Gomphidius</u>	<u>viscidus</u>
<u>Boletus</u>	<u>bovinus</u> , <u>granulatus</u> , <u>littoralis</u>

(1) Nomenclature Kühner et Romagnesi : Flore analytique des champignons supérieurs.

<u>Phaeolus</u>	<u>Schweinitzii</u>
<u>Calodon</u>	<u>"graveolens"</u> , <u>nigrum</u>
<u>Clavaria</u>	<u>stricta</u>
<u>Geastrum</u>	<u>"fimbriatum"</u>
<u>Lycoperdon</u>	<u>umbrinum</u>
<u>Helvella</u>	<u>lacunosa</u>

La présente liste est arrêtée à 79 espèces - tous les champignons examinés ont pu être déterminés. Les espèces les plus remarquables sont notées "....".

J. Dromer

- DE -

Champignons
vus en Forêt de la Coubre
le 4 novembre 1973

Dans une "lède" près du Clapet:

- Psalliota silvatica Sch.
- Clathrus cancellatus Tourn.
- (un seul exemplaire)
- Girodon lividus Fr. ex Bul.
- Pholiota spectabilis Fr.
- Armillaria mellea Vahl.
- Rhodopaxillus nudus R. Maire
- Trametes rubescens; A. et S.

Au voisinage de cette "lède", dans les dunes, sous pins:

- Lepiota procera Scop.
- (splendides exemplaires non récoltables parce que trop âgés)
- Clitocybe nebularis Batsch.
- Tricholoma saponaceum Fr.
- Tricholoma albobrunneum Pers.
- Tricholoma caligatum Viv.
- (un seul exemplaire) DE -
- Boletus bovinus Fr.
- Russula nigricans Fr.
- Russula torulosa Bres.
- Russula xerampelina Fr.
- Clitocybe squamulosa Fr. ex Pers.
- Tricholoma terreum Fr.
- Tricholoma atosquamosum Ch.
- Lycoperdon piriforme Schaef. ex Pers.
- Cortinarius mucosus Fr.
- Cortinarius cinnamomeus Fr.
- Inocybe geophylla Fr. ex Sow.

Sur le parking, à l'heure du déjeuner, Madame Corlieux montre de splendides exemplaires de:

- Lepiota rhacodes Fr. ex Vitt.

Aux environs de la Maison forestière de la Bouverie, M^r Jean Baron de Champdeniers récolte:

- Myriostoma coliforme (1)
(= Geaster coliformis Dicks.) (2) (3)


C'est la plus belle trouvaille de la journée.

P. Biget

(1) - cf. Heim: "Champignons d'Europe", t.11, p. 496.

(2) - cf. Bigeard, supplément p. 529.

(3) - Notons que nos collègues de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Anjou ont trouvé cette rareté dans les bois de Brion en 1973 -(Bull. trim. de la Soc. d'Et. Scient. de l'Anjou n° 29, janvier-février - mars 1974).



Myriostoma coliforme = Geaster coliformis.

Forêt de la Coubre.

Dessin de mademoiselle Fleurenceau d'après un spécimen confié par monsieur Biget.

Note.-

Ne terminons pas sans remercier:

- d'une part Messieurs les Principaux des C.E.S. du Château d'Oléron et de la Tremblade qui ont eu l'amabilité de mettre à notre disposition une salle de leur établissement nous permettant de terminer les sorties de l'île d'Oléron et de la Forêt de la Coubre par une modeste exposition,

- d'autre part nos collègues Pigéot et Ollier qui en ont assumé la charge matérielle avec l'aide de quelques autres Sociétaires.

M. Sandras

Samedi 10 Novembre 1973

(Sortie de l'Assemblée Générale)

Excursion Mycologique dans les Bois de Fenioux (17)
près du hameau de chez Voisin

La promenade de Fenioux a été effectuée un peu trop tard en saison et n'a certainement pas pu permettre de découvrir les plus intéressantes espèces auxquelles on pouvait s'attendre dans ce bois très remarquable par ailleurs. Cependant il faut noter la présence de plusieurs champignons qui valaient à eux seuls le déplacement. Je pense qu'il serait judicieux d'inscrire ce bois sur la liste des rendez-vous d'octobre pour la prochaine saison mycologique.

La liste qui suit comporte toutefois 60 espèces dont certaines n'ont pas été vues bien souvent et qui méritent donc une mention spéciale, soit parce qu'elles sont rares soit parce qu'elles offrent un intérêt particulier. L'une d'entre elles découverte par Monsieur Baron (1) n'a pu être remise au Dr Bouchet et a donc échappé à sa détermination; il s'agissait d'un hygrophore du gr. des Coccinei, d'autant plus intéressant qu'il ne s'agissait pas du coccineus lui-même. Il gaudra rechercher cette espèce l'an prochain.

Liste des Champignons récoltés (2) (3)

<u>Lactarius</u>	<u>vellereus</u> , <u>camphoratus</u> , " <u>cimicarius</u> ", <u>quietus</u> , " <u>decipiens</u> ", <u>pyrogalus</u>
<u>Russula</u>	<u>nigricans</u> , <u>delica</u> , " <u>atropurpurea</u> ", <u>cyanoxantha</u> , <u>aurata</u> , " <u>alutacea</u> "
<u>Amanita</u>	<u>citrina</u>
<u>Lepiota</u>	" <u>acutesquamosa</u> "
<u>Coprinus</u>	<u>micaceus</u>
<u>Dryophila</u>	" <u>destruens</u> "
<u>Cortinarius</u>	<u>trivialis</u> , <u>cephalixus</u> , <u>nemorensis</u> , <u>purpurascens</u> , " <u>cinnamomeobadius</u> "
	<u>"concinus"</u> , <u>anomalus</u> , <u>torvus</u> , <u>hinnuleus</u> , <u>obtusus</u>
<u>Hebeloma</u>	<u>crustuliniforme</u>
<u>Naucoria</u>	<u>pellucida</u> , (L127G <u>furfuracea</u> Pers.), " <u>conspersa</u> " (Rick 59,5 <u>furfuracea</u>)
<u>Inocybe</u>	<u>scabellata</u> var. <u>minor</u>
<u>Rhodopaxillus</u>	<u>nudus</u>
<u>Tricholoma</u>	<u>sulfureum</u> , <u>sejunctum</u> , <u>album</u> , <u>saponaceum</u>
<u>Cantharellus</u>	<u>cornucopioides</u> , <u>tubaeformis</u>
<u>Clitocybe</u>	<u>mellea</u> , <u>infundibuliformis</u>
<u>Laccaria</u>	<u>laccata</u> , " <u>tortilis</u> "
<u>Collybia</u>	<u>butyracea</u>
<u>Mycena</u>	<u>polygramma</u> , <u>galericulata</u> , " <u>leptocephala</u> "
<u>Panellus</u>	<u>stypticus</u>
<u>Hygrophorus</u>	<u>eburneus</u> var. <u>cossus</u> , " <u>+1 du groupe Coccinei</u> "
<u>Boletus</u>	<u>aurantiacus</u>
<u>Trametes</u>	<u>rubescens</u> for. <u>tricolor</u> , <u>versicolor</u>
<u>Phellinus</u>	<u>torulosus</u>
<u>Hydnum</u>	<u>rufescens</u>
<u>Mycocleptodon</u>	<u>ochraceum</u>
<u>Clavaria</u>	<u>helvola</u> (= <u>dissipabilis</u>)
<u>Stereum</u>	<u>hirsutum</u>
<u>Corticium</u>	<u>coeruleum</u>
<u>Lycoperdon</u>	<u>pyriforme</u>
<u>Scleroderma</u>	<u>vulgare</u>
<u>Mutinus</u>	" <u>caninus</u> "
<u>Helvella</u>	" <u>elastica</u> "

J. Dromer

(1) M^r Yves Baron (86)

(2) Nomenclature Kühner & Romagnési: Flore analytique des Champignons supérieurs.

(3) Les espèces les plus remarquables sont notées: "...."

Remarques sur les

Récoltes Mycologiques du 10 Novembre 1973

dans les bois des environs de Fenioux

Défavorisée par un temps à brouillard épais et froid, cette excursion a connu le succès, et a permis, non sans surprise, la récolte d'une soixantaine d'espèces, dans les bois feuillus. Une liste précise m'a été communiquée aimablement par Monsieur Dromer d'Echillais. Deux espèces attirent spécialement mon attention:

A - Mutinus caninus :

Un seul spécimen de cette rare espèce. Il est tout à fait inhabituel de récolter ce champignon à pareille époque, car il croît habituellement fin été, début automne, en compagnie de Phallus impudicus dont il est voisin et de Clathrus cancellatus. Il existe bien plus d'espèces de ce groupe dans les pays chauds, qui sont leurs lieux de prédilection.

B - Cortinarius concinnus, de Karsten:

Ce cortinaire fait partie du groupe difficile des "Cinnamomei", qui comporte beaucoup de formes difficiles à séparer nettement les unes des autres.

Cortinarius concinnus, lui, se distingue aisément des autres espèces par la teinte du chapeau et du stipe qui tire nettement vers le rouge. Un autre caractère frappant est la différence de couleur de la chair du pied qui est jaune vif et de la surface qui est rougeâtre. De plus, ce cortinaire croît dans les endroits marécageux ou très humides. Le premier spécimen que j'ai vu provenait du Bois de la Mare près de Parthenay (Deux-Sèvres) d'où il m'avait été apporté par le défunt Monsieur Bellivier, à l'occasion d'une excursion à l'Anse du Clapet, il y a plusieurs années. Mais à Fenioux il y avait des groupes abondants, et il était possible de suivre les variations de couleur du chapeau, pouvant aller du chamois cuivré au rouge briqueté. J'ai pu voir en quelques minutes plus d'exemplaires que pendant toute une vie de mycologue.

Il est donné comme synonyme: C. orellanus au sens de Quélet. Dans ce cas il faut se garder de confondre ce champignon avec C. orellanus de Fries. Cette dernière espèce beaucoup plus robuste, ne peut d'ailleurs être assimilée à C. concinnus, typiquement grêle. On sait que le vrai C. orellanus a causé des intoxications graves, surtout en Pologne où ce cortinaire était consommé.

Notre petite espèce est-elle dangereuse ? Aucune mention n'est indiquée dans la "Flore analytique de Kühner et Romagnesi". De toute façon il convient d'être prudent dans l'essai d'un certain nombre de Cortinaires rares et peu connus. Il était admis, avant de connaître les effets néfastes, au point de vue alimentaire de C. orellanus de Fries, qu'aucun Cortinaire n'était vénéneux ! En tout cas, il est plausible de croire que, étant donné sa petite taille et sa rareté, C. concinnus ne risque guère d'être consommé dans notre pays.

En conclusion de cet article, les bois qui ont été visités en cette journée du 10 novembre se sont montrés riches en espèces variées et intéressantes. Ils mériteraient d'être parcourus en octobre, au cours d'excursions mycologiques ultérieures.

P. Bouchet

Dimanche 11 Novembre 1973

Jard sur Mer (Vendée)

Bolétacées

Gyroporus (=Boletus) castaneus Fr. ex Bull.
Boletus bovinus Fr.
Boletus subscabripes Berck.
Paxillus involutus Fr. ex Batsch.

Cantharellacées

Cantharellus tubaeformis Fr.

Pleurotacées

Pleurotus eryngii Fr.

Marasmiacées

Marasmius androsaceus Pat.
Collybia butyracea Fr. ex Bull.
Collybia velutipes Fr. ex Curt.
Mycena vulgaris Fr. ex Pers.

Tricholomacées

Tricholoma equestre Fr.
Tricholoma rutilans Fr.
Tricholoma saponaceum Fr.
Tricholoma sulfureum Fr.
Tricholoma terreum Fr.
Tricholoma atroquamosum Ch.
Lactaria amethystina R. Maire
Laccaria laccata Quél.
Hygrophoropsis aurantiaca Kühner et Rom.

Orcellées

Rhodopaxillus nudus R. Maire

Naucoriacées

Hebeloma crustuliniforme Fr.
Cortinarius mucosus Fr.
Cortinarius torvus Fr.
Cortinarius cinnamomeus Fr.
Geophila fascicularis Kühn. et Rom.
Geophila aeruginosa Kühn. et Rom.
(= Stropharia aeruginosa Curt.)

Amanitacées

Amanita phalloides Fr.
(variété blanche des sables)
Amanita gemmata Fr.
Amanita citrina Fr.

Lépiotacées

Psalliota silvatica Quél.

Russulacées

Russula cyanoxantha Fr.

Russula torulosa Bres.

Russula delicata Fr.

Russula nigricans Fr.

Russula xerampelina Fr.

Lactarius quietus Fr.

Lactarius chrysorrheus Fr.

Lactarius deliciosus Fr.

Calocéracées

Calocera viscosa Pers. ex Fr.

Hydnacées

Calodon nigrum (Fr.) Quél.

Irpex fuscoviolaceus Fr.

Phylactériacées

Phylacteria terrestris Pat.

(=Thelephora terrestris Fr.)

Porées

Ganoderma lucidum Karst.

Lycoperdacées

Lycoperdon piriforme Schaef. ex Pers.

Lycoperdon (calvatia) exipuliformis Schaef.

Sclérodermatacées

Scleroderma vulgare Fr.

Astréacées

Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan

Ascomycètes

Otidea onotica Fr. ex Pers.

Peziza polytrichi Schum.

Gastéromycètes

Rhizopogon rubescens Tul.

Le champignon le plus abondant est:

l'Armillaria mellea Vahl.

P. Biget et H. Frouin

Le 12 Novembre 1973

Promenade Mycologique dans le Bois des Châtaigniers
sur la rive droite de l'Arnaise - Commune de Champagne (17)

Les bois qui bordent la route de Royan entre Saint-Agnant et la Gripperie s'étendent sur des terrains calcaires. Ils sont traversés par le ruisseau de l'Arnaise qui entretient beaucoup d'humidité près de ses rives ce qui favorise une végétation de Carex et de plantes semi-aquatiques.

Du point de vue mycologique ces bois offrent un intérêt certain. M^r Charron et moi-même avons trouvé les espèces suivantes (1) au cours de notre promenade dont les plus rares ou les plus remarquables ont été présentées au D^r Bouchet.

<u>Lactarius</u>	<u>"subdulcis"</u> , <u>"decipiens"</u> , <u>chrysorreus</u>
<u>Russula</u>	<u>nigricans</u> , <u>delica</u> , <u>luteotacta</u> , <u>fragilis</u> , <u>cyanoxantha</u>
<u>Amanita</u>	<u>vaginata</u> (<u>plumbea</u>), <u>phalloides</u>
<u>Psalliota</u>	<u>silvicola</u>
<u>Cortinarius</u>	<u>"emollitus"</u> , <u>nemorensis</u> , <u>torvus</u> , <u>"erythrinus"</u> ss Hy, <u>"semudaphilus"</u> Hy ⁽²⁾
<u>Inocybe</u>	<u>"cervicolor"</u> , <u>fastigiata</u>
<u>Rhodopaxillus</u>	<u>nudus</u>
<u>Tricholoma</u>	<u>sulfureum</u> , <u>sejunctum</u> , <u>album</u> , <u>"atrosquamosum"</u>
<u>Cantharellus</u>	<u>cornucopioides</u>
<u>Clitocybe</u>	<u>mellea</u> , <u>nebularis</u> , <u>dicolor</u>
<u>Mycena</u>	<u>pura</u> , <u>polygramma</u> , <u>galericulata</u> , <u>filopes</u> (= <u>vitis</u>), <u>"iodiolens"</u>
<u>Panellus</u>	<u>stypticus</u>
<u>Crepidotus</u>	<u>"mollis"</u>
<u>Hygrophorus</u>	<u>"puniceus"</u> , <u>"coccineus"</u> , <u>niveus</u> , <u>olivaceoalbus</u> , <u>cossus</u>
<u>Hydnum</u>	<u>repandum</u>
<u>Irpex</u>	<u>lacteus</u> (= <u>obliquus</u>)
<u>Clavaria</u>	<u>helvola</u> (= <u>dissipabilis</u>)
<u>Phlebia</u>	<u>"aurantiaca"</u> (= <u>radiata</u>)

Les espèces les plus remarquables ici (notées "....") sont plus particulièrement:

- Lactarius subdulcis , réputé peu rare, mais en fait peu commun dans notre région;
- Lactarius decipiens , voisin du précédent, beaucoup plus fréquent dans nos bois;
- Cortinarius emollitus; C. erythrinus et surtout C. semudaphilus déterminé par le Docteur Bouchet et vu pour la première fois;
- Hygrophorus puniceus qui, lui aussi, n'avait jamais été rencontré dans notre région. C'est une espèce des pâturages de montagne et qui, selon Romagnesi, est franchement rare en plaine. Il a été trouvé en plein bois, près de l'Arnaise, au voisinage d'une station de trompettes de la mort, hors de la zone des Carex.

J. Dromer

-
- (1)- Pour les champignons supérieurs, nomenclature de Kühner et Romagnesi : Flore analytique des champignons supérieurs.
(2)- Na OH a provoqué une réaction noire sur la chair des stipes des échantillons récoltés du Cort. semudaphilus et l'un des exemplaires avait une couleur de chapeau conforme à Ségué : S 174.