

MUSCINEES

DU DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

A - MUSCINEES RECOLTEES PAR MM. P. BIGET, E. CONTRE, J. DELARAI, M. ROGEON :

- Bussière-Badil (1970):

Marchantia polymorpha L.	Fontinalis squamosa L.
Pellia Fabbronia Rad.	Homalia trichomanoides (Schreb.) B.E.
Chiloscyphus polyanthus (L.) Cda.	Brachythecium rivulare B.E.
Lejeunea cavifolia (Ehr.) Lindb.	Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Wstf.
Mnium punctatum (L.) Hedw.	

- Etang Grohler (au nord de Nontron) (1970)

Orthotrichum Lyelli H. et T.	Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Wstf.
------------------------------	--------------------------------------

B - MUSCINEES RECOLTEES PAR M. M. ROGEON:

- Domme (1966)

Riccia cavernosa Hoff. em. Rad.	Calyptogeia fissa (L.) Rad.
- canaliculata Hoff.	Anisothecium rubrum (Huds.) Lindb.
Conocephalum conicum (L.) Dum.	Physcomitrella patens (Huds.) B.E.
Chiloscyphus polyanthus (L.) Cda.	Cratoneurum glaucum (Lam.) C. jens.
- pallescens (L.) Cda.	

- Les Eyzies (1966)

Leiocolea turbinata (Rad.) Buch.	Solenostoma atrovirens (Schl.) K.M.
	Eucladium verticillatum (L.) B.E.

- Caudon (1966)

Leiocolea Muellerei (Nees) Joerg.

C - MUSCINEES RECOLTEES PAR M. R.B. PIERROT:

- Les Eyzies (1947-1968)

Cephaloziella Baumgartneri Schiff.	Leptobarbula berica (De Not.) Schimp.
Southbya stillicidiorum (Rad.) Lindb.	Tortella inflexa (Bruch) Broth.
Conocephalum conicum (L.) Dum.	- inclinata (Hedw.) Limp.
	Grimmia tergestina Tomm.

- Saint-André-d'Allas (1968)

Cephaloziella Baumgartneri Schiff.
Jungermania atrovirens Dum.
Southbya nigrella (De Not.) Schp.
Lejeunea cavifolia (Ehr.) Lindb.
Fissidens minutulus Sull.
Seligera pusilla (Ehr.) B.E.
Anisothecium crispum (Hedw.) Lindb.
Gyroweisia tenuis (Schr.) Schp.
Gymnostomum calcareum B.G.

Orthodicranum montanum (Hedw.) Lske.
Eucladium verticillatum (L.) B.E.
Leptobarbula berica (De Not.) Schp.
Tortella inflexa (Bruch) Broth.
- inclinata (Hedw.) Limp.
Grimmia tergestina Tomm.
Mniobryum carneum (L.) Limp.
Plagiopus Oederi (Gunn.) Limp.
Stroemia obtusifolia (Schr.) Hag.
Campylium calcareum Crund. & Nyh.

- Le Moustier (1955)

Leptobryum pyriforme (L.) Wils.

- Saint-Michel-de-Double (1964)

Funaria obtusa (Dicks.) Lindb.

- Sarlat (1968)

Fissidens crassipes Wils. var rufipes (Schp.)

- Saint-Léon-sur-Vézère (1955)

Hymenostylium curvirostre (Ehr.) Lindb.

Ces listes ne comprennent pas un certain nombre de plantes banales répandues partout.

N.D.L.R.= La flore bryologique de la Dordogne ayant rarement fait l'objet de publications, il nous a paru intéressant, dans le cadre des comptes rendus de la Session Extraordinaire de Nontron, de citer les récoltes les plus remarquables effectuées au cours des vingt dernières années dans ce département.

Que les botanistes cités dans cet article, et plus particulièrement M. R.B. PIERROT qui a rassemblé les documents, veuillent bien trouver ici l'expression de la gratitude de tous.