

ESPECES INTERESSANTES
(et souvent inédites)
DU DEPARTEMENT DE LA CORREZE

par R. MAISONNEUVE .

L'auteur de cette liste ne cite délibérément que certaines espèces qu'il a rencontrées sur le terrain, durant ces cinq dernières années, au cours de sorties dues à sa seule initiative. Bien sûr, il était la plupart du temps seul, ou en compagnie de son épouse et d'amis de la nature. Mais aussi des botanistes distingués ont bien voulu répondre à ses invitations. Ils lui ont évité nombre d'erreurs et ouvert les yeux sur des plantes qu'il n'aurait pas vues, ou du moins remarquées. Il tient à les remercier tous. Il citera en particulier MM. L. Brunerye (L.B.) et E. Contré (E.C.).

Cette liste reprend certaines espèces indiquées dans des publications récentes telles que:

- 1). "Troisième Complément au Catalogue des Plantes de la Corrèze" par L. Brunerye & R. Maisonneuve. Bull. Soc. Scient. Hist. & Archéolog. de la Corrèze, Brive, t.97, 1975,
- 2). "Introduction à l'étude de la flore et de la végétation des serpentines de la Corrèze" ; notre bulletin de 1975.
- 3). "Compte rendu de la sortie de la S.B.C.O., à Chasteaux le 12 juin 1977".

Nous laissons de côté les espèces qui s'introduisent ou qui sortent des jardins, car leur localisation n'est pas suffisamment étudiée. C'est à regret, car ne sont-elles pas les images les plus dynamiques de notre flore, et les plus riches d'avenir? On ne peut fermer les yeux! *Buddleja davidii*, *Conyza albida*, (= *Erigeron naudinii*), *Solidago gigantea* (= *S. serotina*), *Pastinaca urens*, etc.... bravent la poussière de nos carrières et l'oxyde de carbone de nos routes !

Nous indiquons le carré U.T.M. (de 5km de côté) pour chaque espèce d'une station non citée précédemment. Pour le moins, cela aidera à trouver les lieux sur la carte, en évitant les fâcheuses homonymies si fréquentes.

Enfin : -le signe (+) indique qu'à notre connaissance la plante n'a jamais été signalée en Corrèze.

-le ! (après RUP.) signifie que nous avons vu la plante à l'endroit même indiqué dans le Catalogue de RUPIN (qui date de 1884).

- 01.- *Lepidotis inundata* (L.) C. Börner (= *Lycopodium inundatum* L.)
 - Grandsaigne. DL 13(3): la Fageolle, alt. 820m. Abondant (R.M. 1974).
 Puy de la Vialle, alt. 800m (R.M. sept.1977).
 - Bonnefond, étang d'Anglards. DL 24(2), alt. 840m (L.B. & R.M. 1974).
 Il pousse sur une couche humique très mince (1mm.) qui couvre des graviers fins temporairement inondés de la lande tourbeuse.
- 02.- *Lycopodium clavatum* L.
 - Grandsaigne, à la Fageolle (R.M. 1974).
 - Saint-Augustin, étang de Ganezande. DL 03(4), alt. 560m (L.B.).
 Sous les pins et souvent dans la Callunaie.
- + 03.- *Ophioglossum azoricum* C. Presl
 - Mercoeur, à Cauzenille-Est. DK 18(4), alt. 410m (L.B. & R.M. juin 1977).
 Petite cuvette sur serpentine; 20 pieds stériles sur 0,25 m².
- + 04.- *Cheilanthes marantae* (L.) Domin (= *Notholaena marantae* (L.) Desv.)
 Très abondant et vigoureux dans les fissures des serpentines.
 - Chenailers-Mascheix. DK 08(3).
 à Bettu, alt. 420m (R.M. juin 1973).
 au Mazeaud, alt. 380m (L.B. & R.M. août 1977).
 - Brivezac, à Toutou. DK 08(3), alt. 400m (R.M. 1973).
 - Reygade. DK 18(1), alt. 480m (R.M. 1975).
 - Mercoeur, à Cauzenille. DL 18(4), alt. 400m (R.M. 1975 part.0, 1976 part.E.).
- 05 - *Adiantum capillus-veneris* L.
 - Astailac. DK 07(3), alt. 140m (R.M. juin 1976).
 - Brive, vallée de Planchetorte. CK 89(1), alt. 140m (RUP.) !
 Sur des parois verticales très humides.
- + 06.- *Cryptogramma crispa* (L.) R.Br. (= *Allosorus crispus* (L.) Röhl).
 - Pradines au Puy du Roc-Bas. DL 14(4), alt. 850m (R.M. août 1974).
 Trois touffes stériles dans des fissures peu profondes, exposées à l'ouest.
- 07.- *Anogramma leptophylla* (L.) Link (= *Gymnogramma lept.* (L.) Desv.).
 - Brive: parois de certaines grottes des grès bigarrés de la vallée de Planchetorte. CL 89(3), alt. 190m. Il y est donné AC dans le Cat. de Rupin. J'ai vu en 1976 quelques pieds sur des indications précises de M. Boudrie.
- + 08.- *Asplenium cuneifolium* Viv. (= *A. serpentinii* Tausch)
 - Fissures des serpentines, avec *Cheilanthes*. Abondant. (voir 04).
 - Serpentes du Lonzac, au Plantadis. CL 93(3), alt. 400m (L.B.) Rare.
- 09.- *Asplenium forisiense* Le Grand -
 Rochers et certains murs. Quelques touffes çà et là.
 - St-Hilaire-Peyroux, au Puy de Peyroux. CL 91(2), alt. 450m (R.M. 1^{er} janv.1975).
 - Aubazine, au puy de Pauliac. CL 90(4), alt. 500m (RUP ! vu le 1/1/75).
 - St-Martin-la-Méanne (murs). DL 10(4), alt. 500m (E.C.).
 - Gimel à St-Etienne-de-Braguse. DL 01(3), alt. 410m (R.M. juin 1975).
- 10.- *Asplenium X alternifolium* Wulfen (= *A. germanicum* auct.; *A. X breynii* auct.)
 - St-Yrieix-le-Déjalat, sur la route de Treignac. DL 13(4), alt. 740m.
 7 touffes (R.M. 1974).
 - Neuvic, à Antiges. DL 42(1), alt. 600m (E.C. & R.M. sept. 1977).
 - Margerides DL 53(2), alt. 660m. 7 touffes (E.C. juillet 1973).
 Sur des murs exposés au sud, avec les parents.
- 11.- *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
 - St-Yrieix-le-Déjalat. Abondant. (R.M. 1973).
 - St-Merdès-Oussines DL 25(2), alt. 820m (R.M. juillet 1977).
 Sur les murs des villages.

- + 12.- *Dryopteris gr. borrieri* (incluant à la fois *D. borrieri* Newman (= *D. pseudo-mas* (Wollast.) Holub & Pouzar) et *D. X tavelii* Rothm., son hybride avec *D. filix-mas*).

Ravins humides de nombreux ruisseaux. (Ces formes sont, dans certaines stations, au moins aussi abondantes que *D. filix-mas* qui les accompagne ordinairement).

- Le long de la N.89, entre Tulle et la gare d'Aubazine. CL 90, alt. 200m.
- Cornil, Beynat, Gimel,.....

Si ce groupe de formes se sépare manifestement du *D. filix-mas*, la distinction entre *D. borrieri* & *D. X tavelii* est, pour le non spécialiste du moins, beaucoup plus aléatoire.

Signalons au "Pont de Cornil" dans le profond "ravin de la Vialle", la présence d'un curieux *Dryopteris* manifestement hybride qui est vraisemblablement issu du croisement de *D. carthusiana* soit avec *D. filix-mas*, soit avec *D. borrieri*. Dans la première hypothèse, il ne différerait pas du *D. X remota* découvert par E. Walter en 1926 dans les gorges du Doustre, près La Roche-Canillac.

Ce *Dryopteris* mérite une étude particulière.

- 13.- *Quercus pyrenaica* Willd. (= *Q. toza* Bast.)

- Le Chastang, au Verdier. DL 00(1), alt. 460m. Se maintient dans un taillis de Châtaigniers.
- Beynat, au Perrier. DK 09(1), alt. 480m. Est presque exclusif dans un bois important.

La première station est signalée dans l' "Inventaire de la Flore d'Auvergne" de M. Chassagne (I p.229), attribuée à Jordan de Puyfol (1874) qui indique aussi l'hybride "*pedunculata X toza*" (*Q. X andegavensis* Hy.).

La deuxième est due au Dr Puyaubert (Catal. des Plantes du Limousin, par Ch. Le Gendre).

14. - *Montia fontana* L. ssp. *chondrosperma* (Fenzl) Walters (= *M. verma* auct.; *M. minor* auct.).
- Sables et limons de la retenue de Neuvic, à Antiges. DL 42(1), alt. 600m (R.M. juin 1976).

15. - *Sagina subulata* (Swartz) C. Presl
- Brivezac, à Toutou. (L.B. & R.M. juin 1977).
Chemin humide sur serpentine.

16. - *Lychnis viscaria* L.
- Bort-les-Orgues: talus du CD 127 sur phonolithe. DL 52(3), alt. 750m (RUP.)!

17. - *Silene armeria* L.
- Assez abondant sur les rochers et pelouses des serpentines de 04.

18. - *Silene gallica* L.
- Chenailers-Mascheix, à Bettu. (L.B. & R.M. juin 1977).
 - Brivezac, à Toutou. (R.M. 1973).
Quelques pieds en bordure de chemins, sur serpentine.

19. - *Cucubalus baccifer* L.
- St-Aulaire, à Pampelonne. CL 70(1), alt. 270m (R.M. sept. 1977).
Un pied dans le talus de la route.

20. - *Berberis vulgaris* L.
- Moustier-Ventadour, à la Chanselve. DL 32(1), alt. 530m (CL. M. juin 1976). Trois pieds très vigoureux dans la haie.

- + 21. - *Meconopsis cambrica* (L.) Vig.
- Palisse au bord de la Luzège, sur un terrain très ombragé et humide comportant de grosses pierres. 6 pieds. DL 33(2), alt. 500m (R.M. juin 1975).
22. - *Corydalis claviculata* (L.) DC.
- Le Rat de Peyrelevade. DL 26(1), alt. 840m. Assez abondant. (R.M. juil. 1976).
- Palisse: pont sur la Luzège (voir 21).
- Mestes, au Pont Rouge. DL 43(3), alt. 580m (Cl.M. oct. 1977).
- Combressol, au pont de Lerme. DL 33(2), alt. 540m (couvre le sol entre le chemin et la Luzège sous des *Prunus spinosa* (R.M. juil. 1976).
23. - *Myagrurn perfoliatum* L.
- Chasteaux, entre Rozières et Farges. CK 89(1), alt. 220m (R.M. Mai 1977).
Vigne, champ.
- + 24. - *Lepidium heterophyllum* Benth
Sur le ballast de l'ancienne voie ferrée.
- Tulle, au Pezat. DL 01(2), alt. 260m (R.M. mai 1974).
- Le Lonzac. DL 03(1), alt. 500m (L.B. août 1977).
- + 25. - *Coronopus didymus* (L.) Sm. (= *Senebiera didyma* (L.) Pers.)
- Tulle. DL 01(2), alt. 200m (R.M. juin 1976 et oct. 1977).
Terrain récemment aplani au nouveau foirail.
- + 26. - *Sesamoides canescens* (L.) O. Kuntze (= *Astrocarpus purpurascens* (L.) Rafin).
- Reygade: rochers de serpentine sous la ferme du Bousquet. Abondant.
DK 18(1), alt. 470m (R.M. mai 1975).
- + 27. - *Aphanes microcarpa* (Boiss. & Reuter) Rothm.
- Neuvic, à Antiges (R.M. mai 1976). Il couvre par places le sable d'une crique temporairement inondée, mêlé intimement à *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*.
- St-Yrieix-le-Déjalat, à Franchesse. DL 13(3), alt. 600m (R.M. juin 1977).
- St-Merd-les-Oussines. DL 25(2), alt. 770m (R.M. juillet 1977).
Cette espèce méconnue est probablement assez répandue sur les espaces peu herbeux au bord des routes, lieux sablonneux.
28. - *Astragalus glycyphyllos* L.
- Merlines: fours à chaux ruinés de Gioux. DL 55(4), alt. 600m (R.M. juin 77).
- Altillac. DK 07(3), alt. 140m (E.C. 17 juin 1972).
29. - *Vicia orobus* DC. in Lam. & DC.
- St-Etienne-aux-Clos, talus de l'ancienne voie ferrée le long du Chavanon. DL 54(3), alt. 600m (R.M. juin 1977).
- St-Merd-les-Oussines: petite prairie en bordure sud du ruisseau des Fargettes. DL 25(2), alt. 780m (L.B.).
30. - *Lathyrus sphaericus* Retz
- Chasteaux: pelouse calcaire sèche au-dessus du Soulier (Côte Pelée). CK 79(4), alt. 220m Rare (12 juin 1977, sortie S.B.C.O.).
- + 31. - *Trifolium montanum* L.
- Chenailers-Mascheix, à Bettu, dans la pelouse sur serpentine, en la compagnie (insolite) de *Serapias lingua*, de *Plantago serpentina*,... il est assez abondant. (R.M. 1974).
En vérité il est signalé dans RUPIN sans localisation: "Indiqué en Corrèze par Chrysostome de la Place (PUEL n°1056)".
32. - *Psoralea bituminosa* L.
- Meyssac et St-Julien -Maumont, route de Branceilles CK 98(3), alt. 240m(RUP) !
Station dense et étendue sur les calcaires marneux et cargneules de l'Hettangien.
33. - *Geranium sylvaticum* L.
Fossés, bords des ruisseaux sur silice.
- Moustier-Ventadour. DL 32(1), alt. 450m (R.M. juin 1976).

- St-Merd-les-Oussines (voir n° 29) (L.B.).
- Lestards, sous Coissac. DL 14(1), alt. 600m (L.B.).
- Aix, au carrefour de la route de St-Etienne-aux-Clos, DL 55(2), alt. 750m.
(R.M. juin 1977).

34. - *Euphorbia hyberna* L.

Prairies humides, fossés et talus.

- St-Merd-les-Oussines (voir 29) (L.B.).
- Bonnefond, à l'entrée sud du bourg. Abondant. DL 24(2), alt. 810m
(R.M. juin 1973).
- Bar, à Fontaimazaud. DL 02(4), alt. 240m (R.M. 1974).

+ 35. - *Euphorbia flavicoma* DC.

- Chenailers-Mascheix, au Mazeaud et à Bettu (R. M. 1973).
- Reygade, près du ruisseau. (R.M. 1975).

Cette Euphorbe ressemble à la race dite "*E. costeana* Rouy", dont la seule station signalée est le puy de Voll, près de Firmi (Aveyron).

Mais:

- 1)-Les auteurs de FLORA EUROPAEA (II, p.219) mettent sérieusement en doute la spécificité de *E. flavicoma* DC., qu'ils inclinent à assimiler à *E. brittin-geri* Opiz ex Samp. De plus, *E. costeana* Rouy n'est cité qu'à l'Index et comme simple synonyme d'une autre espèce, "*E. ruscinoensis* Boiss".
- 2)-De la même façon, cette synonymie (ou du moins un proche voisinage) est repris dans le 4^{ème} supplément de la Flore de Coste. Soit, mais peut-on encore garder *E. ruscinoensis* comme endémique des Corbières sans y annexer Aveyron et Corrèze ?
- 3)-En sens contraire, MM. J. Vindt et M. Guinochet dans la "Flore de France" en cours de parution, conservent *E. flavicoma* DC. et *E. costeana* y est "promu" au rang de sous-espèce. Il prend même une place indépendante dans les clés si précises de détermination !

Signalons que , en 1976, les exemplaires qui bordent la route (et non ceux des fentes des rochers) étaient parasités par *Uromyces excavatus* (DC.) Lév. (dét. R. Lugagne).

+ 36. - *Daphne laureola* L.

- Moustier-Ventadour. DL 32(1), alt. 530m (R.M. août 1977).
Une centaine d'arbrisseaux dans une chênaie claire.
- St-Etienne-aux-Clos (voir 29). 5 pieds dans le ravin d'un petit affluent du Chavanon.

37. - *Hypericum linarifolium* Vahl

Pelouses sèches sur rochers (granite et grès).

- Brive: Planchetorte (voir 07) (RUP.) ! (vu en juin 1976).
- Gimel: St-Etienne-de-Braguse (voir 09). Assez abondant. (R.M. juin 1975).
- Moustiers-Ventadour. DL 32(1), alt. 450m (R.M. juillet 1976).

38. - *Elatine hexandra* (Lapierre) DC.

- Neuvic, à Antiges. (E.C. & R.M. 7 sept. 1977).
- Clergoux: étang Ferrier. DL 11(4), DL 21(2), alt. 510m (R.M. oct. 1977).
Grèves sablonneuses des étangs.

+ 39. - *Circaea X intermedia* Ehrh.

Lieux frais et couverts.

- Lamazière-Basse, au pont des Bouyges. DL 32(1), alt. 440m (E.C.).
- Lamazière-Basse, gorges du Vianon. DL 31(3), alt. 380m. (L.B. & R.M. août 75).
- St-Etienne-aux Clos (dans la coulée à *Adenostyles*). (voir 61).

+ 40. - *Trinia glauca* (L.) Dumort.

- Reygade: rochers de serpentine. Abondant (R.M. juin 1975).

41. - *Peucedanum gallicum* Latourr.
Lieux humides sur micaschites et gneiss.
- Tulle, à Cerice. DL 01, alt. 260m. Deux colonies. (R.M. juil. 1975).
- Aubazine, au canal des Moines. CL 90(4), alt. 380m. Rare (R.M. oct. 1977).
42. - *Peucedanum cervaria* (L.) Lapeyr.
Sous-bois de coteaux calcaires.
- Perpezac-le-Blanc, au puy de Pampelonne. CL 70(1), alt. 300m.
Assez abondant (L.B. & R.M. août 1977)
43. - *Caucalis platycarpus* L. (= *C. daucoides* L. 1767 non L. 1753).
- Chasteaux: vigne et champ à Farges. CK 89(2), alt. 240m (R.M. 1977).
- + 44. - *Cyclamen hederifolium* Aiton (= *C. neapolitanum* Ten.)
- Sainte-Fortunade: parc du château (naturalisation ancienne)
DL 00(1), alt. 440m.
- + 45. - *Armeria alliacea* (Cav.) Hoffm. & Link
- Serpentine (voir 04). Abondant (R.M. 1973 à 76).
P. Donadille, qui traite le genre *Armeria* dans la Flore de Guinochet et de Vilmorin conserve la dénomination: "*Armeria plantaginea*" (All.) Willd.
46. - *Centaureum pulchellum* (Swartz) Druce (= *Erythraea pulchella* (Swartz) Fries).
Pelouses humides, bord des fossés, des champs.
- Branceilles sous Long. CK 98(3), alt. 140m (L.B. & R.M. août 1977).
- St-Julien-Maumont. Station importante à fleurs blanches. (voir 32)
(L.B. & R.M. août 1977).
47. - *Gentiana pneumonanthe* L.
Tourbières, parmi les touradons de *Molinia*.
- Beynat: tourbière des 4-Routes. Abondant DK 09(1), alt. 530m (R.M. 1977).
- Aix, à Chalons, pré marécageux. DL 55(2), alt. 720m (E.C. & R.M. sept. 1977).
48. - *Galium odoratum* (L.) Scop. (= *Asperula odorata* L.)
En colonies fort denses dans les bois frais et rocailleux.
- Chasteaux, au val d'Entrecor. CK 89(1), alt. 140m. (RUP.) !
- Bar, à Fontaimazaud. DL 02(4), alt. 250m. (R.M. avril 1974).
- St-Pantaléon-de-Lapleau, pont sur le Vianon. DL 31(3), alt. 380m
(L.B. & R.M. août 1975).
- St-Etienne-aux-Clos: coulée à *Adenostyles*. Voir 61. (R.M. juin 1977).
- Sarroux, aux Aubazines. DL 52(3), alt. 650m (R.M. oct. 1977).
49. - *Veronica montana* L.
Chemins, lieux humides très ombragés.
- Brive, dans une grotte de Planchetorte (voir 07) (R.M. juin 1976).
- Atiliac, sentier près de la Dordogne. DK 07(3), alt. 140m (E.C. juin 1972).
- St-Etienne-aux-Clos, petit affluent du Chavanon. (Voir 36) (L.B. août 1977).
- + 50. - *Veronica peregrina* L.
Crique temporairement inondée.
- Neuvic, à Antiges (voir 14). Abondant en 1975 et 1976. (R.M.).
- + 51. - *Veronica spicata* L.
- Chenailers-Mascheix: pelouse sur serpentine. (L.B. & R.M. 1975).
52. - *Orobanche hederarum* Duby
- Astailac. DK 07(3), alt. 140m (R.M. juin 1976). Sur le Lierre qui couvre
un mur de soutien au-dessus de la Dordogne.
53. - *Plantago maritima* L. ssp. *serpentina* (All.) Arcangeli "Grèzes" sur serpen-
tines et cargneules. Abondant localement.
- Chenailers-Mascheix, à Bettu. (R.M. sept. 1974).
- Branceilles sous Long (voir 46) (Cl. M. juin 1975).
- Mercoeur, à Cauzenille-Est (L.B. & R.M. juin 1977).

Disons que cette plante est signalée dans le Cat. de RUPIN:
"n° 1060. *Plantago graminea* Lam. Brive (1). Branceilles, sur les poudingues
quartzes. (André in Cat. Lamotte. Fl. du Plateau Central, p.619)".

54. - *Valeriana tripteris* L.
Bois frais, ravins humides.
- Lamazière-Basse, gorges du Vianon (voir 39).
- St-Etienne-aux-Clos, bord du Chavanon (voir 36) (R.M., L.B. 1977).
55. - *Campanula erinus* L.
Pelouse sèche sur calcaire.
- Chasteaux, "Côte Pelée" (12 juin 1977, sortie de la S.B.C.O.).
- Yssandon, prairie avec rochers sous le cimetière.
CL 70(1); alt. 320m (R.M. sept. 1977).
56. - *Legousia speculum-veneris* (L.) Chaix (= *Specularia s.v.* (L.) A. DC.)
- Chasteaux à Farges. Champ. Rare (voir 43) (R.M. 4 juin 1977).
- Chasteaux, au puy de Crochet. AC. CK 89(2), alt. 310m (R.M. juin 1977).
57. - *Lobelia urens* L.
- Benayes, "aux Landes". CL 74(4), talus du Château d'eau, et CL 84(2),
alt. 470m, marécage. (ind. par L.B.).
- Aubazine, au Canal des Moines, CL 90(4), alt. 380m. Indiqué par RUPIN
("n° 824: Obasine (sic) AC.). Vu 4 pieds (R.M. oct. 1977).
58. - *Erigeron acer* L. ssp. *acer*
Murs en ruine d'anciennes constructions.
- Moustier-Ventadour (ruines). DL 32(1), alt. 460m (R.M. juillet 1973).
- St-Pantaléon-de-Lapleau, la Vieille-Eglise. DL 31(3), alt. 400m
(R.M. sept. 1977).
59. - *Helichrysum stoechas* (L.) Moench
Coteaux calcaires secs et pierreux.
- Chasteaux, au puy de Crochet, AC (voir 56).
- + 60. - *Bidens frondosa* L.
- Aubazine: fossé de la N.89 au sud du tunnel routier. Assez abondant.
CL 90(3), alt. 160m (R.M. oct. 1977).
- + 61. - *Adenostyles alliariae* (Gouan) A. Kerner ssp. *alliariae* (= *A. albifrons*).
- St-Etienne-aux-Clos. DL 54(3), alt. 600m (R.M. juin 1977).
Cette importante colonie exposée vers l'est est installée
sur la coulée de pierres d'un ruisseau dont le cours est arrêté par
l'ancienne voie ferrée.
La plante est répandue en Auvergne, mais fort loin à l'est
(Monts Dorés), et aux altitudes supérieures à 1100 mètres.
62. - *Doronicum pardalianches* L.
Plante des hêtraies.
- Chasteaux, au val d'Entrecor (voir 48) (RUP.) !
- Bar, à Fontaimazaud (voir 34).
- St-Etienne-aux-Clos (voir 61).
63. - *Carduus nigrescens* Vill.
- Chasteaux: val d'Entrecor; puy de Crochet et le Soulier où il a été signa-
lé pour la première fois par M. L. Brunerye dans son article: "La vallée
sèche de la Couze". 1966. RUPIN l'ignore; cependant cette espèce (varia-
ble et souvent dénommée "*C. spiniger* Jordan" est répandue sur les Causses
du Quercy.

(1) mis pour: Arrondissement de Brive.

64. - *Serratula tinctoria* L.
 - Tulle, à Cerice. DL 01(2), alt. 240m (D^r Puyaubert. Vu R.M. nov. 1977).
 - Aubazine, canal des Moines (voir 41) (R.M. oct. 1977).
 - St-Merd-les-Oussines, route de Bugeat. DL 25(2), alt. 770m.
 - Reygade, sur serpentine (R.M. sept. 1975).
 - Neuvic, près le Vent-Bas. DL 41(1), alt. 460m (L.B. & R.M. août 1975).
 Cette espèce est très variable, surtout par la forme de ses feuilles.
- + 65. - *Leuzea conifera* (L.) DC.
 - Chasteaux, au puy de Crochet (voir 56). Cette plante avait intrigué Melle Pourchet en mai 1976.
 Nous avons localisé 2 petites stations en juin 1977.
66. - *Prenanthes purpurea* L.
 - Neuvic, au Vent-Bas (voir 64).
 - Saint-Augustin, talus du CD 128. DL 03(3); alt. 510m (L.B.)
67. - *Chondrilla juncea* L.
 - Aubazine, bord de la N.89. CL 90(3), alt. 160m (R.M. oct. 1977).
68. - *Crepis foetida* L.
 - Chasteaux, "Côte Pelée" (R.M. mai 1974).
- + 69. - *Sagittaria latifolia* Willd. (dén. incertaine)
 - St-Priest-de-Gimel, étang de Ruffaud. DL 11(1), alt. 500m (R.M. 1975).
 Cette Sagittaire américaine, stérile en France, est très semblable à celle qui fut trouvée près de Bordeaux en 1862 (dénommée alors "*S. obtusa* Willd.") et qui a d'ailleurs remonté d'une façon sensible la Dordogne jusqu'à Branne (E.C., in litt.)
70. - *Baldellia repens* (Lam.) Van Ooststroom ex Lawwalrée (= *Alisma ranunculoides* L. var. *repens* (Lam.) Duby).
 - Clergoux, à l'étang Ferrier. DL 10(4) et DL 20(2), alt. 510m (R.M. sept. 76).
 Il était en 1976, à la suite d'une sécheresse exceptionnelle, très abondant sur des hectares de sable. Cette année, au contraire, les plages ont été longuement inondées. En oct. 1977, nous avons trouvé l'eau retirée; mais une prairie de *Littorella uniflora* couvre uniformément sur des hectares les parties mises à sec. Sa densité est telle que rien n'a pu s'insérer dans le peuplement, sinon quelques malheureuses Menthes.
71. - *Luronium natans* (L.) Raf. (= *Alisma natans* L.)
 - St-Merd-les-Oussines: étang des Oussines avec *Littorella uniflora* (fleuri) et *Isoetes lacustris*. DL 25(4), alt. 840m (L.B. & R.M. août 1975).
 St-Priest-de-Gimel, bonde de l'étang de Ruffaud (signalé par le D^r Puyaubert en juin 1937 (Vu L.B., E.C. & R.M. août 1977)).
72. - *Luzula nivea* (L.) DC.
 - Moustier-Ventadour, DL 32(1), alt. 450m (R.M. juin 1976).
 Quelques pieds sur talus humides, près d'un ruisseau.
73. - *Scirpus fluitans* L.
 Bonnefond, à l'étang d'Anglards (voir 01).
74. - *Rhynchospora fusca* (L.) Ait. f.
 - Beynat, à la Chargeanie. DK 09(1), alt. 500m (R.M. juillet 1975).
 Dans une petite aire marécageuse assez riche.
- + 75. - *Carex pairae* F.W. Schultz
 St-Etienne-aux-Clos. DL 54(3), alt. 600m (R.M. juin 1977).
 "Très typique" (selon E.C. qui a rencontré cette espèce "en de nombreuses localités limousines").
76. - *Leersia oryzoides* (L.) Sw.

- Aubazine, au canal des Moines (voir 41).
- Altiliac, bord de la Dordogne (voir 49).
- 77. - *Botriochloa ischaemum* L. Keng (= *Andropogon isch.* L.)
 - Branceilles sous Long (voir 46)
 - Perpezac-le-Blanc, au puy de Pampelonne. CL 70(1), alt. 320m (L.B. 1977).
- 78. - *Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz & Thell.
 - St-Julien-en-Maumont: chemin bordant champs et friches (voir 32)
(L.B. & R.M. août 1977).
- 79. - *Gaudinia fragilis* (L.) Beauv.
 - Paraît s'introduire un peu partout.
 - Chenailleurs-Mascheix, au Mazeaud (R.M. juin 1974).
 - Chasteaux, au val d'Entrecor. (sortie du 12 juin 1977).
- + 80. - *Aegilops ovata* L.
 - Chasteaux, à Farges. CK 89(2), alt. 250m (R.M. 4 juin 1977).
Colonie dense et relativement étendue sur sol très aride.
- + 81. - *Alopecurus geniculatus* L.
 - Neuvic, à Antiges (voir 10) (R.M. juin 1975). Colonie importante sur sable et limon temporairement inondés.
- 82. - *Trachynia distachya* (L.) Link (= *Brachypodium dist.* (L.) Beauv.)
 - Chasteaux, au-dessus de Roziers. Une touffe dans le chemin, remarquée par M. Chastagnol le 12 juin 1977 (sortie S.B.C.O.).
 - St-Julien-Maumont, route de Branceilles. (voir 32). Bord de vigne.
- + 83. - *Festuca lemanii* Bast.
 - Cette Fétuque, très glauque, est très répandue sur toutes les serpentines du SE de la Corrèze (et sur celles de la Haute-Vienne).

M. Duvigneaud dans sa "Note sur la biogéochimie des serpentines du Sud-Ouest de la France" (mais celles de la Corrèze n'étaient pas alors connues), nomme, avec précautions, ce "taxon pris au sens large": *Festuca longifolia* Thuill", au sens de Hubbard.

M. Kerguelen (Les Graminées de la Flore Française, p. 37), indique que le véritable *Festuca longifolia* reste à définir, et trouve "fort probable que "F. longifolia Thuill." des auteurs britanniques soit en réalité "F. lemanii Bast.".

Localement, il est possible que les n° 1439 et 1440 du Cat. de RUPIN désignent ce taxon sous les dénominations "F. duriuscula L." et "F. duriuscula L. var. glauca Koch (F. glauca Schrad.)"
- + 84. - *Allium ericetorum* Thore (= *Allium ochroleucum* Waldst. et K.)
 - Reygade: abondant sur les serpentines, de part et d'autre du ruisseau qui les traverse.
 - M. L. Brunerye, dans un travail récent (1977) montre par une étude critique qu'il n'existe aucune différence spécifique entre ces deux "taxons".
- 85. - *Allium victorialis* L.
 - Lestards, vers la Vézère sous Coissac. DL 14(1), alt. 620m.
Abondant en sous-bois (RUPIN n° 1214).
 - Chaumeil, au puy de la Jarrige. DL 13(1), alt. 900m (L.B.).
 - St-Yrieix-le-Déjalat, route forestière de Commerly à Péret-Bel-Air. DL 23(1), alt. 830m (R.M. juillet 1977). Trois petites plaques sous chânes et pins.
- 86. - *Lilium martagon* L.
 - Chasteaux, au val d'Entrecor. Indiqué par RUPIN (n° 1198). Revu par L.B., R.M., et lors de la sortie S.B.C.O. du 12 juin 1977).

87. - *Maianthemum bifolium* (L.) Schmidt
Plante des puys de la "Montagne corrèzienne", souvent avec
Vaccinium myrtillus et *Calluna vulgaris*.
- St-Yrieix-le-Déjalat. DL 23(1), alt. 830m (voir 85) (R.M. juillet 1975).
- Chaumeil, au puy de la Jarrige (voir 85) (R.M. juillet 1976).
- Pradines, au puy de Masgoutier. DL 14(2), alt. 830m. (R.M. juillet 1976).
- Soudeilles, au puy de la Tourte. DL 23(4), alt. 820m (R.M. août 1976).
88. - *Scilla autumnalis* L.
- Très répandue sur les serpentines du SE de la Corrèze (voir 04)
- + 89. - *Endymion non-scriptus* (L.) Garcke
- Tulle, près de la Bachellerie. DL 01(2), alt. 340m (R.M. mai 1974).
Un seul groupement au bord d'un pré; le jardinier, M. Maugein,
l'a toujours vu en ce lieu.
90. - *Galanthus nivalis* L. Bords de la Corrèze en colonies très peuplées.
- Naves, où le D.23 accuse un remblai qui touche la rivière.
DL 01(3), alt. 240m (R.M. janv. 1975, ind. par M. Beyne).
- Brive, à l'île des Bordes. CL 80(4), alt. 120m (RUP.)! (vu R.M. fév. 1977).
91. - *Gladiolus segetum* Ker.-G.
Champs et friches.
- St-Julien-Maumont, route de Meyssac à Branceilles (voir 32)
- Chasteaux: au-dessus de Rozières; puy de Crochet (RUP.)!
- + 92. - *Goodyera repens* (L.) R. Br.
- St-Yrieix-le-Déjalat, au Pré-Malhomme. DL 13(4), alt. 740m (Cl.M. juil. 1977).
93. - *Limodorum abortivum* (L.) Swartz
Bord des routes, pelouses sèches.
- St-Julien-Maumont (R.M. avril 1974).
- Chasteaux, près le chemin du Soulier à Rozières (R.M. avril 1977).
94. - *Neottia nidus-avis* (L.) Rich.
- Chasteaux, au val d'Entrecor (R.M. avril 1976).
95. - *Ophrys sphegodes* Mill. (= *O. aranifera* Huds.) ssp. *litigiosa* (Camus) Bech.
Probablement celui signalé dans RUPIN sous le nom de
"*O. pseudospeculum* DC." (en vérité, "non DC").
- St-Julien-Maumont (voir 32) (R.M. avril 1974).
- Chasteaux, chemin de Rozières au Soulier (R.M. avril 1977).
96. - *Ophrys scolopax* Cav.
- Chasteaux, coteaux calcaires (sortie S.B.C.O. du 12 juin 1977).

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

BRUNERYE (L.)

- 1966- Quelques plantes rares ou intéressantes des Monédières, premier complément au Catalogue d'Ernest Rupin. *Bull. Soc. hist. et archéol. de la Corrèze, Brive, t. 88, pp. 10-20.*
- 1969- Un site botanique bien conservé: la vallée sèche de la Couze (Corrèze) *Science et Nature, n° 96, nov. - déc. 1969, pp. 9-16.*
- 1971- Deuxième complément au Catalogue des plantes de Corrèze: stations d'espèces nouvelles, rares ou intéressantes. *Bull. Soc. hist. et archéol. de la Corrèze, Brive, t. 93, pp. 11-17.*

- 1977- Au sujet de l'*Allium* des serpentines du Limousin: *Allium ochroleucum* Waldst. et Kit.=*Allium ericetorum* Thore. *Actes du 102^e Congrès national des Sociétés savantes. Limoges 1977*, Sciences, fasc. I, pp. 359-366.
- BRUNERYE (L.) et MAISONNEUVE (R.)
1975- Troisième complément au Catalogue des Plantes de Corrèze. *Bull. Soc. hist. et archéol. de la Corrèze, Brive, t.97, 1975. pp. 29-36.*
- CHASSAGNE (M.)
1956-1957- Inventaire analytique de la Flore d'Auvergne et contrées limitrophes des départements voisins. 2 vol. t.1, 1956, XL + 458 p. *Paris (Lechevalier édit.)*.
- COSTE (H.)
1901-1906- Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes. 3 vol. *Paris (Paul Klincksieck édit.)*. 2^e tirage 1937, *Paris, Librairie des Sciences et des Arts.*
- DUVIGNEAUD (P.)
1966- Note sur la biochimie des serpentines du Sud-Ouest de la France. *Bull. Soc. Royale de Bot. de Belgique, t.99, fasc. 2, pp.271-329.*
- GUINOCHET (M.) et VILMORIN (R. de)
1973-1975- Flore de France. 2 vol. parus. *Paris (Edit. du Centre National de la Recherche scientifique)*.
- JOVET (P.) et VILMORIN (R. de)
1972-1977- Flore descriptive et illustrée de la France par l'abbé H. Coste. 1^e, 2^e, 3^e, 4^e Suppléments. 4 vol. Quatrième Supplément, 1977 (renferme les genres *Armeria* et *Euphorbia*), pp. 339-478. *Paris (Librairie scientifique et technique Albert Blanchard)*.
- KERGUELEN (M.)
1975- Les Gramineae (Poaceae) de la flore française. Essai de mise au point taxonomique et nomenclaturale 1 vol., 343 p. *Lejeunia. Revue de Botanique. Nouvelle série n° 75, août 1975.*
- LE GENDRE (Ch.)
1914-1922- Catalogue des plantes du Limousin. 2 vol. 312 et 410 p. *Edité par la Soc. bot. et d'Etudes scient. du Limousin. Limoges.*
1926- Supplément au Catalogue des plantes du Limousin. *Ibid.*, 94 p.
- MAISONNEUVE (R.)
1975- Introduction à l'étude des serpentines de la Corrèze. *Bull. Soc. Bot. du Centre-Ouest, n.s., t.6, pp. 38-42.*
1977- Compte rendu de la sortie de la S.B.C.O. à Chasteaux le 12 juin 1977. *Ibid. t. 8.* (voir aussi: BRUNERYE (L.) et MAISONNEUVE (R.)).
- ROUY (G.)
1893-1913- Flore de France. 14 vol. t.12, 1910, 505 p.(renferme le genre *Euphorbia*). *Edité par la Sté. des Sc. nat. de la Charente-Inf.*
- RUPIN (E.)
1884- Catalogue des plantes qui croissent dans le département de la Corrèze. *Extrait du Bull. soc. scient. hist. et archéol. de la Corrèze, Brive. Marcel Roche, imprimeur.*
- TUTIN (T.G.), HEYWOOD (V.H.) et COLL.
1964-1976- *Flora Europaea*. 4 vol. parus. *University Press, Cambridge.*

-\$-