COMPTE RENDU DE LA SORTIE D'INITIATION DU 28 MAI 1978 DANS LES BOIS DE ST-PIERRE À SMARVES (VIENNE).

Ayant eu à constater à maintes reprises le haut degré d'ignorance de toutes les couches de la population, même les plus cultivées, en matière de botanique de terrain, et me heurtant en particulier à l'absence quasi totale de collaborateurs ou correspondants pour reprendre l'inventaire des richesses naturelles de la Vienne (très en retard sur beaucoup de départements à ce point de vue), j'ai pris l'initiative de cette sortie pour débutants, dans un lieu connu et recherché des Poitevins, et à flore assez riche, en une période ou l' "écologie" est à la mode. Annonces habituelles de la Société, répercutées par la SPNE (Société pour la protection de la Nature et de l'Environnement dans la Vienne), par la Presse locale, beau temps insolent en plus, rien n'y fit: à peine quinze personnes en tout! Encore faudrait-il décompter à part trois ressortissants de départements voisins, dont Mr CHASTAGNOL et Madame, Mr DEGENNE, de Châtellerault, trois élèves d'Agro, venus sans doute grâce au louable prosélytisme de leur professeur, Mr DUFAY, qui les accompagnait, un étudiant d'origine égyptienne, venu en sympathisant, pour apprécier la modicité de la contribution purement pictave (sur 100.000 habitants)! Cela fait peu de troupes fraîches en perspective pour nourrir l'inventaire! Que ne s'agissait-il de champignons: la mycophagie eût attiré les foules!

Bref, le parcours permit de montrer les espèces de la chênaie sessiliflore (*Ilex aquifolium, Lonicera periclymenum, Teucrium scorodonia, Sorbus torminalis...*), quelques représentants de la chênaie pubescente (*Melittis melissophyllum, Lithospermum purpurocaeruleum...*), de la chênaie-frênaie (*Aquilegia vulgaris, Iris foetidissima, Helleborus foetidus, Neottia nidus-avis...*) et de la chênaie-charmaie (*Endymion non-scriptus, Ornithogalum pyrenaicum, Phyteuma spicatum, Sanicula europaea, Euphorbia amygdaloides...*), bien que la date tardive ait privé les participants de l'apogée florale printanière (*Anemone nemorosa, Isopyrum thalictroides* ne se montraient plus guère). Bien en feuilles par contre, les nombreuses espèces d'arbres présentes purent être efficacement passées en revue.

Y. BARON

---oooOooo---