

- La Roche-Canillac, route de Gumont (D 131), talus d'un bois au sud de l'étang du Clos. Alt. environ 450m, DL 10 (E.C. 5-VIII-1971).
- La Roche-Canillac, vallée du Doustre, r. dr., à l'est de la Roche-Hausière, R. Alt. 350m, DL 10 (E.C. 20-VII-1973).
- Saint-Martin-la-Méanne, route de la Roche-Canillac (D.29), talus dans une grande descente, à 3, 4 km environ après la première localité. Alt. env. 400m, DL 10 (E.C. 24-V-1972); sur la même route, près Lafarge, R. alt. 480m DL 20 (E.C. 5-VIII-1971).
- Champagnac-la-Prune, route de St-Bazile-de-la-Roche (D.131), R. au pont sur le ruisseau de Champagnac; abondant plus loin, à quelques km au sud de Champagnac, talus ombragés et rochers suintants, vallée du Doustre. Alt. 403 et env. 300m, DL.10 (E.C. 18-VI et 24-V-1972).
- Saint-Bazile-de-la-Roche, au nord, entre le village et le pont sur le ruisseau de Fraysse, sur la D.131, talus. Alt. env. 250m, DL 10) (E.C. 24-V-1972).
- Saint-Bonnet-Elvert, entre le Chazal et Frègefent, fossé d'un bois à 900m environ au nord-ouest du Chazal, R. Alt. env. 350m DK 19(E.C. 17-VI-1972).
- Entre Reygade et Mercoeur, bord sud de la D 136, talus ombragé, très abondant. Alt. env. 480m, DK 18 (R.M., E.C. et R. DAUNAS, 30-VII-1975).
- Donzenac, route de la Rochette, fossé au sud de la Bonnie, avant le pont. Alt. 300m, CL 81 (E.C. 23-VII-1971).
- Donzenac, route de Travassac (D.25), fossé près du chemin des Saulières. Alt. env. 190m, CL 80 (E.C. 23-VII-1971).
- Donzenac, à Travassac, route de Ste-Féréole (D 25), disséminé sur près de 400m. Alt. env. 310m CL 80 (E.C. 23-7-1971).
- Saint-Merd-de-Lapleau, sur la D.13, dans la grande côte de la r. dr. de la Dordogne, en venant du Pont de Chambon, à gauche, talus et fossé à 900m avant le chemin de la Chauvarie; et à moins de 200m plus haut, très abondant sur plus de 100m avec *Th. phegopteris*. Alt. 470 et 500m env., DL 20 (E.C., 6-IX-1978).
- Auriac, vallée de la Dordogne, r. g., sur la D 65, talus humide à gauche en descendant vers le Pont du Chambon, à 330m d'alt. environ, DL 30 (E.C. 6-IX-1978).
- Chamberet, route de Treignac (D.16), à droite, peu après Chastangeaux, fossé du bois, R. Alt. env. 430m, DL 04 (E.C. 24-VII-1971).
- Vu à Beaumont, route de St-Augustin (D.142), fossé nord à l'est de Ceignola, par places sur près de 200m. Alt. env. 480m, DL 03. (H. BOUBY et E.C. 7-VIII-1972).
- Vu à Saint-Augustin, talus et fossé de la D 128 près du hameau "la Forêt de Chauzeix", R. Alt. env. 700m, DL 03. (P. BIGET et E.C. 18-VIII-1971).
- Vu à Lestard, au sud de Vaud, talus est de la route (à l'est du lac des Bariousses). Alt. env. 550m; DL 04. (P. BIGET et E.C. 18-VIII-1971).
- Vu à Affieux, à 600m environ au sud du village, fossé et talus de la route de Peyrissac (D.3E), abondant sur 50m. Alt. env. 490m, DL 04. (E.C. 24-VII-1971).

Obs.- Les 4 dernières localités se situent dans la région des Monédières où L. BRUNERYE (1966) le dit "T.C."

100 .- *Thelypteris phegopteris* (L.) Slosson in Rydb. (*Phegopteris polypodioides* Fée) Circumbor. (boréo-alp.)

- Gimel, base de rochers humides, r.g. de la Montane, en amont du site des Cascades. Alt. 421m, DL 01. (R. CHASTAGNOL. Vu E.C. 4-VIII-1971).
- La Roche-Canillac, talus de la route de Gumond, (D.131), au sud de l'étang du Clos, belle station. Alt. env. 450m, DL 10. (E.C. 5-VIII-1971).

- Saint-Martin-la-Méanne, route de la Roche-Canillac (D 29), talus dans une grande descente, à 3,4 km environ après la première localité, belle station avec *Thel. limbosperma*. Alt. env. 400m, DL 10. (E.C. 24-V-1972); et à Lafarge, sentier à 250m à l'est du calvaire de la cote 499, en descendant vers le ruisseau de la Bessade, R. Alt. env. 480m, DL 20. (E.C. 5-VIII-1971); bord est de la D 18 à 2 km au nord du bourg, lieu dit "la Maison Rouge", base d'un vieux mur humide, assez abondant. Alt. 520m, DL 20. (E.C. 5-VIII-1971).
- Champagnac-la-Prune, route de St-Bazile-de-la-Roche, au pont de la cote 403 sur le ruisseau de Champagnac (hêtraie-charmaie). DL 10. (E.C. 18-VI-1972).
- Saint-Merd-de-Lapleau, sur la D 13, dans la grande côte de la r. dr. de la Dordogne, en venant du Pont du Chambon, à gauche, talus, fossé et marge herbeuse humide, très abondant sur 100m et plus, avec *Th. limbosperma*, à 600m environ avant le chemin de la Chauvarie. Alt. env. 500m, DL 20. (E.C. 6-IX-1978).
- Moustier-Ventadour, route d'Egletons à Lamazière-Basse (D.991), dans la grande descente vers le pont des Bouyges sur la Luzège, talus et rochers suintants, en 3 points, abondant. Alt. 550-500m env., DL 32. (E.C. 23-V-1972)
- Saint-Etienne-aux-Clos, r. dr. du Chavanon, pente boisée, au sud de l'ancienne gare de Savennes, localisé. Alt. env. 600m, DL 54. (R.M. 30-V-1978) (Vu la station E.C. 21-VIII-1978).

Obs.- L. Brunerye (1966) l'indique dans les Monédières: "Bords de ruisseaux, rochers humides: Laval, Cors (c^{ne} de Veix), alt. 600-800m; Treignac, au Rocher des Folles, alt. 450m. RUPIN".

ASPLÉNIACÉES

- 10² .- *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. X *A. trichomanes* L. = *Asplenium X alternifolium* Wulfen (*A. X germanicum* auct.; *A. X breynii* Retz.) *A. septentrionale*: subcircumbor. mont.; *A. trichomanes*: subcosmopolite.
- Saint-Martin-la-Méanne, route de Marcillac-la-Croisille, 2 touffes sur un vieux mur, inter parentes. Alt. env. 500m, DL 20 (E.C. 6-VIII-1971); vieux mur, à Rame, 2 touffes inter parentes. Alt. env. 480m, DL 10 (E.C. 20-VII-1973).
 - Lamazière-Basse, route d'Egletons (D 991) rochers, dans la grande descente vers le pont des Bouyges sur la Luzège, à 250m environ avant ce pont, une touffe, non loin des parents. Alt. env. 450m, DL 32 (E.C. 23-5-1972).
- Obs. Signalons 2 stations récemment détruites:
- Lamazière-Basse, vieux mur du village, 2 touffes (E.C. 23-5-1972).
 - Neuvic, entrée nord par la D 982, sur un vieux mur actuellement démoli, 3 touffes dont une énorme large de 25 cm (E.C. 23-V-1972).
- + 101.- *Asplenium adiantum-nigrum* L. X *A. septentrionale* (L.) Hoffm. = *Asplenium X contrei* Callé, Lovis et Reichstein (v. bibliographie). *A. adiantum-nigrum*: paléo-temp.; *A. septentrionale*: subcircumbor. mont.
- Saint-Martin-la-Méanne, hameau au nord-nord-ouest, sur un vieux mur, une seule touffe, inter parentes. Alt. env. 480m, DL 20 (E.C. 6-VIII-1971). Malheureusement, le 5-IX-1978, nous n'avons pu que constater sa disparition, due, croyons-nous, à des causes naturelles.
- Obs. Ce rarissime hybride fut trouvé pour la première fois en France au col d'Aspin (Hautes-Pyrénées) à 1470m d'altitude, 3 touffes, inter parentes (H. KUNZ et T. REICHSTEIN, 9-X-1969).

L'*Asplenium X souchei* R. de Litard. (= *Aspl. ad.-nigrum X septent.* R. de Litard.) est en réalité un *Asplenium billotii X septentrionale*.

ATHYRIACÉES

- 11² .- *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. subcosmopolite.
 - Saint-Pardoux-le-Vieux, à Daubech, vieux murs, vu en 2 points, abondant. Alt. env. 700m, DL 45 (E.C. 19-VII-1973).
 - Neuvic, vers la sortie, route d'Egletons (D.991), à droite, talus terreux et base d'un mur, abondant. Alt. env. 600m, DL 42 (E.C. 23-V-1972).
 - Lamazière-Basse au pont sur le Vianon, route de Neuvic, RR. Alt. 536m, DL 32 (E.C. 23-V-1972).
 - Clergoux, mur, R. Alt. env. 500m, DL 11 (E.C. 5-VIII-1971 etc...).
 - Chavanac, murs de l'église. Alt. env. 900m, DL 25 (Cl. SARRASSAT, 22-VIII-1938 in Pteridophyta exsiccata WALTER-CALLÉ, 2° fasc. 1938, n° 169).
 Obs. L. BRUNERYE (1966) l'indique à "Treignac dans le bourg R., Auliac AC., Alt. 500-600m RUPIN; Veix: entre la cimetière et l'église AR., alt. 600m".

ASPIDIACÉES

- 102 .- *Polystichum aculeatum* (L.) Roth (*P. lobatum* (Huds) Chevall.)
 Eur. temp.-O asiat.
 - Lamazière-Basse, route d'Egletons (D 991) dans la grande descente vers le pont des Bouyges sur la Luzège, ravin du Pré Neuf, à 600m environ avant ce pont, AC, chânaie-hêtraie. (*P. setiferum* absent). Alt. env. 465m, DL 32. (E.C. 23-V-1972).
 - Merlines, pente boisée de la r. g. de la Barricade (chêne péd., ch. sessile, hêtre) sur la D 92 (route de Savennes), ravins de la cote 675 et surtout de la cote 631 où il est assez abondant (*P. setiferum* absent). DL 55. (E.C. 20 et 21-VIII-1978).
 Obs. L. BRUNERYE (1971) le dit "répandu en Haute-Corrèze, mais toujours R: Soudaine-Lavinadière, Madranges, Monestier-Port-Dieu, Bort". Le même auteur (1966) l'indique sur un "talus ombragé, près du Peuch, R (Cne d'Af-fieux, alt 600m)".
- + 103 .- *Dryopteris oreades* Fomin (*D. abbreviata* auct., non DC.)
 Surtout O eur. mont., mais répartition incomplètement connue
 - Auriac, pont sur le Courpou, éboulis récent de grosses pierres au-dessus d'un fort mur de soutènement. Alt. env. 450m, DL 30 (R.M. 25-VIII-1978).
- 104 .- *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs (*D. spinulosa* Watt)
 Euro-asiat. temp.- N amér.
 - Ravin du Pont-de-Cornil. Alt. env. 200m, CL 90 (R.M. vu la station E.C. 8-VIII-1977).
 - Donzenac, fossé de la route de Travassac (D.25) R. Alt. env. 190m, CL 80 (E.C. 23-VII-1971).
 - Entre Reygade et Mercoeur, bord sud de la D.136, R., avec *Thelypteris limbosperma*. Alt. env. 480m, DK 18 (R.M., E.C. et R. DAUNAS 30-VII-1975).
 - La Roche-Canillac, vallée du Doustre à l'est de la Roche-Haussière où il est plus rare que *D. dilatata*. Alt. env. 330m, DL 10 (E.C. 6-VIII-1971).
 - Saint-Martin-la-Méanne, à Lafarge, et route de la Roche-Canillac (D.29), R. Alt. env. 490 et 400m, CL 20 et CL 10 (E.C. 5-VIII-1971 et 24-V-1972).
 - Ségur-le-Château, fossé de la route d'Arnac-Pompador, R. Alt. env. 320m, CL 63 (E.C. 22-VII-1971).

- Vigeois, ravin du ruisseau de Bois-Foirail au sud du tunnel de la cote 260, R. CL 82 (E.C. 22-VII-1971).
 - Moustier-Ventadour, sur la D 991, près du pont des Bouyges sur la Luzège, R. Alt. env. 450m, DL 32 (E.C. 23-V-1972).
 - Lamazière-Basse, ravin du Pré Neuf, route d'Egletons, (D.991) à 600m avant le pont des Bouyges sur la Luzège, AC. Alt. env. 467m, DL 32 (E.C. 23-V-1972).
 - Marcillac-la-Croisille, à Teyssonnière, base d'un mur, R. Alt. env. 520m, DL 21 (E.C. 5-VIII-1971).
 - Saint-Etienne-aux-Clos, pente boisée de la r. dr. du Chavanon, en aval de l'ancienne gare de Savennes, R. Alt. env. 600m, DL 54 (E.C. 21-VIII-1978).
 - Bois de Charel, c^{ne} de Rilhac-Xaintrie, sur la route de Spontour à Auriac (D.75), ravin près du pont de Spontour, R. Alt. env. 350m, DL 30 (E.C. 6-IX-1978).
 - Ussel, bois au sud de Gardet, sur la N.89, R. Alt. env. 630m, DL 44 (E.C. 22-VIII-1978).
 - Saint-Angel, lande marécageuse à *Peucedanum palustre*, sur la N.89, à la limite d'Ussel, R. Alt. env. 680m, DL 44 (E.C. 22-VIII-1978).
 - L'Eglise-aux-Bois, vallon du ruisseau de la Celle, près du moulin du Firmigier, sur la D.940. Alt. env. 560m, DL 05 (E.C. et R. DAUNAS 28-VII-1975).
 - Saint-Merd-les-Oussines, ruisseau du moulin du Merle près Fournol, R. Alt. env. 800m, DL 25 (E.C. 5-VII-1973).
 - Tarnac, secteur sud des bois de Tarnac, ruisseau de Lavalière entre la D. 109 et la D.160, RR, avec *D. dilatata* C. Alt. env. 770m, DL 15 (E.C. 4-VII-1973).
 - Environs de Treignac, site des Folles, r. g. de la Vézère, c^{ne} d'Affieux, R, avec *D. dilatata* AC. Alt. env. 440m, DL 04 (E.C. 24-VII-1971).
 - Affieux, ruisseau à 600m au nord du village, au pont de la D.3E (route de Peyrissac) avec *D. dilatata*. Alt. env. 490m, DL 04 (E.C. 24-VII-1971).
- Obs. M.L. BRUNERYE l'indique sur le plateau des Monédières, dans les fissures des sommets rocheux (Cahiers des Naturalistes, Bull. des N.P., n.s.1962, t. 18, p. 64).

- 105 - *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray. Euro-S 0 asiat.
- Gimel, site des Cascades, AC, et rochers de la r. g. de la Montane en amont. Alt. 350-420m env. DL 01 (E.C. 4-VIII-1971).
 - Donzenac, à la Rochette, talus ombragé près du château d'eau, R. Alt. 330m, CL 81 (E.C. 23-VII-1971).
 - Aubazine, ravin d'un petit affluent du Coiroux près du pont sur la route de Palazinges (D.130), R. Alt. env. 290m, CL 90 (E.C. et R.M., avec la S.B. C.O. 3-IX-1978).
 - La Roche-Canillac, r. dr. du Doustre, à l'est de la Roche-Haussière AC en aval de la cote 328 sur la pente boisée (avec *D. carthusiana* plus R.) et en amont sur la c^{ne} de Gumond. DL 10 (E.C. 6-VIII-1971. Vu la station R.M. 30-VII-1975).
 - Champagnac-la-Prune, ruisseau de Champagnac au pont de la cote 403 sur la route de Saint-Bazile (D.131), AC, hêtraie-charmaie. DL 10 (E.C. 18-VI-1972).
 - Auriac, route du pont du Chambon (D 65), petit ravin près de ce pont, R. Alt. env. 330m, DL 30 (E.C. 6-IX-1978).
 - Saint-Etienne-aux-Clos, au pont de la cote 602 sur la Barricade, route de Merlines à Savennes (D.92), rochers de la r. dr. DL 55 (E.C. 20-VIII-1978).
 - Tarnac, à Chabennes, talus et base d'un vieux mur du hameau sur la D.109. Alt. 820m, DL 25 (E.C. 5-VII-1973).
 - Tarnac, secteur sud des bois de Tarnac, le long du ruisseau de Lavalière, entre la D.109 et la D.160, C partie haute près de la D.109. Alt. moy. 780m,

DL 15 (E.C. 4-VII-1973).

- Saint-Merd-les-Oussines, ruisseau du moulin du Merle près Fournol, RR. Alt. env. 800m, DL 25 (E.C. 5-VII-1973).

- Affieux, à 600m au sud du village, ruisseau, avec *D. carthusiana*. Alt. env. 490m, DL 04 (E.C. 24-VII-1971).

- Environs de Treignac, site des Folles, r. g. de la Vézère, c^{ne} d'Affieux, AC (*D. carthusiana* R). Alt. env. 440m, DL 04 (Vu E.C. 24-VII-1971).

- Saint-Yrieix-le-Déjalat, près du pont de Franchesse sur la Corrèze, route de Treignac. Alt. env. 580m, DL 13 (R.M. 8-VII-1978. Vu la station E.C. 22-VIII-1978).

Obs.- L. BRUNERYE (1971) le dit " AC en Haute-Corrèze: Treignac, Veix, Lestards, Saint-Yrieix-le-Déjalat, etc...". Cette espèce était confondue avec *D. carthusiana* par les anciens botanistes sous le nom de *Polystichum spinulosum*. Aussi toutes les localités citées dans RUPIN (p.265) auraient besoin d'être vérifiées.

I06 .- *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm. (= *Currantia dryopteris* (L.) Wherry; *Dryopteris linnaeana* C. Christensen). Subcircumbor. (boréo-alp.)

- Saint-Etienne-aux-Clos, pente boisée de la r. dr. du Chavanon au sud de l'ancienne gare de Savennes, localisé, tout près de *Thelypteris phegopteris*. Alt. env. 600m, DL 54 (R.M. 30-V-1978) Vu la station E.C. 21-VIII-1978).

- Sur la D.92 (route de Merlines à Savennes), aux environs immédiats du pont de la cote 602 sur la Barricade, rochers, parois suintantes, AC (c^{nes} de Merlines et de St-Etienne-aux-Clos). DL 55 (E.C. 20-VIII-1978) (M.L. BRUNERYE l'a signalé à St-Etienne-aux-Clos. Cf. infra: "Obs.")

- Auriac, route de Spontour (D 75), talus humide au pont de la cote 434, abondant (R.M. 25-VIII-1978. Vu la station E.C. 6-IX-1978).

- Mestes, au Pont Rouge sur la Diège, abondant. Alt. 554m, DL 43 (E.C. 6-VII-1973. Vu la station R.M. 21-VI-1978).

- Moustiers-Ventadour, sur la D.991, en plusieurs points dans la grande descente vers le pont des Bouyges sur la Luzège, abondant. Alt. moy. 500m, DL 32. (E.C. 23-V-1972).

- Saint-Martin-la-Méanne, vieux mur humide sur la D.18 à 2 km au nord du village, R. Alt. 520m, DL 20 (E.C. 5-VIII-1971).

- Champagnac-la-Prune, base d'un mur tout au nord du village, sur la D.131, 7-8 touffes. Alt. env. 470m (E.C. 6-VIII-1971).

- Treignac, vieux mur humide sur le petit chemin de Pré-Palier, r. g. de la Vézère, R. Alt. env. 460m, DL 04. (Vu E.C. 24-VII-1971). (Cf. infra).

Obs.- L. BRUNERYE (1971) signale qu'il "n'est pas rare dans les ravins de la H^{te}-Corrèze: Treignac, Lestards, Viam, Bonnefond, St-Etienne-aux-Clos, Monestier-Port-Dieu, Roche-le-Peyroux".

POLYPODIACÉES

I07 .- *Polypodium australe* Fée (*Polypodium serratum* (Willd.) Sauter). Médit.- atlantique.

- Aubazine, murs près de la place, RR. Alt. env. 250m, CL 90 (Vu E.C. 4-IX-1978. Station anciennement connue: Catal. LE GENDRE, II p.392).

Embranchement des SPERMATOPHYTES (PHANÉROGAMES)

1.- Classe des DICOTYLÉDONES

SALICACÉES

- 108 .- *Salix pentandra* L. Euro-asiatique (boréo-alpin)
- Saint-Dezéry, étang sur le bord est de la N.89 au sud de Venard, 5-6 sujets souffreteux, 1m de haut, dans la cariçaie à *Carex rostrata*. Alt. env. 720m, DL 44 (E.C. 9-VIII-1977. Vu la station R.M. 7-IX-1977).

ULMACÉES

- 109 .- *Ulmus glabra* Huds. (*U. montana* With.; *U. scabra* Miller).
Euro-O asiat., tendance mont.
- Merlines, vallée du ruisseau de la Barricade, r. g., ravin de la cote 631 à l'ouest de Couleyroux-de-Gioux, R. Alt. env. 635m, DL 55 (E.C. 21-VIII-1978. Vu la station R.M. 7-IX-1978).
- Obs.- Selon l'abbé LAUBIE: "Grande Roche, Tulle, au Pont des Soldats". (Suppl. LE GENDRE, p.88). Spontané?

SANTALACÉES.

- 110 .- *Thesium pyrenaicum* Pourret (*T. pratense* Ehrh. ex Schrad.)
Cent. et S O eur. mont.
- Saint-Merd-les-Oussines, pente herbeuse proche du moulin du Merle près Fournol. Alt. env. 800m, DL 25. (E.C. 5-VII-1973).

POLYGONACÉES

- 111 .- *Polygonum minus* Huds. Euro-asiat.temp. et subarct.
- Neuvic, à Antiges, grèves du lac de retenue, abondant. Alt. 600m, DL 42. (R.M. 1976. Vu la station E.C. 3-IX-1977).
- + 112 .- *Polygonum polystachyum* Wall. ex Meissner. Himalaya. Subsp. ou natur.
- Pérols-sur-Vézère, à Barsanges, rue du Village au pied d'un mur de jardin. alt. env. 840m, DL 14. (E.C. 8-IX-1977. Vu la station R.M. oct. 1977).
- Obs.- Cette espèce n'avait été signalée, à notre connaissance, ni en Limousin ni dans le Centre-Ouest.
- + 113 .- *Rumex crispus* L. X *R. obtusifolius* L. ssp. *obtusifolius* = *Rumex X pratensis* Mert. et Koch. (*R. X acutus* auct.)
Les deux parents: subcosmop.
- Neuvic, à Antiges, rive ouest du lac de retenue, limons, plusieurs pieds inter parentes. Alt. 600m, DL 42. (E.C. et R.M. 7-IX-1977, fts).
- Ussel, fossé à 700m au nord du Pont Tabourg, sur la D.982, inter parentes. Alt. env. 600m DL 44 (E.C. et R.M. 7-IX-1977).
- + 114 .- *Amaranthus bouchonii* Thellung. Origine incertaine.
Apparu à Bordeaux en 1925, il était à Tulle en 1938 (M. GALINAT, Bull. Soc. Bot. de France, 1938, p.315). Il s'y trouve toujours (R.M. Vu E.C. 1977). Aucune donnée sur sa progression de 1938 à 1971, mais de 1971 à 1978, sa présence a été constatée en de nombreuses localités (rues, terrains vagues,

abords des gares, cultures mêmes):

- Donzenac, Sainte-Féréole, Venarsal, Aubazine, Voutezac, Saint-Hilaire-Peyroux, Chameyrat, Marcillac-la-Croisille, Clergoux, Champagnac-la-Prune, Treignac, Bort-les-Orgues, Soursac, Beynat, Argentat (E.C.), ce qui correspond aux divisions:

CL 71	CL 80	CL 81	CL 90	CL 91		
DL 01	DL 04	DL 10	DL 11	DL 21	DL 30	DL 62
DK 09	DK 19					

CARYOPHYLLACÉES

- 152 .- *Sagina subulata* (Swartz) C. Presl. Eur. (Subméditerranéenne-Subatlantique:P.F.)
- Saint-Paul, aire plane du bord de route près Chataur. Alt. 540m, DL 10 (R.M. 29-VI-1978).
- 162 .- *Lychnis viscaria* L. ssp. *viscaria* . Euro- O asiat.
- Bort-les-Orgues, bord de la Rhue et du chemin d'accès. Alt. 440m, DL 62 (R.M. 29-VI-1978).
- 192 .- *Cucubalus baccifer* L. Subméditerranéenne et S euro-asiatique. temp.
- Monceaux-sur-Dordogne, à Fenevrol, talus. Alt. env. 170m, DK 18 (H. BOUBY et E.C. 9-VIII-1972).

RENONCULACÉES

- 115 .- *Isopyrum thalictroides* L. Subméditerranéenne- eur.
- Saint-Etienne-aux-Clos: ravin d'un petit affluent du Chavanon qui traverse l'ancienne voie ferrée (sous un pont!). Alt. 600m, DL 54 (R.M. 30-V-1978).
Selon RUPIN (Catal. p.19), est indiqué par LAMY "C. dans la Corrèze". Mais rappelle que LAMY de la CHAPELLE a indiqué "de mémoire" des localisations(?) d'espèces dont il n'avait plus de références depuis de nombreuses années!...
Quant à LE GENDRE (Catal. I p.26), il cite l'unique localité de "Bort, vallée de la Dordogne (D^r LONGY)".

FUMARIACÉES

- 222 .- *Corydalis claviculata* (L.) DC. ssp. *claviculata* Eu atlantique.
- Peyrelevade, à la Cour, abondant sur un vieux mur. Alt. 776m, DL 26 (E.C. 19-VII-1973).
- Saint-Rémy, rochers de la r.g. de la Liège, à 100m au sud du pont de chemin de fer (sur la Liège) situé au sud de Mirambel, abondant. Alt. 680 m, DL 45 (E.C. 22-V-1972).
- Tarnac, haie au Trech. Alt. 722m, DL 16, et pente boisée sur la D 109 entre Tarnac et le pont de Guillaume sur la Vienne. Alt. env. 650m, DL 15, (E.C. 4-VII-1973).
- + 116 .- *Corydalis ochroleuca* Koch ssp. *ochroleuca* S. eur. Subsp. ou natur.
- Donzenac, à Espeyrut, vieux mur sur la N.20, assez abondant. Alt. env. 280m, CL 81 (E.C. 23-VII-1971).

CRUCIFERES.

- 117 .- *Rorippa islandica* (Oeder) Borbás (*R. palustris* (L.) Besser; *Nasturtium palustre* (L.) DC.). Devenu subcosmopolite.
- Neuvic, grèves sur la rive ouest du lac de retenue, à Antiges. Alt. 600m DL 42 (R.M. 1975. Vu la station E.C. 7-IX-1977).

- Bort, r. dr. de la Rhue en aval du Saut de la Saule, R. Alt. 439m, DL 62 (E.C. 7-IX-1978).

Obs.- Nos échantillons rentrent dans *R. islandica* s.l. Une étude plus poussée n'en a pas été faite. Il est probable qu'ils appartiennent à *R. palustris* plutôt qu'à *R. islandica* sensu stricto.

24² .- *Lepidium heterophyllum* Benth. Subatlantique.
- Aubazine, remblai de la D 48 au SO du bourg, près du calvaire, avec *Andryala integrifolia*. Alt. env. 265m, CL 90 (E.C. 4-IX-1978).

.- *Lepidium virginicum* L.

N et Cent. amér. devenant subcosmopolite. Advent. et natur.

Dans le Supplément LE GENDRE (1926) p. 74, l'abbé LAUBIE remarquait déjà "Devient CC partout. Donzenac, Tulle, Allassac, Brive, Ussac", et LE GENDRE ajoutait: "Plante nouvelle pour la Corrèze".

Existe toujours à Donzenac, Allassac (E.C. 1971), Tulle (R.M. 1977). Nombreuses autres localités (rues, terrains vagues, souvent adventice ferroviaire):

- Cimetière de Chamberet (R. LUGAGNE 1964); Aubazine (R.M. 1978. Vu E.C.).

- Sainte-Féréole, Chameyrat, la Roche-Canillac, Champagnac-la-Prune, Peyrissac, Vigeois, Argentat, Monceaux-sur-Dordogne, Laval-sur-Luzège, Sour-sac, Bort-les-Orgues (E.C. 1971-1978), ce qui correspond aux divisions:

CL 80	CL 81	CL 82	CL 90	CL 91	CL 92	CL 93
DL 01	DL 04	DL 10	DL 30	DL 31	DL 52	DL 62
DK 19.						

25² .- *Coronopus didymus* (L.) Sm. S amér. Adventice natur.

- Chameyrat, terrain vague sur la N 89 à 250m environ au sud-ouest du pont de Mulatet, assez abondant. Alt. env. 190m, DL 01 (E.C. 4-IX-1978).

CRASSULACÉES

119 .- *Sedum dasyphyllum* L. Submédit.

- Sainte-Féréole, localement abondant sur un mur du village. Alt. env. 400m, CL 80 (E.C. 22-VII-1971).

- Argentat, mur au nord du bourg. Alt; env. 190m, DK 19 (A. LAWALRÉE et E.C. 9-VII-1972).

OBS.- Etait déjà connu à Argentat (Catal. LE GENDRE, 1 p.245) et à Sainte-Féréole où l'abbé LAUBIE l'avait signalé ainsi qu'à Donzenac et à Tulle (Suppl. LE GENDRE, p. 79)

GROSSULARIACÉES

120 .- *Ribes alpinum* L. Euro-O asiat.- N afr. mont.

- Lamazière-Basse, ravin du Pré Neuf près du pont des Bouyges sur la Luzège, R (hêtraie et résineux). Alt. 467m, DL 32 (E.C. 23-V-1972).

- Mestes, au Pont Rouge sur la Diège. Alt. 554m, DL 43 (E.C. 6-VII-1973).

- Feyt, pente boisée sur le bord nord de la N 89 à l'ouest du pont sur le Chavanon, R. Alt. env. 640m, DL 65 (E.C. 9-VIII-1977).

- Merlines, gorges du ruisseau de la Barricade sur la D 92, ravins de la cote 675 et de la cote 631 sur la D 92 (chêne péd., chêne sessile, hêtre), DL 55 (E.C., 20 et 21-VIII-1978).

- Saint-Etienne-aux-Clos, gorges du ruisseau de la Barricade, vu au pont de la cote 602 sur la D 92, DL 55. Gorges du Chavanon, vu r. dr. au sud de la gare de Savennes. Alt. env. 600m, DL 55 (E.C. 20 et 21-VIII-1978).

Obs.- Indiqué d'autre part à Chasteaux, bois de la vallée d'Entrecor, CK 89 (L. BRUNERYE, 1971).

ROSACÉES

- 121 .- *Agrimonia procera* Wallr. (*A. odorata* auct., non Mill.) Eur.
 - Brivezac, r. dr. de la Dordogne entre Valeyrans et le Peyrignet. Alt. env. 150m, DK 08 (E. C. 17-VI-1972).
 - Saint-Eloy-les-Tuileries, sur la D.6 en face du village et près du pont sur la Boucheuse. Alt. env. 300m, CL 63 (E.C. 22-VII-1971).
 - Ségur-le-Château, route d'Arnac-Pompadour (D.6). Alt. env. 300m, CL 63. (E.C. 22-VII-1971).
 - Uzerche, sur la D.3 au sud du chemin de Chambourg, abondant sur plusieurs centaines de mètres parmi les *Pteridium*. Alt. env. 390m, CL 83. (E.C. 24-VII-1971).
 - Champagnac-la-Prune, aux Vergnes, R. Alt. 471m, DL 10. (E.C. 5-VIII-1971).
- 272 .- *Aphanes microcarpa* (Boiss. et Reut.) Rothm.
 Euro-N afr. (ailleurs? aire à préciser).
 - Saint-Paul, avec 152, *Sagina subulata*, aire plane du bord de route près Chataur. Alt. 540m, DL 10. (R.M. 29-VI-1978).
 Obs.- Plante méconnue, à rechercher.

- 122 .- *Prunus padus* L. Euro- O asiat.- N afr. surtout mont.
 - Hêtraies, dans la forêt de Bellechassagne, R. Alt. env. 800m, DL 34. (R. de LITARDIERE, 1911-1912).
 - Valièrgues, à l'Artaude, haie, assez abondant. Alt. env. 600m, DL 43. (E.C. 22-V-1972).
 - Neuvic, haie sur la D.982 à 2 km au nord du centre ville, abondant. Alt. env. 600m, DL 42 (E.C. 23-V-1972).
 - Lamazière-Basse, au pont des Bouyges sur la Luzège, R. (hêtraie). Alt. 435m, DL 32 (E.C. 23-V-1972).
 - Saint-Etienne-aux-Clos, gorges du Chavanon, vu r. dr. au sud de la gare de Savennes, pas très rare. Alt. env. 600m, D 54 (R.M. 29-V-1978. Vu la station E.C. 21-VIII-1978).
 - Merlines, gorges du ruisseau de la Barricade au pont sur la D 92, R. Alt. 602m, DL 55 (E.C. 20-VIII-1978).

PAPILIONACÉES

- 123 .- *Cytisus purgans* (L.) Boiss. (*Genista purgans* (L.) DC.)
 O médit. surtout mont.
 - Moustier-Ventadour, sur la D.991, rochers au-dessous des ruines du château, abondant. Alt. env. 500m, DL 32 (E.C. 23-V-1972. Vu la station R.M. VII-1979)
- + 124 .- *Cytisus multiflorus* (L'Hérit.) Sweet (*C. albus* (Lam.) Link)
 Ibérique. Introduit et en voie de naturalisation.

Ce "Genêt" à fleurs blanches a été semé par endroits sur les talus élevés qui bordent plusieurs routes du département, principalement sur la N.89 aux points où elle a été récemment rectifiée entre Egletons et Saint-Angel. Les graines y ont été projetées de la route par des moyens mécaniques, avec des brins de paille (d'une fêtuque peut-être) et une colle noire (sorte de goudron) qui leur permet de se fixer et de germer sur ces fortes pentes à sol squelettique.

Ce "Genêt", qu'accompagne souvent notre *Cytisus scoparius* indigène, se distingue aisément de ce dernier hors de la période de floraison par son

port, sa couleur d'un vert glauque et encore mieux par ses fruits en automne. Voici la liste des lieux où nous avons noté son importation:

- Egletons, route de Saint-Angel (N.89) dès la sortie de l'agglomération (R.M., E.C. août 1977).
- Combressol, sur la N.89 en 4 ou 5 points (id.).
- Saint-Angel, route d'Ussel (N.89) à 2 km après Saint-Angel (id.).
- Sortie nord de Tulle par la N.120 (R.M. août 1978).
- Entre Forgès et les Jordes, sur la N.120 à l'est de Tulle (id.).
- Aubazine, un peu au sud du tunnel routier de la N.89 (id.).
- Neuvic, un peu au nord sur la route d'Ussel (D.982) (id.).
- Sarroux, près le Chassang sur la route de Bort à Ussel (D.979) (Id.).
- Treignac, sortie nord sur la route d'Eymoutiers (D.16) (id.).

Obs.- Jusqu'à présent, il ne semble pas que le "genêt" ibérique ait réussi à s'implanter dans les landes au voisinage des talus où il a été semé. Il a été également introduit en Haute-Vienne sur la N.20 (v. A. VILKS, 1973). Sur la N.89, en dehors de la Corrèze, il a été introduit dans le Puy-de-Dôme, à Rochefort-Montagne, à 2 km environ avant cette localité en venant de Laqueuille (E.C. 9-VIII-1977).

- 125 .- *Lathyrus sylvestris* L. Euro-O asiat.
- Arnac-Pompadour, route de Vigeois (D.7) peu après le passage à niveau. Alt. env. 400m, CL 72 (E.C. 22-VII-1971).
- Donzenac, broussailles sur la D.25 au sud de l'ardoisière de Travassac. Alt. 240m, CL 80 (E.C. 23-VII-1971). (L'abbé LAUBIE le connaissait à Donzenac).
- Monceaux-sur-Dordogne, route d'Argentat (D.12), broussailles un peu à l'est de Laygues, abondant. Alt. 172m, DK 19 (E.C., R. DAUNAS, R.M., 29-VII-1975).
- 126 .- *Trifolium medium* L. ssp. *medium* Euro-O asiat.
- Chenaillet-Mascheix, bord nord de la D.12, bas de la pente boisée de la r. dr. de la Dordogne à 200-250m à l'est de la D.83E qui monte vers Chenaillet-Mascheix, avec *Genista pilosa*. Alt. env. 160m, DK 08 (E.C. 17-VI-1972).
- Merlines, pente boisée de la r. g. du ruisseau de la Barricade, sur la D. 92 à 25m de la cote 675, R, DL 55 (E.C. 20-VIII-1978).
- 127 .- *Lotus angustissimus* L. Submédit.-atlantique.
- Aubazine, talus du sentier partant de la D.130E près de l'église et montant vers le Canal des Moines, R. Alt. env. 250m, CL 90 (E.C. 4-IX-1978, fl. et fts).
Obs.- Déjà indiqué à Aubazine ("pelouses entre Obazine et le Coiroux. R.") par RUPIN, p.72, sous le nom de "*L. diffusus* Soland. in Smith". Le *L. diffusus* Soland. n'est pas spécifiquement distinct de *L. angustissimus*.

OXALIDACÉES

- 128 .- *Oxalis corniculata* L. Subcosmopolite.
- Tulle (RUP.!) (Vu R.M., mur de jardin, boulevard Foch. Vu E.C. 8-VIII-1977) Alt. env. 250m, DL 01.
- Donzenac, talus sur la N.20 et la D.170, R. Alt. env. 160-180m, CL 80).
- Aubazine, murs, R. Alt. env. 300m, CL 90 (E.C. 2 et 3-VIII-1978).
Obs.- L'espèce suivante, calcifuge, semble beaucoup plus répandue en Corrèze.
- 129 .- *Oxalis stricta* L. (*O. dillenii* Jacq.; *O. navieri* Jord.)
N. amér. Naturalisée en Eur. (S,O,C)
- Tulle, jardin, boulevard Foch. Alt. env. 250m, DL 01 (R.M. Vu E.C. 8-VIII-1977).

- Saint-Yriex-le-Déjalat, rues. Alt. env. 750m, DL 13 (R.M. Vu E.C. 7-IX-1977).
- Aubazine, rues, talus, etc. CC. Alt. env. 290m, CL 90 (R.M. & E.C., 3-IX-1978).
- Ségur-le-Château, rue. Alt. env. 280m, CL 63 (E.C. 1-IX-1978).
- Sainte-Féréole, rues, pied des murs. Alt. env. 390m, CL 80 (E.C. 2-IX-1978)
- Beynat, remblai. Alt. env. 400m, DK 09 (E.C. 3-IX-1978).
- Chameyrat, terrain vague sur la N.89. Alt. env. 190m, CL 91 (E.C. 4-IX-1978)
- Gimel, rue. Alt. env. 440m, DL 01 (E.C. 5-IX-1978).
- Clergoux, pied du mur du cimetière. Alt. env. 500m, DL 11 (E.C. 5-IX-1978).
- Saint-Martin-la-Méanne, pied d'un mur. Alt. 490m, DL 10 (E.C. 5-IX-1978).
- Soursac, à Spontour, rues. Alt. 265m, DL 30 (E.C. 5-IX-1978).
- Bort, lieu vague. Alt. env. 440m, DL 62 (E.C. 7-IX-1978).

GÉRANIACÉES

- 33² .- *Geranium sylvaticum* L. Euro-asiat. mont.
- Lamazière-Basse, au pont des Bouyges sur la Luzège (hêtre). Alt. 435m, DL 32 (E.C. 23-V-1972).
 - Mestes, au Pont Rouge sur la Diège. Alt. 554m, DL 43 (E.C. 6-VII-1973).
 - Aix, à Châlons, ruisseau de la Barricade au moulin situé au nord du village. Alt. env. 728m, DL 55 (R.M. et E.C. 7-IX-1977).
 - Feyt, bord nord de la N.89 à l'ouest du pont sur le Chavanon, un peu à l'ouest de la route de la Cellette, bas de pente boisée (hêtres). Alt. env. 640m, DL 65 (E.C. 9-VIII-1977).
 - Merlines, gorges de la Barricade, sur la D.92, DL 55 (R. LUGAGNE 1964. Vu R.M. 1977. Vu E.C. 20 et 21-VIII-1978: bord du bois à 300m environ au nord de la cote 714; ravin de la cote 675; ravin de la cote 631; plus bas encore entre la cote 631 et le pont de la cote 602 sur la Barricade, répandu).
 - Saint-Etienne-aux-Clos, gorges du Chavanon. Vu r. dr. au sud du moulin de Faure, à côté de *Carex pilosa*. Alt. env. 600m, DL 54 (R.M. 30-V-1978. Vu E.C. 21-VIII-1978).
 - Bort-les-Orgues, r. dr. de la Rhue, station de l'*Equisetum hyemale*. Alt. 440m, DL 62 (R.M. 21-VI-78. Vu E.C. 7-IX-1978).
- 130 .- *Geranium phaeum* L. Orophyte S, médio-et E. eur.
- Bort-les-Orgues, bord de la Rhue. Alt. 440m, DL 62 (R.M. 21-VI-1978).

EUPHORBIACÉES

- 131 .- *Euphorbia platyphyllos* L. Submédio- S eur.- O. asiat.
- Donzenac, fossé ouest de la route d'Allasac (D.25) à 200m après le chemin de Lavaud, R. Alt. 165m, CL 80 (E.C. 22-VII-1971, fts).
- 132 .- *Euphorbia serrulata* Thuill. (*E. stricta* L. nom. illeg.)
Submédio-eur.- S O asiat.
- Donzenac, route sud du Clou à Travassac, fossé à 500m environ à l'est du pont de la cote 138. Alt. env. 150m, CL 80 (E.C. 22-VII-1971, fts).
- + 133 .- *Euphorbia esula* L. ssp. *tommasiniana* (Bertol.) Nyman (*E. virgata* W. & K.)
S - Cent. et E eur.- asiat. temp. Adventice parfois natur.
- Saint-Merd-les-Oussines, bosquet de jeunes résineux un peu au nord du village, route de Millevaches, 5-6m². Alt. 830m, DL 25 (E.C. 12-VII-1968; revu le 5-VII-1973, en régression et menacé de disparition par suite de la pousse des résineux. Vu la station L. BRUNERYE, R.M.).
- Obs.- Inconnu ailleurs en Limousin, mais se répand dans le Centre-Ouest: (Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime, Charente). Est aussi en Dordogne (R. VIROT, E.C.).

THYMÉLÉACÉES

- 36² .- *Daphne laureola* L. ssp. *laureola* Submédit.- subatlantique
- Lamazière-Basse, route d'Egletons à la sortie du village, 8 pieds dans un haie. Alt. env. 580m, DL 32 (H. BOUBY et E.C. 7-VIII-1972).

HYPÉRICACÉES

- 37² .- *Hypericum linarifolium* Vahl Subatlantique
- Bar, rochers de la r. dr. de la Corrèze au pont sur la route de Gimel.
Alt. 269m, DL 02 (E.C. 4-VIII-1971).

OENOTHERACÉES.

- 39² .- *Circaea X intermedia* Ehrh. Médio-et N eur.- Cauc.
- Saint-Yrieix-le-Déjalat, route de Treignac près du pont de Franchesse sur la Corrèze. Alt. env. 600m, DL 13 (R.M. et E.C. 22-VIII-1978).
- Gimel, au bord de la Montane ou Gimelle en amont du site des Cascades, R. Alt. 421m, DL 01 (E.C. 4-VIII-1971).
- Près Laval-sur-Luzège mais c^{ne} de Soursac, sentier humide en amont du Pont Rouge sur la Luzège r. g. (Charmaie). Alt. 275m, DL 31 (E.C. 21-VII-1973).
- Merlines, sur la D.92 au pont de la cote 602 sur le ruisseau de la Barriade. DL 55 (E.C. 20-VIII-1978).
- + 134 .- *Epilobium hirsutum* L. X *E. parviflorum* Schreb. = *Epilobium X sericeum* Schum. (*E. X subhirsutum* Genn.; *E. X intermedium* Ruhmer, non Mérat).
Les deux parents : paléo-temp.
- La Roche-Canillac, fond humide d'une ancienne carrière r. dr. du Doustre à l'est de la Roche-Haussière, 4 pieds superbes hauts de près de 2m, inter parentes. Alt. 350m, DL 10 (E.C., R. DAUNAS et R.M. 30-VII-1975).
- 135 .- *Epilobium collinum* C.C. Gmelin Eur. (tendance mont.)
- Saint-Martin-la-Méanne à la Croix-de-Farge, mur et au lieudit "la Maison Rouge" sur la D 18 à 2km au nord du bourg, murettes et talus. Alt. env. 500m DL 20 (E.C. 5-VIII-1971).
- Lamazière-Basse, route d'Egletons, rochers suintants avant le pont des Bouyges sur la Luzège. Alt. env. 440m, DL 32 (E.C. 8-VIII-1972).
- Saint-Exupéry-les-Roches et Mestes, au Pont Rouge sur la Diège. Alt. 554m, DL 43 (E.C. 6-VII-1973).
- Feyt, sur la N.89, petite carrière près du pont sur le Chavanon. Alt. env. 640m, DL 65 (E.C. 9-VIII-1977).
- Merlines, sur la D 92 au pont de la cote 602 sur le ruisseau de la Barriade et environs, DL 55.
- Saint-Etienne-aux-Clos, r. dr. du Chavanon au sud de l'ancienne gare de Savennes, R. Alt. env. 592m, DL 54. (E.C. 21-VIII-1978).
- Venarsal, CC sur un mur de village, 5-15cm. Alt. env. 350m, CL 90. (E.C. 2-IX-1978).
- Auriac, mur sur la route de Spontour près du pont sur le Courpou. Alt. env. 434m, DL 30. (E.C. 6-IX-1978).
- Obs.- Indiqué sur les murs de Veix et de Treignac (L. BRUNERYE, 1971).
Quand il ne croît pas seul, on le trouve le plus souvent avec *E. montanum* parfois avec *E. obscurum*.
- 136 .- *Epilobium tetragonum* L. ssp. *lamyi* (F.W. Schultz) Nyman (*E. lamyi* F.W. Schultz) Euro-O asiat.

- Sainte-Féréole, mur du cimetière. Alt. 394m, CL 80 (E.C. 22-VII-1971).
- Donzenac, ancienne ardoisière à Travassac. Alt. env. 280m, CL 80, et au nord du bourg, petit chemin d'Espeyrut. Alt. env. 230m, CL 80. (E.C. 22-VII-1971).
- Monceaux-sur-Dordogne, au Port de Vaurs, vieux mur. Alt. 172m, DK 19. (E.C., R. DAUNAS et R.M. 29-VII-1975).
- Aubazine, pied d'un mur près de la place. Alt. env. 250m, CL 90. (E.C. 4-IX-1978).
- Chameyrat, terrain vague sur la N. 89. Alt. 191m, CL 91. (E.C. 4-IX-1978).

Obs.- Plante certainement beaucoup plus répandue mais parfois méconnue. Calcifuge, et contrairement à *E. obscurum*, plutôt xérophile.

- 137 .- *Epilobium roseum* Schreber. Euro-SO asiat.
- La-Roche-Canillac, fond humide d'une ancienne carrière r. dr. du Doustre à l'est de la Roche-Haussière. Alt. 350m, DL 10. (E.C. 20-VII-1973. Vu la station R.M. 30-VII-1975).
 - Monestier-Merlines, pont sur le Chavanon (N.89), remblai, RR. Alt. 636m, DL 65. (E.C. 9-VIII-1977).
 - Saint-Etienne-aux-Clos, r. dr. du Chavanon en aval de l'ancienne gare de Savennes, R le long de l'ancienne voie ferrée. Alt. env. 592m, DL 54. (E.C. 21-VIII-1978).
 - Bort-les-Orgues, r. dr. de la Rhue en aval du Saut de la Saule, R. Alt. env. 439m, DL 62 (E.C. 7-IX-1978).

Obs.- L'abbé LAUBIE l'indiquait à "Tulle, au Grand Séminaire" (Suppl. LE GENDRE, p. 79).

OMBELLIFERES

- 138 .- *Chaerophyllum aureum* L. Orophyte Cent. et E eur.-SO asiat.
- Altiliac, r. g. de la Dordogne, un peu en aval du château d'Estresse, berge et prairie voisine, localement abondant. Alt. 139m, DK 07. (E.C. 17-VI-1972).
 - Beaulieu-sur-Dordogne, r. dr. de la Dordogne au Moulin Abadiol et un peu en amont, sur la D.12. Alt. 146m, DK 08. (E.C. 17-VI-1972).

Obs.- Ces deux stations sont anormalement basses, mais la plante a suivi la vallée de la Dordogne. Elle est en effet indiquée à "Bort, bords de la Dordogne" (RUPIN, p.140) où l'altitude est encore relativement faible (env.430m).

- 139 .- *Myrrhis odorata* (L.) Scop. Orophyte S et médio-eur.- Cauc.
- Parfois cult. et subspontané ou naturalisé.
- Millevaches, dans le cimetière. Alt. env. 900m, DL 25. (R. LUGAGNE, 21-VII-1964).
 - Champagnac-la-Prune, tout au nord du village, fossé est de la D.131, subspont. Alt. env. 470m, DL 10. (E.C. 6-VIII-1971; revu, fl., le 24-V-1972).
 - Feyt, au pont sur le Chavanon (N. 89), remblai nord, r. dr., abondant, subspont. ou naturalisé. Alt. 636m, DL 65. (E.C. 9-VIII-1977). Est aussi r. g., bord sud de la route, c^{ne} de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme).

Obs.- CHASSAGNE (II p.203) est à notre connaissance le seul auteur à l'indiquer en Corrèze: "Confluent du Chavanon et de la Dordogne et dans les prairies des environs d'Ussel 630m (Gonod)".

- 140 .- *Pimpinella major* (L.) Huds. (= *P. magna* L.) Eur.
- Ségur-le-Château, route d'Arnac-Pompadour à environ 500m au nord de Faraudie. Alt. env. 320m, CL 63. (E.C. 22-VII-1971).
 - Chenailier-Mascheix, sur la D.12, r. dr. de la Dordogne aux environs de Chamailière, R. Alt. env. 170m, DK 08. (H. BOUBY et E.C. 9-VIII-1972).

- Merlines, sur la D.92 au pont sur le ruisseau de la Barricade proche du confluent avec le Chavanon, abondant, et au pont de la cote 602, R (R. LUGAGNE 26-VII-1964. Vu la station E.C. 20-VIII-1978); r. dr. du Chavanon au sud des anciens fours à chaux de Gioux, AC. Alt. env. 600m (E.C. 21-VIII-1978) DL 55.
- Saint-Etienne-aux-Clos, r. dr. du Chavanon au sud de l'ancienne gare de Savennes, R. Alt. env. 595m, DL 54. (E.C. 21-VIII-1978).
- Feyt, bord de la N.89 à l'ouest du pont sur le Chavanon. Alt. env. 640m, DL 65. (E.C. 9-VIII-1977).
- Bort-les-Orgues, aux Aubazines, sur la D.979, R. Alt. env. 600m, DL 52. (E.C. 6-VII-1973); et r. dr. de la Rhue en aval du Saut de la Saule. Alt. env. 440m, DL 62. (E.C. 7-IX-1978).

141 .- *Aegopodium podagraria* L. Euro- O asiat.

- Atiliac, r. g. de la Dordogne, un peu en aval du château d'Estresse, CC dans la peupleraie ripariale. Alt. 139m, DK 07. (E.C. 17-VI-1972).

142 .- *Selinum pyrenaicum* (L.) Gouan (*Angelica pyrenaica* (L.) Sprengel).
Orophyte S O eur.

- " Caractéristique des prairies humides des bords de la Vézère et de la Vienne, sur le plateau de Millevaches (Saint-Merd-Les-Oussines, Peyrele-vade... Ne descend pas au-dessous de 700m d'altitude" (L. BRUNERYE, 1971).
Vu à:

- Saint-Merd-les-Oussines, prairie à *Gentiana lutea* un peu au nord du vil-lage, route de Millevaches. Alt. 830m, DL 25 (E.C. 12-VII-1968).
- Saint-Merd-les-Oussines, route de Peyrele-vade, au pont de Mary, lande tourbeuse. Alt. 814m, DL 25. (E.C. 12-VII-1968).
- Saint-Merd-les-Oussines, route de Bugeat (D.164), r. g. de la Vézère, au bas d'une prairie tourbeuse à *Narthecium* à 1300m avant Fournol. Alt. 770m, DL 25. (E.C. 5-VII-1973).
- Saint-Setiers, prairie de la r. dr. de la Vienne à 600m à l'ouest de la Gane de Bos, sur la D.21. Alt. env. 800m, DL 26. (E.C. 12-VII-1968).
- Saint-Setiers, au pont de la Jasse, marécage tourbeux, très abondant. Alt. 822m, DL 26. (E.C., 19-VII-1973).
- Millevaches, prairie montueuse au sud-est du village. Alt. env. 892m, DL 25.
- "Pâturage en bordure de la route de Meymac à Bugeat (D.979), à 14,5 km de Bugeat. Alt. env. 900m". (R. LUGAGNE in herb. E.C. et ips. sub n° 4617) La station doit donc se trouver à l'est de Barsanges, c^{ne} de Pérols-sur-Vézère, DL 24).

412 .- *Peucedanum gallicum* Latourr. Euatlantique (ibéro-franco-atl.)

- Aubazine, r. g. du Coiroux en amont du pont sur la route de Palazinges (D.130) près de la carrière. Alt. env. 290m, CL 90 (R.M. et E.C. 3-IX-1978).
- Environs de Treignac, site des Folles, r. g. de la Vézère, c^{ne} d'Affieux, R. Alt. env. 430m. DL 04. (E.C. 24-VII-1971).

143 .- *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench. Médio-eur.-caucas.

- Atiliac, r. g. de la Dordogne en aval du château d'Estresse, place her-beuse assez sèche enclavée dans la peupleraie ripariale, abondant sur un espace restreint. Alt. env. 139m, DK 07. (E.C. 17-VI-1972).

+ 144 .- *Peucedanum palustre* (L.) Moench. Euro-Cent. et O asiat.

- Route de Saint-Angel à Ussel (N.89) à 3 km au nord-est de Saint-Angel, à la limite des 2 communes peu avant le hameau "l'Empereur", abondant du côté nord de la route dans une clairière marécageuse de la lande boisée,

avec *Juncus acutiflorus* CC, *Potentilla palustris*, etc... et autour quelques pins sylvestres. Alt. env. 680m, DL 44 (E.C. 22-VIII-1978, fl. Vu la station R.M.).

- Saint-Angel, route d'Egletons (N.89), côté sud, à environ 1 km au sud-ouest, environ 12 pieds avec *Viola palustris*, *Parnassia palustris*, *Valeriana dioica*, *Epilobium palustre* etc... dans une lande tourbeuse à la lisière des bois.

Alt. env. 650m, DL 33. (E.C. 22-VIII-1978, fl. Vu la station R.M.).

- Chirac-Bellevue, bord ouest de la route Neuvic-Ussel (D.982) peu avant la cote 617, petite tourbière entre résineux, DL 43). R. AURIAULT et R.M. 6-IX-1978).

42² .- *Peucedanum cervaria* (L.) Lapeyr. Médio-eur.- Cauc.

- Collonges, sortie du village, route de Brive (D.38). Alt. env. 200m, CK 99. (H. BOUBY et E.C. 9-VIII-1972).

145 .- *Pastinaca sativa* L. ssp. *urens* (Req. ex Godron) Celak. (*P. opaca* des Catal. RUPIN et LE GENDRE).

Médio-Cent. et E eur.- S O asiat. en expansion vers le N.

- Se répand surtout le long des grands axes de communication, C dans les régions de Brive, Tulle, Meyssac, R au nord-est du département. Observé dans les localités suivantes de 1971 à 1978 (Alt. 100-600m): Arnac-Pompadour, Allasac, Saint-Pardoux-l'Ortigier, Sadroc, Donzenac, Sainte-Féréole, Ussac, Brive, Malemort-sur-Corrèze, Gare d'Aubazine, Saint-Hilaire, Aubazine, Chameyrat, Cornil, Tulle, Gare de Corrèze, Naves, Brivezac, Beaulieu-sur-Dordogne, Collonges, Meyssac, Saint-Julien-Maumont, Tudeils, Marcillac-la-Croze, Egletons, Ussel, Mestes, Bort-les-Orgues. (E.C., R.M.), ce qui correspond aux divisions:

CL 71	CL 72	CL 80	CL 81	CL 90	CL 91
DL 01	DL 12	DL 22	DL 43	DL 44	DL 62
CK 98	CK 99		DK 08		

PYROLACÉES

146 .- *Pyrola minor* L. Holarctique (mont. dans le S.)

"Sur quelques points de la Haute-Corrèze (Lamy)" (RUPIN, p.175) Nous avons exprimé plus haut notre sentiment sur ce genre d'indication (cf.n°108)...

- Bois; gorges du Chavanon à Saint-Etienne-aux-Clos. Alt. 600m, probt. DL 54. (L. BRUNERYE, 1971, p.15).

- Bois entre Valiergues et Chirac-Bellevue à la limite des 2 communes, entre la route Neuvic-Ussel (D 982) et le petit étang de la cote 621, environ 30 pieds, DL 43. (E.C. 22-V-1972. Vu la station R.M.).

- Merlines, pente boisée de la r. g. du ruisseau de la Barricade, ravin de la cote 675 sur la D.92, RR, DL 55. (E.C. 20-VIII-1978).

- Sarroux, forêt sous le château de Pierrefitte, quelques pieds sur un passage d'eau intermittent. Alt. 670m, DL 52. (Cl. M. 21-VI-1978).

- Aix, talus de la N.89, peu après le passage à niveau de Ciarneix, très belle colonie au bord du bois. Alt. 800m. (R. AURIAULT et R.M. 6-IX-1978).

ASCLÉPIADACÉES

+ 147 .- *Asclepias syriaca* L. (*A. cornuti* Decne)

N amér. Cultivé et subspont. ou naturalisé.

- Neuvic, vers la sortie, route d'Egletons, probablement cultivé à l'origine, puis plus ou moins échappé de culture, une colonie. Alt. env. 600m, DL 42. (H. BOUBY et E.C. 8-VIII-1972, fl.).

RUBIACÉES

- 48² .- *Galium odoratum* (L.) Scop. (*Asperula odorata* L.).
Euro-asiat. temp.- N Afr.
- Près Laval-sur-Luzège, mais C^{ne} de Soursac, pente boisée (charmaie) au Pont Rouge sur la Luzège, r. g. côté amont, AC. Alt. env. 275m, DL 31. (E.C. 21-VII-1973).
- Lamazière-Basse, route d'Egletons (D.991), ravin du Pré Neuf à 600m avant le pont des Bouyges sur la Luzège, hêtraie et résineux. Alt. env. 470m, DL 32. (E.C. 23-V-1972).
- Merlines, pente boisée de la r. g. du ruisseau de la Barricade sur la D.92, ravins des cotes 675 et 631, chênaie-hêtraie, DL 55. (E.C. 20 et 21-VIII-1978).
- Bois de Charel, r. g. de la Dordogne en face de Spontour, mais c^{ne} de Rilhac-Xaintrie, sur la D 75, chênaie-charmaie et hêtre. Alt. env. 350m, DL 30. (E.C. 6-IX-1978).

BORAGINACÉES

- + 148 .- *Symphytum asperum* Lepechin. Cauc.-pers. Subspont. ou naturalisé.
- Champagnac-la-Prune, route de Saint-Bazile-de-la-Roche, bas de pente au niveau de la dernière maison. Alt. env. 420m, DL 10. (A. LAWALREE et E.C. 18-VI-1972, fl. et fts.).
149 .- *Symphytum tuberosum* L. ssp. *tuberosum* Submédio-S eur.
- Atillac, r. g. de la Dordogne en aval du château d'Estresse, C. Alt. 139m, DK 07. (E.C. 17-VI-1972).
- Cornil, ravin au pont de Cornil. Alt. env. 200m (R.M. 1974. Vu la station E.C.).
- Beynat, route de Lanteuil, (N.680), bas de pente dans la vallée de la Roanne avant le chemin de Montredon. Alt. env. 350m, CK 99 (E.C. 24-V-1972).

LAMIACÉES (LABIÉES)

- 150 .- *Lamium maculatum* L. S et médio-eur.-O asiat.
- Atillac, r. g. de la Dordogne en aval du château d'Estresse, sentier. Alt. env. 140m, DK 08 (E.C. 17-VI-1972).
- Merlines, r. dr. du Chavanon, broussailles au niveau des anciens fours à chaux de Gioux. Alt. env. 600m, DL 55 (E.C. 21-VIII-1978).
- Saint-Etienne-aux-Clos, r. dr. du Chavanon en aval de l'ancienne gare de Savennes. Alt. env. 600m, DL 54. (E.C. 21-VIII-1978).
151 .- *Stachys alpina* L. Submédio-eur.-cauc. surtout mont.
- Merlines, pentes boisées de la r. g. du ruisseau de la Barricade, sur la D 92, disséminé entre la cote 675 et le pont de la cote 602, DL 55. (E.C. 20-VIII-1978).
152 .- *Mentha longifolia* (L.) Huds. (*M. sylvestris* L.; *M. incana* Willd.)
Submédio-S eur.- O asiat.-N afr., surtout mont.
- Bort-les-Orgues, r. dr. de la Rhue en aval du saut de la Saule, R. Alt. env. 440m, DL 62. (E.C. 7-IX-1978 fl.).

Obs.- Il s'agit bien ici du type *longifolia* et non d'une Menthe hybride d'origine culturale.

SCROPHULARIACÉES

- 153 .- *Verbascum virgatum* Stokes (*V. blattarioides* Lam.) Subatl.-médit.
 - Donzenac, à Travassac, ardoisières au sud du village etc... Alt. env. 300m. CL 80. (E.C. 23-VII-1971).
 - Sadroc, à la Maumone. Alt. env. 400m, CL 81. (E.C. 2-IX-1978).
- + 154 .- *Verbascum pulverulentum* Vill. X *V. thapsus* L. (*V. Godronii* Boreau. et *V. X lamottei* Franchet).
V. pulverulentum: médit-atlantique ; *V. thapsus*: euro-asiat.
 - Chameyrat, sur la N.89, terrain vague à 250m au sud-ouest du pont de Mulatet sur la Corrèze, un pied atteignant plus de 2m de haut, très rameux, inter parentes.
 Par son port, correspond plutôt à la description du *V. lamottei*. Alt. 191m, CL 91 (E.C. 4-IX-1978).
- 49² .- *Veronica montana* L. Euro-cauc.- N afr.
 -Merlines, vallée du ruisseau de la Barricade, sur la D.92, au pont de la cote 602, et dans le petit ravin de la cote 631, DL 55. (E.C. 20 et 21-VIII-1978).
 -Donzenac, r. g. du ruisseau "le Maumont blanc" un peu en amont du pont de la cote 155 sur la route de Saint-Germain-les-Vergnes. CL 81 (E.C. 2-IX-1978).
- + 155 .- *Veronica dillenii* Crantz Euro-S O et Cent. asiat.
 - Souvent, cette espèce n'a pas été distinguée de *V. verna* L. Cependant, l'examen de nombreux exemplaires conduit à une diagnose fort distincte de celle de ROUY (XI, 49): tige de 30cm, très ramifiée, fleurs bleu ciel, en longues grappes denses, style long (1,5mm) (*V. Fl. COSTE, 4° Suppl., p.381 et p.470 fig. 14*).
 Bordures sablonneuses des champs de seigle: trouvé en recherchant *Agrostemma githago*. Cette Véronique est probablement assez répandue en Haute-Corrèze. A rechercher.
 - Saint-Yrieix-le-Déjalat, champ au-dessus de Commerly (route forestière de Péret-Bel-Air). Alt. 800m, DL 23. (R.M. 9-VII-1978).
 - Grandsaigne, à Chazalnoël. Alt. 610m, DL 13 (R.M. 22-VII-1978).
 - Davignac, après Laval. Alt. 690m, DL 24. (R.M. 24-VII-1978).
- + 156 .- *Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich (*R. hirsutus* Lam.)
 Submédio-eur.
 - Tarnac, sur le plateau à l'est de Javaud, bord d'une prairie, R (tout près *Rh. minor* au bord de la route). Alt. env. 800m, DL 15. (E.C. 4-VII-1973).
 - Tarnac, route de Faux-la-Montagne (D.109), AC dans un champ de seigle au nord du Trech, avec *Anthoxanthum puelii* CC, *Arnosseris pusilla* CC, *Scleranthus annuus* CC. (tout près *Rh. minor* au bord de la route). Alt. env. 740m, DL 16. (E.C. 4-VII-1973).
 - Tarnac, champ de seigle à Couffy. Alt. 840m, DL 15. (E.C. 4-VII-1973).
 Obs.- Espèce méconnue des anciens botanistes, à rechercher.

OROBANCHACÉES

- 157 .- *Orobanche hederæ* Duby Médit-atlantique.
 - Saint-Cernin-de-Larche, cirque de la Roche, très abondant sur le lierre des éboulis calcaires. Alt. 180m, CK 79. (RUP.!) (Vu R.M. 16-X-1978).

CAPRIFOLIACÉES

- 158 .- *Lonicera xylosteum* L. Euro-0 asiat.
- Merlines, sur la D.92, ravin de la cote 631, et pont de la cote 602 sur le ruisseau de la Barricade, DL 55. (E.C. 20 et 21-VIII-1978).
- Saint-Etienne-aux-Clos, pente boisée de la r. dr. du Chavanon en aval de l'ancienne gare de Savennes. Alt. env. 600m, DL 54. (E.C. 21-VIII-1978).

COMPOSÉES

- 58² .- *Erigeron acer* L. ssp. *acer* Holarct. temp.
- Saint-Etienne-aux-Clos, r. dr. du Chavanon, rochers bordant l'ancienne voie ferrée à environ 400m au sud de l'ancienne gare de Savennes, R. Alt. env. 600m, DL 54. (E.C. 21-VIII-1978, fl.).
- + 159 .- *Conyza albida* Willd. ex Spreng (*C. naudinii* Bonnet)
Origine? Advent. natur. S et SO de la France, en expansion vers le N.
- Allasac, route de Donzenac (D.25), abondant sur un talus rocheux (E.C. 22-VII-1971 : 1° observation en Corrèze.
- Naves, au Puy de Cueille, talus, environ 80 pieds (E.C. 4-VIII-1971): 2° observation en Corrèze.
- Gimel, talus de la route touristique de Tulle, localement abondant (L. BRUNERYE, E.C. et R.M. 8-VIII-1977): 3° observation en Corrèze.
- Yssandon (R.M. IX-1977): 4° observation en Corrèze.

Toutes les autres localités ont été relevées en 1978 (E.C., R.M.) : Sadroc, Donzenac, Sainte-Féréole, Ussac, Brive, Malemort-sur-Corrèze, Gare d'Aubazine-Saint-Hilaire, Aubazine, Venarsal, Chameyrat, Beynat, ce qui correspond aux divisions suivantes:

CL 70 CL 80 CL 81 CL 90 CL 91 DL 09

Très abondant dans certaines localités citées, suit en général les grandes voies de communication. Les terres froides de la Haute-Corrèze ne semblent pas lui convenir.

- 60² .- *Bidens frondosa* L. Amér. Advent. naturalisé
- Tulle, au bord de la Corrèze. Alt. env. 210m, DL 01. (R. CHASTAGNOL, 7-VII, 1966).
- Aubazine, r. g. du Coiroux, en amont du pont sur la route de Palazinges, bord suintant du chemin conduisant à la carrière. Alt. env. 290m, CL 90. (E.C. et R.M. 3-VII-1978).
- + 160 .- *Galinsoga ciliata* (Rafin.) S.F. Blake (*G. aristulata* Bicknell).
S et Cent. amér. Adventice
- Neuvic, à Antiges, jardin. Alt. env. 600m, DL 42. (R.M. 1975. Revu R.M. avec E.C. 7-IX-1977, fl.).
- + 161 .- *Artemisia verlotiorum* Lamotte Originaire de Chine. Advent. naturalisé
- Saint-Martin-la-Méanne, à Lafarge, bords du chemin en deux points. Alt. env. 490m, DL 20 (E.C. 6-VIII-1971 et 9-VIII-1972).
- Sainte-Féréole, au pied du mur du cimetière et lieu vague dans le village. Alt. env. 390m, CL 80. (E.C. 2-IX-1978).
- Donzenac, route de Saint-Germain-les-Vergnes (D.170), talus nord à 250m avant le pont de la cote 155. CL 80. (E.C. 2-IX-1978).
- Beynat, route d'Aubazine (D 130), à Ezouard, terres rapportées. Alt. env. 400m, DK 09. (E.C. 3-IX-1978).
- Saint-Hilaire-Peyroux, rue, en face de l'église. Alt. env. 280m, CL 90.

(E.C. 4-IX-1978).

- Chameyrat, terrains vagues sur la N. 89 entre le pont de Cornil et Tulle, en 2 points. Alt. env. 190m, CL 90 et CL 91. (E.C. 4 et 5-IX-1978).
- Soursac, à Spontour, rue principale, en face de l'église, très abondant. Alt. 265m, DL 30 (E.C. 6-IX-1978).

Obs.- Inconnu dans la Haute-Vienne et dans la Creuse.

- 162 .- *Senecio cacaliaster* Lam. Orophyte SO et médio-eur.
- Mestes, au "Pont-Rouge" sur la Diège, sentier dans la hêtraie, r. dr. côté aval, et une forte colonie sur les rochers bordant la route au nord du pont. Alt. env. 560m, DL 43. (Vu E.C. 6-VII-1973, fl., R.M. 21-VI-1978).
Obs.- On lit dans RUPIN: "Vallée de la Diège, AC (Fr. Georges)".
- "Freignac, bords de la Vézère; saut de la Virolle AR" (RUPIN p.152). Mais L. BRUNERYE (1966) le donne AC dans la hêtraie des bords de la Vézère. Alt. 450-660m, DL 04, DL 14 .
- Chaumeil, puy de la Jarrige. Alt. 880m, DL 13. (herb. Puyaubert, 27-VII-1910). Assez abondant (L.B., R.M.) dans les bois de chêne sessile qui existent encore.
- 163 .- *Senecio erucifolius* L. Euro-O et Cent. asiat.
- Chartrier-Ferrière: le Sorpt, talus de la route. Alt. 240m, CK 97 (RUP.! Vu R.M. 16-X-1978).
- 164 .- *Lactuca virosa* Submédit.-atlantique.
- 164a.- 1°- var. *virosa*
- Gimel, mur de soutènement au nord du cimetière, un pied. Alt. env. 440m, DL 01 (H. BOUBY et E.C. 9-VIII-1972, fl.).
- Donzenac, à la Rochette, en face du château d'eau. Alt. 330m, CL 81 (H. BOUBY et E.C. 9-VIII-1972, fl.).
- Saint-Martin-la-Méanne, route de Marcillac-la-Croisille (D.18), disséminé entre le chemin de Margnac et le chemin du Seyt. Alt. env. 510m, DL 20. (E.C., R. DAUNAS et R.M. 30-VII-1975, fl.).
- Sur la D.44 entre Sainte-Féréole et Malemort-sur-Corrèze, une colonie. CL 80. (E.C. 2-IX-1978, fl. et fts.).
- Aubazine, sur la D 48, au sud-ouest, entre le bourg et le calvaire de la cote 263, remblai, une colonie. Vu aussi ailleurs, mais R. CL 90 (E.C. 4-IX-1978).
- Obs.- Il semble que cette variété (le type de l'espèce) soit R. en Corrèze. La variété suivante au contraire est largement répandue sauf dans la Haute-Corrèze, mais elle n'avait pas été remarquée à l'époque de RUPIN.
- + 164^b.- 2°- var. *flavida* (Jord.) Gren. et Godr.
- Donzenac, à Espeyrut et route de Saint-Germain-les-Vergnes (E.C. 9-VIII-1972 et 2-IX-1978, fl. et fts).
- Brive et Saint-Pantaléon-de-Larches, route de Terrasson (N.89) (E.C. et R. DAUNAS, 31-VII-1975, fl.).
- Saint-Hilaire-Peyroux, sur la N.89 près de la gare d'Aubazine (E.C. et R. DAUNAS, 31-VII-1975).
- Aubazine, dans le bourg, sur la D.48, remblai, abondant (E.C., R.M. et la S.B.C.O. 3-IX-1978, fl. et fts).
- Cornil, au Pont-de-Cornil, sur la N.89 (E.C., L. BRUNERYE et R.M. 8-VIII-1977 fl.).
- Chameyrat, talus de la cote 184 sur la N.89 (E.C. 5-IX-1978).
- Tulle, sortie, route de Brive, talus de la N.89 (E.C., L. BRUNERYE et R. M. 8-VIII-1977, fl). et route d'Egletons (N.89) peu avant la petite route de Freyssinges, grand talus. (E.C. 5-IX-1978, fts) etc.....

- Chanac-les-Mines, sur la D.978 (E.C. et R. DAUNAS, 31-VII-1975, fl.).
- Gimel et Tulle, sur la route touristique où il devient C aux abords de Tulle (E.C., R. DAUNAS et R.M. 29-VII-1975, fl.).
- Gimel, route de Bar (D.53) à 400m au nord de Mars (H. BOUBY et E.C. 9-VIII-1972, fl.) et vallée de la Montane à Saint-Etienne-de-Braguse (E.C. 5-IX-1978, fl. et fts).
- Naves, à la Combotte sur la N.120 et route de Vimbelle (E.C. 4-VIII-1971 fl.).
- Beynat, route d'Aubazine, peu avant le chemin d'Espagnagol (E.C. 3-IX-1978, fl. et fts).
- Argentat, sur la D.18, sortie nord (un pied atteignant au moins 2,50m de haut). et entre la barrage du Sablier et le château de Gibanel; sur la D. 33 vers la Chapelle-St-Géraud (E.C., R. DAUNAS et R.M. 30-VII-1975, fl.); au Pont de la Chapelle sur la D.131 (E.C. 9-VIII-1972 fl.).
- Monceaux-sur-Dordogne, sur la D.12, à Feneyro1, Saulières, la Salle, ent Laygues et le Chambon (E.C. 17-VI-1972, revu avec R. DAUNAS et R.M. 29-VII 1975, fl.).
- Beaulieu-sur-Dordogne, au Moulin Abadiol (H. BOUBY et E.C. 9-VIII-1972, f
- Meyssac; Saint-Julien-Maumont; Tudeils (H. BOUBY et E.C. 9-VIII-1972, fl.
- Merlines, aux anciens fours à chaux de Gioux, RR (E.C. 21-VIII-1978, fl. et fts).
- Saint-Merd-de-Lapleau, au Pont de Chambon et environs, R (E.C. 9-IX-1978 fl. et fts).
- Laval-sur-Luzège, AC sur les rochers dans la grande côte sur la D.978, di rection St-Merd-de-Lapleau, abondant localement sur plus de 100m (E.C. 21-VII-1973, fl.).
- Soursac, à Spontour, et au nord de Spontour, rochers sur la D.978 en di rection de Laval-sur-Luzège, abondant (E.C. 21-VII-1973 et 5-IX-1978, fl. et fts).
- Bort-les-Orgues, route de Margerides, (D.979), rochers; entre Bort et Chantery et à la Colombière, en montant vers les Orgues (E.C. 6-VII-1973 e 7-IX-1978, fl. et fts).

Alt.: de 140m (Gare d'Aubazine) à 700m (la Colombière de Bort).

Les localités citées correspondant aux divisions:

CL 80	CL 81	CL 90			
DL 01	DL 20	DL 30	DL 31	DL 55	DL 62
CK 98					
DK 08	DK 09	DK 18	DK 19		

Obs.- On distingue facilement cette variété du type par la teinte plus glauque et non lavée de brun rougeâtre de la plante, les bractées du péricline d'un vert clair sans punctuations, mais elle a les akènes d'un pourpre noir du type et non grisâtre comme *L. serriola* (et ses variétés) avec laquelle il ne faut pas la confondre.

CHASSAGNE (II, p.493) ne l'indique en Auvergne que dans le Puy-de-Dôme (2 localités). En réalité, elle paraît être assez répandue en Auvergne et dans le Centre. L'un de nous (E.C.) l'a notée en 1978 dans les départements suivants: Cantal, Puy-de-Dôme, Allier, Loire, Rhône. Par ailleurs elle a encore été observée en Dordogne, Charente (R), Charente-Maritime et Gironde (RR) (E.C.).

66²

- *Prenanthes purpurea* L. Orophyte S et médio-eur.-cauc.
- Auriac, route de Spontour, bordure herbeuse. Alt. 520m, DL.30. (R.M. 25-VIII-1978).
- "Chênaie-hêtraie, dans les Monédières, R.: Chaumeil, St-Augustin. Alt.

750-900m". DL.13 (L. BRUNERYE 1971).

- 165 .- *Crepis biennis* L. Submédio-eur.
 - Le Claud, abondant dans une prairie artificielle à l'est-nord-est du hameau, côté ouest de la route de Condat-sur-Ganaveix, à 350m environ au nord du carrefour de la cote 359 sur la N.20, à la limite de Condat et d'Uzerche. Alt. env. 380m, CL 83. (E.C. 26-V-1972, fl.). Adventice?
 Obs.- A rechercher entre Brive et Larche sur la N.89. Vu en effet entre Larche (Corrèze) et Daudevie c^{ne} de Pazayac (Dordogne) par places, le long de la N.89. Vu aussi, CC, entre Daudevie et Terrasson (Dordogne). CK 79 et CK 69 (E.C. 24-V-1972, fl.).

2- Classe des MONOCOTYLÉDONES

JONCACÉES

- 72² .- *Luzula nivea* (L.) DC. Orophyte SO et Cent. eur.
 - Lamazière-Basse, route d'Egletons (D.991) dans la grande descente vers le pont des Bouyges sur la Luzège, à 400m environ avant le ravin du Pré Neuf, disséminé sur 100m, talus de la pente boisée. Alt. env. 500m, DL.32. (E.C. 23-V-1972, fl.).
 Obs.- Localité voisine de celle de Moustier-Ventadour signalée dans le Bul. de 1977 p.120, cette dernière étant située dans la vallée de la Soudeillette, affluent de r. dr. de la Luzège.
- + 166 .- *Juncus compressus* Jacq. Euro-asiat. temp.- NE amér.
 - Saint-Etienne-aux-Clos, place herbeuse humide, r. dr. du Chavanon, au niveau de l'ancienne gare de Savennes, R., avec *Carex spicata* qui couvre là plusieurs ares, *Rumex conglomeratus* etc..... Alt. env. 592m, DL 55 (E.C. 21-VIII-1978, fts).
 Obs.- Il serait surprenant que cette espèce n'eût d'autres localités en Corrèze. A rechercher.
- 167 .- *Scirpus cespitosus* L. (*Trichophorum cespitosum* (L) Hartm. s. lato Circumbor.
 - Saint-Pardoux-la-Croisille, lande tourbeuse à *Juncus squarrosus* côté sud de la route de Marcillac à Clergoux (D 978) au nord-nord-ouest de Lantourne, localement abondant. Alt. env. 540m, DL 21. (E.C. 5-VIII-1971).
 - Gros-Chastang, marécage tourbeux à *Juncus squarrosus* et *Sphagnum*, côté N de la D.113E1, à 400m environ à l'est du cimetière. Alt. env. 500m, DL 20. (E.C. 18-VI-1972).
 - Tourbière des "Quatre-Routes", à 800m à l'ouest, sur la N.680 à la limite d'Albussac et de Beynat, abondant, avec *Narthecium* etc. C'est la ssp. *germanicus* (Palla) Brodd. (détermination confirmée par M. A. BERTON). Alt. env. 530m, DK 09. (L. BRUNERYE. Vu la station R.M. Vu E.C. 29-VII-1975).
 Obs.- Inconnu de RUPIN. Mais LE GENDRE, II p.323, indique *S. cespitosus* dans des "tourbières près Celle (Gonod et Lachenaud)".
 L. BRUNERYE (1966-1971) l'indique en de nombreuses localités de la Haute-Corrèze: Veix, Cors, Madranges, Lestards, Pradines, Grandsaigne, Tarnac, Gourdon-Murat, Bonnefond, St-Merd-les-Oussines, Meymac, Millevaches, Saint-Setiens, 600-800m.
- 168 .- *Cyperus longus* L. Submédit.- atlantique.
 -Chasteaux, près la Jugie. Alt. env. 160m, CK 79. (R.M. 16-X-1978). C'est

à peu de chose près la station de RUPIN (p.241): "Larche, bords de la route sous Cousage" (Couzage: c^{ne} de Chasteaux).

- 75² .- *Carex pairae* F.W. Schultz Euro- O asiat.-N afr.
 - Donzenac, à Espeyrut, vieux mur de schiste, R. Alt. env. 270m, CL 81. (E.C. 23-VII-1971).
 - Aubazine, ruelles, R. Alt. env. 300m CL 90. (E.C. et R.M. 3-IX-1978).
 - Champagnac-la-Prune, vu en deux points du village et au hameau des Vergnes. Alt. 403m, 470m, 471m, DL.10. (E.C. 18-VI et 9-VIII-1972; 5-VIII-1971).
 - Gumond, vieux murs du village. Alt. 488m, DL 10. (E.C. 6-VIII-1971).
 - Merlines, pentes boisées de la vallée de la Barricade, sur la D. 92, en 2 points au moins. Alt. env. 675 et 620m, DL 55. (E.C. 6-VIII-1971).
 - Saint-Setiers, à la Gane du Bos, R. Alt. 810m, DL 26. (E.C. 12-VII-1968).
 - Monceaux-sur-Dordogne, à Feneyrol, talus de la D.12, abondant. Alt. 170m, DK 18. (E.C. 17-VI- et 9-VIII-1972).
 - Saint-Pardoux-le-Vieux, à Daubech, abondant. Alt. env. 700m, DL 45. (E.C. 19-VII-1973).
 - Laval-sur-Luzège, au Pont Rouge, R. Alt. 275m, DL 31. (E.C. 21-VII-1973).
 - Bort-les-Orgues, aux Aubazines, R. Alt. env. 600m, DL 52. (E.C. 6-VII-1973).

- 169 .- *Carex pendula* Huds. (*C. maxima* Scop.) Euro-SO asiat.-N afr.
 - Cornil, ravin au Pont-de-Cornil, abondant. Alt. env. 200m, CL 90. (R.M. VII-1974). Vu E.C. 8-VIII-1977).
 - Saint-Martin-la-Méanne, au barrage du Chastang sur la Dordogne. Alt. env. 260m, DL 20. (R.M., E.C. et R. DAUNAS, 30-VII-1975).
 - Près Laval-sur-Luzège, mais c^{ne} de Soursac, ravin sur la pente boisée de la r. dr. de la Luzège à 200m en amont du Pont Rouge. Alt. env. 280m, DL 31 (E.C. 21-VII-1973).
 - Donzenac, r. g. du ruisseau le "Maumont Blanc" en amont du pont de la cote 155 sur la route de St-Germain-les-Vergnes (D.170), R. CL 81. (E.C. 2-IX-1978).
 - Aubazine, les Vayres route de Segonzac, RR. Alt. env. 155m, CL 90. (E.C. 4-IX-1978).
 - Saint-Hilaire-Peyroux, rue de la cote 266 au sud du village, et petit ravin plus au sud, à 600m environ au sud du village. Alt. env. 230m, CL 90. (E.C. 4-IX-1978).

- + 170 .- *Carex pilosa* Scop. E et Cent. eur.
 - Saint-Etienne-aux-Clos, gorges du Chavanon, r. dr., pente boisée à *Luzula sylvatica* très dense, à 500m environ au sud du moulin de Faure; atteint le fossé de l'ancienne voie ferrée. Alt. env. 600m, DL 54. (R.M. 30-V-1978). Vu la station E.C. 21-VIII-1978).

Obs.- CHASSAGNE (I, p.130) ne l'indique en Auvergne que dans les "bois clairs et secs des Monts Dôme. RR".

GRAMINÉES

- 171 .- *Eragrostis minor* Host (*E. poaeoides* Beauv.) Paléo- et néotrop. et thermo-temp. devenant subcosmopolite. Adventice, natur.
 - Chameyrat, terrain vague sur la N.89 à 250m environ au sud-ouest du pont de Mulatet (entre le Pont-de-Cornil et Tulle), R. Alt. env. 191m, CL 91. (E.C. 4-IX-1978).

A rechercher, souvent adventice ferroviaire.

- 172 .- *Avenula pubescens* (Huds.) Dum. (*Avena pubescens* Huds.; *Avenochloa*

pubescens (Huds.) Holub). Euro-asiat.

- Perpezac-le-Noir, marges de la N.20 à moins d'un km au sud du Barriolet, par petites colonies dans la grande descente sud-nord. Alt. env. 350m, CL 82. (E.C. 26-V-1972).

- Mestes, à la Serre, marge ouest de la D.982 à 100m au sud de la jonction avec la D.979, peu abondant. Alt. 682m, DL 43. (E.C. 22-V-1972).

- Valiergues, marge ouest de la D.982 au nord de l'Artaude, à l'embranchement de la route de Valiergues, sur près de 50m. Alt. 618m, DL 43. (E. C. 22-V-1972).

- Lamazière-Basse, à Bouix, sortie ouest du hameau, route d'Egletons (D.991) sur la marge nord, localement abondant. Alt. env. 570m, DL 32. (E.C. 23-V-1972).

- Clergoux, à 3 km à l'ouest, sur la route de Tulle (D.978), lieu dit "les Cambuses", par petites colonies. Alt. env. 560m, DL 11. (E.C. 23-V-1972).

+ 173 .- *Hordelymus europaeus* (L.) Harz (*Elymus europaeus* L.)

Submédio-eur.-cauc.- N afr. mont.

- Chasteaux, bois (charmaie) de la vallée d'Entrecor, avec "d'autres plantes de la hêtraie montagnarde (*Lilium martagon*, *Ribes alpinum*). R. Alt. 160m". CK 89. (L. BRUNERYE, 1971). C'est la première indication de cette plante en Corrèze.

- Merlines, route de Savennes (D.92), pente boisée de la vallée de la Barricade (chênaie-hêtraie), ravin de la cote 631, sous les hêtres, localisé, avec *Galium odoratum*. DL 55. (E.C. 21-VIII-1978, fl.).

+ 174 .- *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth. (*Deyeuxia silvatica* (Schrad.)Kuntz)

Euro-asiat. temp. surtout mont.

- Lestards, gorges de la Vézère en amont de Treignac, chênaie montagnarde (L. BRUNERYE, 1971). DL 04.

- "Bords de la Corrèze à Saint-Yrieix-le-Déjalat" (L. BRUNERYE, 1971).

Vu près du pont de Franchesse, R. (R.M. VII-1978). (Vu E.C. 22-VIII-1978). Alt. env. 600m, DL 13.

- Saint-Etienne-aux-Clos, r. dr. du Chavanon au bas de la pente boisée à 600m environ au sud de l'ancienne gare de Savennes, RR. Alt. env. 595m, DL54. (E.C. 21-VIII-1978, fl.).

- Bort-les-Orgues, berge ombragée de la Rhue, r. dr., en aval du Saut de la Saule, localisé, avec *Brachypodium pinnatum*, *Festuca heterophylla* etc... Alt. 440m, DL 62. (E.C. 7-IX-1978).

+ 175 .- *Melica nutans* L. Euro-cauc.

- Saint-Etienne-aux-Clos, pente boisée de la r. dr. du Chavanon en aval de l'ancienne gare de Savennes. Nouveau pour la Corrèze et le Limousin. Alt. env. 600m, DL 54. (R.M. 30-V-1978).

- Sarroux, forêt sous le château de Pierrefitte. Alt. env. 670m, DL 52. (Cl. et R.M. 21-VI-1978).

Obs.- Cette espèce, dont la présence était douteuse en Auvergne, y a été retrouvée tout récemment, mais fort loin de chez nous.

M.R. VIROT (1) la signale en de très rares localités du Causse de Gramat, près de Rocamadour.

(1) R. VIROT et H. BESANÇON : Contributions à la connaissance floristique de la Guyenne centrale, 3^{ème} série. Cahiers des Naturalistes, Bull. des N.P., n.s. 32 (1976) 1978, p.79.

- + 176 .- *Melica ciliata* L. s.l. Euro-asiat.-N afr.
- Soursac, route de Spontour à Laval-sur-Luzège (D.978), dans la grande côte près Spontour, rochers escarpés de la r. dr. de la Dordogne, pas rare. Alt. env. 300m, DL 30. (E.C. 5-IX-1978, fts).
Obs.- A la loupe binoculaire, les caryopses paraissent parfaitement lisses, caractère attribué par les auteurs à: *M. magnolii* Gren. et Godr. (*M. ciliata* L. ssp. *magnolii* (Gren. et Godr.) Husnot; cependant les glumes ne sont pas plus inégales que dans les plantes du Thouarsais (D.-S.) assimilées à *M. ciliata* L. ssp. *glauca* (F.W. Schultz) ROUY qui serait selon plusieurs auteurs dont M. KERGUÉLEN *Melica ciliata* L. sensu stricto; d'autre part les caractères de la panicule sont plutôt ceux de la ssp. *glauca*. Selon CHASSAGNE (I, p.92), de "fréquents passages" réunissent en Auvergne ces deux sous-espèces.
- + 177 .- *Bromus secalinus* L. Euro-O asiat.-N afr.
- Feyt, bord nord de la N.89, au pont sur le Chavanon, vers l'ouest, dans la côte, un seul pied. Accidentel. Alt. env. 640m, DL 65. (E.C. 9-VIII-1977).
Obs.- Espèce ordinairement messicole, mais en régression dans nos régions. A rechercher.
- + 178 .- *Bromus diandrus* Roth S et SO eur.-SO asiat.-N afr.
- Donzenac, entrée sud par la N.20, terrain remblayé, une colonie. Alt. env. 180m, CL 80. (E.C. 26-V-1972).
Obs.- A rechercher au sud-ouest du département: cantons de Meyssac, Brive, Larche. Espèce RR en Limousin: St-Junien, Rochechouart (Haute-Vienne).
- + 179 .- *Glyceria declinata* Bréb.
Surtout O eur., mais répartition incomplètement connue.
- Donzenac, fond sablonneux humide d'une petite carrière au sud de la Rochette. Alt. 300m, CL 81. (E.C. 23-VII-1971).
- Aubazine, dans le bourg, petit fossé sur la D.130E près de l'église, à l'entrée du sentier qui monte vers le canal des Moines, avec *Stellaria alsine*, *Carex laevigata*. Alt. env. 250m, CL 90. (E.C. 4-IX-1978).
- Gimel, fond sablonneux humide d'une petite carrière à Mainchon, sur l'ancien tracé de la N.89. Alt. env. 400m, DL 01. (E.C. 5-IX-1978).
- La-Roche-Canillac, fond de carrière humide à *Epilobium (roseum etc.)*, r. dr. du Doustre, à l'est de la Roche-Haussière. Alt. env. 350m, DL 10. (E.C. 20-VII-1973. Vu la station R.M. 30-VII-1975).
- Champagnac-la-Prune, 1^o: mare dans un pré en pente au nord du Chassang, avec *Stellaria alsine*; 2^o: tout à l'ouest du village, marge mouillée d'un petit chemin entre la D.131 et Perbos. 3^o: tout au nord du village, fossé ouest de la D.131, abondant sur 20m. Alt. 450, 430 et 470m. DL 10. (E.C. 5 et 6-VIII-1971).
- Environs de Treignac, pré de pente humide, r. g. de la Vézère, près de Pré-Palier, c^{ne} d'Affieux. Alt. env. 440m, DL 04. (E.C. 24-VII-1971).
- Lestards, entre Vaux et la Croix du Borgeix à l'est du lac des Bariousses, fossé est de la route, localement abondant avec des *Montia*. Alt. env. 550m, DL 04. (P. BIGET et E.C. 18-VIII-1971).
- Tarnac, bord sud de la D.109, à Chabennes, petit abreuvoir sur la D.109 à 200m à l'est du hameau, avec *Gl. fluitans*; et à 400m plus à l'est, bord sud de la route, à l'angle d'un bois. Alt. env. 840 et 820m, DL 25. (E.C. 4-VII-1973).
- Monceaux-sur-Dordogne, à Feneyrol, sur la D.12, petite place humide à côté d'une maison abandonnée. Alt. 170m, DK 18. (H. BOUBY et E.C. 9-VIII-1972).
- Chenailler-Mascheix, à Bettu, pente herbeuse, dans les empreintes de sabots

des bovins, avec *Gl. fluitans*, *Polygonum hydropiper*. Alt. env. 420m, DK 08. (R.M., E.C. et R. DAUNAS, 29-VIII-1975).

- "Bord de ruisseau à Chamberet. Alt. 450m". (L. BRUNERYE, 1971). DL 04.

Obs.- Espèce répandue en Limousin, mais longtemps méconnue.

180 .- *Festuca heterophylla* Lam. Submédio-eur.-SO asiat.

- Bar, berge de la Corrèze, r. g. en aval de Fontemazeaud, disséminé. Alt. 247m, DL 01. (R.M. Vu la station E.C. 31-VII-1975).

- Brivezac: pente boisée de la r. dr. de la Dordogne, sur la D.12, à 1 km environ au sud de Brivezac, localement abondant. Alt. 160m, DK 08. (E.C. 17-VI-1972).

- Feyt, bord nord de la N.89 au bas de la pente boisée, un peu à l'ouest du pont sur le Chavanon (hêtraie). Alt. env. 640m, DL 65. (E.C. 9-VIII-1977).

- Merlines, pentes boisées de la r. g. de la Barricade, sur la D.92, localement abondant à la cote 675. Vu aussi, R, un peu plus bas que la cote 631 (chênaie-hêtraie), DL 55. (E.C. 20 et 21-VIII-1978).

- Saint-Etienne-aux-Clos, pente boisée de la r. dr. du Chavanon à 500m environ en aval du moulin de Faure. Alt. env. 600m, DL 54. (E.C. 21-VIII-1978).

- Bort-les-Orgues, berge ombragée de la r. dr. de la Rhue en aval du Saut de la Saule, mêlé à *Calamagrostis arundinacea*. Alt. 440m, DL 62. (E.C. 7-IX-1978).

Obs.- Espèce peu signalée en Corrèze jusqu'à présent. RUPIN (p.259) ne cite que la localité d'Argentat.

+ 181 .- *Festuca arvernensis* Auquier, Kerguélen et Markgr.- Dannenb.
Endémique française.

- Bort-les-Orgues, rochers sur la petite route montant aux Orgues par Chantery et sur les Orgues mêmes. Alt. env. 650m, DL 52. (E.C. 7-IX-1978).

Déterm. M. KERGUÉLEN. V. P. AUQUIER et M. KERGUÉLEN, 1977: description et répartition.

Obs.- Serait-ce, au moins partiellement, le "*F. duriuscula* L. var. *glauca* Koch"? de RUPIN (pp.258-259)? ("Bort, dans les bois dominant la ville sous les orgues, route d'Ussel").

182 .- *Catapodium tenellum* (L.) Batt. et Trabut (*Catapodium halleri* (Viv.) Reichenb.; *Nardurus lachenalii* (C.C. Gmel.) Godron).

Submédit.-Subatlantique.

- Saint-Yrieix-le-Déjalat, vieux mur du village (forme aristée: var. *tenuiculum* (Loisel.) Kerguélen). Alt. env. 740m, DL 13. (R.M. 1974). Vu la station E.C. 31-VII-1975).

- Donzenac, à Travassac, sortie sud, dans l'ancienne ardoisière (forme mutique: var. *tenellum*). Alt. env. 300m, CL 80. (E.C. 26-V-1972).

- Aubazine, rochers de la Brèche de St-Etienne sur le Canal des Moines (var. *tenellum*). Alt. env. 380m, CL 90. (R.M. Vu la station E.C. avec la S.B.C.O. 3-IX-1978).

- Saint-Hilaire-Peyroux, rochers escarpés de la r. dr. de la Corrèze, sur la D.141E, à env. 700m de sa jonction avec la N.89 au pont de la cote 143 (var. *tenellum*. Alt. env. 150m, CL 90. (E.C. 4-IX-1978).

Obs.- C'est le "*Festuca tenuicula*" de RUPIN (p.259): "Plateaux sablonneux de Vialmur".

SPARGANIACÉES

- 183 .- *Sparganium emersum* Rehm. (*S. simplex* Huds.) Holarctique.
- Etang de Ruffaud près Gimel, avec *Luronium natans*, *Ranunculus omiophyllus*, sous la bonde. Alt. 500m, DL 11. (R.M., L.B. et E.C. 8-VIII-1977,fl.)

LILIACÉES

- 184 .- *Veratrum album* L.
- Saint-Rémy, r. g. de la Liège entre le pont de chemin de fer situé au sud de Mirambel et le confluent du ruisseau de St-Rémy, environ 10 pieds disséminés sur 450m. Alt. 680m, DL 45. (E.C. 22-V-1972).
- Millevaches, au sud-est du village, prairie montueuse, R. Alt. env.890m, DL 25. (E.C. 5-VII-1973).
- Saint-Merd-les-Oussines, r. g. de la Vézère au bas de la D.164, à 1300m avant Fournol, R. 770m; prairie marécageuse tout près de cette station, à 20m au sud de la route, une petite colonie, 780m. DL 25. (E.C. 5-VII-1973)
- Saint-Merd-les-Oussines, prés montueux sur la r. g. du moulin du Merle près Fournol et berges du ruisseau, assez abondant. Alt. env. 800m, DL 25. (Vu E.C. 5-VII-1973, la localité était connue de M.L. BRUNERYE).
- Aix, prairie marécageuse montueuse près Châlons, côté O de la N.89, r. dr. du ruisseau de la Barricade, RR. Alt. env. 730m, DL 55. (R.M. et E.C. 7-IX-1977).
- 185 .- *Paris quadrifolia* L. Euro-cauc.-sibér. temp.
- Saint-Etienne-aux-Clos, pente boisée de la r. dr. du Chavanon à 500m environ au sud du moulin de Faure. Alt. env. 600m, DL 54. (R.M. 30-V-1978. Vu la station E.C. 21-VIII-1978).
- Sarroux (RUP.!), forêt sous le château de Pierrefitte. Alt. 670m, DL 52. (Cl. et R.M. 21-VI-1978).
- 87² .- *Maianthemum bifolium* (L.) Schmidt Circumbor. Surtout mont.
- Chaumeil, le Suc au May, à 20m de la Table d'orientation, une colonie au bord du bois (chêne péd.). Alt. 908m, DL 13. (E.C. 26-V-1972).
- Perpezac-le-Noir, bois en aval du Barriolet. Alt. † 350m, CL 82. (L. CHANTEMERGUE (1), herb. Date?).
- 186 .- *Scilla bifolia* L. S et Cent. eur.- SO asiat.(submédit.:P.F.)
- Ravin, au Pont-de-Cornil. Alt. env. 200m, CL 90. (R.M.).
- Lamazière-Basse, route d'Egletons (D.991), ravin du Pré Neuf, dans la grande descente vers le pont des Bouyges sur la Luzège. Alt. 467m, DL 32. (E.C. 23-V-1972, fts.).
- 187 .- *Scilla lilio-hyacinthus* L.
Euatl. mont. (pyrénéo-cantabrique-aquitainien) (P. DUPONT).
- Saint-Etienne-aux-Clos, pente boisée de la r. dr. du Chavanon à 500m environ en aval du moulin de Faure, avec *Carex pilosa*. Colonie très vaste et très dense. Alt. env. 600m, DL 54. (R.M. 29-V-1978. Vu la station E.C. 21-VIII-1978, fts.).
- Merlines, pentes boisées de la r. g. de la Barricade, sur la D.92 (route de Savennes), ravin de la cote 631, assez abondant. DL 55. (E.C. 21-VIII-1978, fts.).
- Sarroux, forêt sous le château de Pierrefitte. Alt. 600m, DL 52. (Cl. et R.M. 21-VI-1978).
- 188 .- *Erythronium dens-canis* L. Orophyte euro-asiat. temp. (CHASSAGNE).
- Saint-Pardoux-le-Vieux, bois d'Iolet, en bordure de la forêt de Bellechassagne. ALT. 680m, DL 45. (E.C. 22-V-1972).

(1) Ancien Principal du Collège moderne d'Uzerche.

- Neuvic, route d'Egletons (D.991), bas de pente boisée à 40m avant le pont sur le Vianon. Alt. 540m, DL 32. (E.C. 23-V-1972).
- Lamazière-Basse, route d'Egletons (D.991), ravin du Pré Neuf à 600m avant le pont des Bouyges sur la Luzège (hêtre et résineux). Alt. env. 475m, DL 32. (E.C. 23-V-1972).
- Bords de la Vézère, à 2 km en amont d'Uzerche. Alt. env. 300m? CL 83. (L. CHANTEMERGUE, herb.).
- Mémoire, taillis de châtaigniers sur le flanc nord d'une colline, à la Graffoulière. Alt. env. 550m, DK 09. (R. LUGAGNE).
- Lagraulière, bord du Brézou, en forêt de Blanchefort. Alt. 330m, CL 92. (Cl. M. 10-V-1978).

ORCHIDACÉES

- 189 .- *Epipactis palustris* (L.) Crantz Euro-asiat. temp.-N. afr.
 - Altiliac, r. g. de la Dordogne, en aval du château d'Estresse, parmi les *Equisetum hyemale*, R. Alt. env. 139m, DK 07. (H. BOUBY et E.C. 9-VIII-1972, encore fl.).
- 94² .- *Neottia nidus-avis* (L.) L.C.M. RICH. Euro-O asiat.
 - Sarroux (RUP.!), forêt sous le château de Pierrefitte. Alt. 670m, DL 52. (Cl. et R.M. 21-VI-1978).

Rectification. Une lettre de M. R. VIROT, du 1^{er} juin 1978, au sujet du compte rendu de la sortie du 12 juin 1977 à Chasteaux (Corrèze) où nous citons le chêne sessile (plus ou moins hybridé) déclare: "...or celui-ci est complètement absent de toute l'Aquitaine centrale.... (et c'est) une forme glabre du chêne pubescent Certains individus de cette variété glabre dépassent 20 mètres, mais le tronc tortueux, tout à fait différent du sessile, ne laisse aucun doute à cet égard". Dont acte.



INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.

AUQUIER (P.) et KERGUÉLEN (M.)

- 1977 - Un groupe embrouillé de *Festuca* (*Poaceae*): les taxons désignés par l'épithète "glauca" en Europe occidentale et dans les régions voisines. *Lejeunia*, n.s., n° 89, déc. 1977, pp.1-82.

BRUNERYE (L.)

- 1966 - Quelques plantes rares ou intéressantes des Monédières, premier complément au Catalogue d'Ernest RUPIN. Bull. Soc. hist. et archéologique de la Corrèze, Brive, t.88, pp.10-20.
- 1971 - Deuxième complément au Catalogue des plantes de Corrèze: stations d'espèces nouvelles, rares ou intéressantes. Ibid., t.93, pp. 11-17.

BRUNERYE (L.) et MAISONNEUVE (R.)

- 1975 - Troisième complément au Catalogue des plantes de la Corrèze.
Ibid., t.97, pp. 29-36.

CALLÉ (J.), LOVIS (J.D.) et REICHSTEIN (T.)

- 1975 - *Asplenium X contrei* (*A. adiantum-nigrum* X *A. septentrionale*)
hybr. nova et la vraie ascendance de l'*Asplenium X souchei* Litard.
Candollea, 30, 1975, pp.189-201, 2 fig., 10 planches.

CHASSAGNE (M.)

- 1956 -1957- Inventaire analytique de la Flore d'Auvergne et contrées
limitrophes des départements voisins. 2 vol. Paris (Lechevalier
édit.).

LE GENDRE (Ch.)

- 1914-1922- Catalogue des plantes du Limousin. 2 vol. 312 et 410 p.
Edité par la Soc. bot. et d'Etudes Scient. du Limousin. Limoges.
1926 - Supplément au Catalogue des plantes du Limousin. Ibid., 94 p.

LITARDIERE (R. de)

- 1911-1912- Aperçu sur la végétation estivale de la Courtine (Creuse).
Bull. Soc. Bot. des Deux-Sèvres, 1911-1912, pp. 105-114.

MAISONNEUVE (R.) (V. aussi BRUNERYE et MAISONNEUVE)

- 1977 - Espèces intéressantes (et souvent inédites) du département de la
Corrèze. Bull. Soc. Bot. du Centre-Ouest, n. s., t.8, pp.113-123.

VILKS (A.)

- 1973 - Un genêt à fleurs blanches: *Cytisus multiflorus*, naturalisé en
Haute-Vienne. Bull. Soc. Bot. du Centre-Ouest, n. s., t. 4,
pp. 40-44.

VIVANT (J.)

- 1976 - *Dryopteris oreades* Fomin (= *D. abbreviata* auct. non DC.) et *As-*
plenium Csikii Kümmerle et Andrastovski dans les Pyrénées oc-
cidentales franco-espagnoles. Première partie : Présence de
Dryopteris oreades Fomin dans les Pyrénées-Atlantiques. Bull.
Soc. Bot. de France, t. 123, pp. 83-86.

