

## Compte rendu de la sortie mycologique du 17 octobre 1982 près de Boisredon (Charente-Maritime)

par Ch. YOU (\*)

Une vingtaine de sociétaires s'étaient donné rendez-vous sur la place de l'église de Boisredon pour une expédition dans la forêt de Bondou située à l'extrême limite de la Charente-Maritime et de la Gironde, séparée par un bras de la Livenne, forêt formée en grande partie de pins, chênes et châtaigniers.

L'après-midi fut consacré à la visite de bois situés à la limite des communes de Courpignac, de Boisredon et de Soubran, (route de Boisredon à Soubran).

Les espèces, sans être très nombreuses, furent tout de même variées.

Nous avons relevé :

<i>Agaricus</i>	: <i>macrosporus</i> <i>silvicola</i>	<i>Hypholoma</i>	: <i>fasciculare</i>
<i>Amanita</i>	: <i>rubescens</i> <i>muscaria</i> <i>pantherina</i>	<i>Hebeloma</i>	: <i>crustuliniforme</i> <i>sinapizans</i> <i>mesophaeum</i>
<i>Boletus</i>	: <i>granulatus</i> <i>badius</i> <i>edulis</i> <i>luteus</i> <i>bovinus</i>	<i>Inocybe</i>	: <i>lanuginosa</i> var. <i>ovatocystis</i> <i>dulcamara</i> <i>kühneri</i> = <i>eutheles</i> ss. K.R. <i>subtigrina</i> Kühn.
<i>Calocera</i>	: <i>viscosa</i>	<i>Lactarius</i>	: <i>chrysorrheus</i> <i>deliciosus</i> <i>cimicarius</i> <i>uvidus</i>
<i>Calodon</i>	: <i>nigrum</i>	<i>Lepiota</i>	: <i>josserandii</i> (= <i>helveola</i> ss. joss.)
<i>Crepidotus</i>	: <i>mollis</i>	<i>Lepiota</i>	: <i>clypeolaria</i> var. <i>metulaespora</i>
<i>Clitocybe</i>	: <i>dealbata</i> <i>odora</i>	<i>Leucocoprinus</i>	: <i>brebissonii</i>
<i>Collybia</i>	: <i>maculata</i> <i>butyracea</i>	<i>Marasmius</i>	: <i>cohaerens</i> <i>hudsoni</i>
<i>Cortinarius</i>	: <i>vibratilis</i> <i>azureus</i> <i>paleaceus</i> <i>purpurascens</i> <i>violaceus</i>	<i>Mycena</i>	: <i>inclinata</i> <i>polygramma</i> <i>pura</i> <i>epipterygia</i> <i>seynii</i>
<i>Gymnopilus</i>	: <i>penetrans</i>		
<i>Galera</i>	: <i>marginata</i>		
<i>Hygrophoropsis</i>	: <i>aurantiaca</i>		
<i>Hygrophorus</i>	: <i>eburneus</i>		

(\*) Ch. Y : 9, cité Croix Chaillebourg, 17800 PONS.

	<i>filopes</i>	<i>Scleroderma</i>	: <i>citrinum</i>
	<i>galopus</i> v. <i>nigra</i>	<i>Sarcodon</i>	: <i>imbricatum</i>
<i>Pluteus</i>	: <i>cervinus</i>	<i>Tricholoma</i>	: <i>rutilans</i>
	<i>fayodii</i>		<i>sulfureum</i>
<i>Phallus</i>	: <i>impudicus</i>		<i>vaccinum</i>
<i>Russula</i>	: <i>emetica</i> var.	<i>Tremella</i>	: <i>mesenterica</i> .
	<i>sylvestris</i>		
	<i>emetica</i> var.		
	<i>betularum</i>		
	<i>fragilis</i>		
	<i>parazurea</i>		
	<i>xerampelina</i>		
	<i>odorata</i>		
	<i>turci</i>		
	<i>caerulea</i>		
	<i>sardonia</i>		

---

**Note sur la sortie mycologique  
du 17 octobre 1982  
en forêt de Saint-Sauvant  
et au bois de Mauprié (Vienne).**

par Hubert FROUIN (\*)

Cette excursion, organisée en commun avec la Société Mycologique du Poitou, a attiré fort peu de membres de la S.B.C.O., sans doute en raison de l'exposition à Niort le même jour.

Personne n'ayant été chargé de rendre compte de cette sortie, je voudrais pourtant citer trois espèces notables vues ce jour-là.

D'abord, sous des mélèzes, un magnifique groupe de *Suillus grevillei* (= *Boletus elegans*), dont la rareté dans nos plaines est égale à celle de l'arbre qui lui est associé.

Ensuite, *Nolanea caelestina*, joli petit champignon bleu, en touffes ; il est voisin, mais cependant d'instinct, de *Leptonia euchroa*.

Enfin, de beaux spécimens d'*Agaricus placomyces* Peck. var. *meleagris* J. Schff., du groupe *xanthoderma*, dans un chemin embocagé et bourbeux.

En dehors de ces formes, un contingent de banalités, dont le relevé n'a d'ailleurs pas été effectué, a, naturellement, garni les paniers des participants.

---

(\*) H.F. : La Plaine, 49360 MAULEVRIER.