

## ***Onosma fastigiata* subsp. *atlantica***

par M. KERGUÉLEN\*

**Résumé** - La validation du nom cité est proposée.

**Mots clefs** : Validation. *Onosma*.

### **Introduction**

Ce nom « *Onosma fastigiata* Br.-Bl. subsp. *atlantica* » a été proposé, pour la première fois semble-t-il, en 1975, par J. BRAUN-BLANQUET in GUINOCHET & al. (1975, p. 584), et repris par le même auteur, in JOVET & VILMORIN (1977, pp. 370-371) — Voir par ex. à ce sujet GREUTER & al. (1984, p. 107) — pour représenter le « *O. echioides* » des auteurs des flores de Charente-Maritime, par ex. LESSON, Fl. Rochef., pp. 344-345, 1835 ou les diverses éditions de LLOYD, Fl. Ouest Fr., etc...

Malheureusement, le nom « subsp. *atlantica* Br.-Bl. » est invalide, selon les dispositions du Code de Nomenclature, qui exige une **diagnose latine et la désignation d'un type nomenclatural**. Notre propos sera seulement de valider la description proposée, sans prendre parti sur le choix d'un rang taxonomique pour la plante si particulière des environs de Rochefort !

***Onosma fastigiata* (Br.-Bl.) Lacaita subsp. *atlantica* Br.-Bl.**  
ex Kerguélén, *subsp. nov.*

Planta perennis, cum caulibus multis, geniculatis, viridis-lutea. Ab *Onosma fastigiata* subsp. *fastigiata* differt : usque ad 30 cm alta (versus 60 cm) ; caulibus simplicibus (versus ima tantum basi ramosis) ; setis incanis minus densis, non appressis ; foliis planis, non marginibus revolutis ; setis foliorum cum tuberculis glabris, parvis, vel nullis (versus tuberculis foliorum saepe circa setam pilosis) ; calycibus 19-22 mm, cum pilis lucentibus plusminusve rigidis, rectis ; corollis 15-16 mm longis (versus 20-24) ; antheris inclusis ( $\pm$  exclusis).

Typus : « *Onosma echioides* L. Herbarium Dr GUÉTROT, acquis en 1943.

— Herbarium D. LUIZET/ Charente-Inférieure, coteaux calcaires/ St-Christophe, legit L. CADECEAU Flore de France. 15 juin 1890 » P !.

---

\* Michel KERGUÉLEN, INRA-GEVES, La Minière, F-78280 GUYANCOURT.

**Bibliographie**

- COPINEAU, C., 1890. — Rapport de M. Charles COPINEAU sur l'herborisation faite, le 15 juin, dans les bois de St-Christophe. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, **37**, Sess. extr. à La Rochelle, juin 1890, p. XXX (« *Onosma echioides* »).
- GREUTER, W., BURDET, H. M. & LONG, G. (éd.), 1984. — Med-Checklist. Genève, éd. Conserv. Jard. Bot. Ville de Genève. 1, *Pteridophyta* (éd. 2), *Gymnospermae*, *Dicotyledones (Acanthaceae-Cneoraceae)*, I-XVI, 330 pp., XVII-C, cartes.
- GUINOCHET, M. & VILMORIN, R. de (1975). — Flore de France. Paris, éd. C.N.R.S. *fasc. 2*, pp. 367-1199, fig.
- JOVET, P. & VILMORIN, R. de, 1977. — Flore descriptive et illustrée de la France par l'abbé H. COSTE (Suppléments). Paris, Libr. Sci. et Techn. Albert Blanchard, *Quatrième Suppl.*, pp. 339-478, 18 fig. (1977) des Lobéliacées (n° 2321) aux Salicacées (n° 3309) [pp. 390-478, *Thymus* par M. DEBRAY].