

## L'année bryologique 1986

par R.B. PIERROT\* et collaborateurs.

Contributions de MM. P. BOUDIER, E. DEBON, R.B. PIERROT, P. PLAT,  
J. SAPALY, R. SORNICLE, A. TERRISSE.

**Résumé.** Espèces nouvelles ou intéressantes pour le Centre-Ouest. Compléments à la bryoflore française.

En plus de récoltes intéressantes, l'année 1986 est marquée par des acquisitions remarquables, telles que *Schistidium maritimum* en Vendée par P. BOUDIER, *Dichelyma falcatum* dans les Pyrénées françaises par A. TERRISSE, *Pyramidula algeriensis* par E. DEBON (espèce nouvelle pour la France récoltée en 1959, mais restée inédite).

### 1. Centre-Ouest.

#### 1.1. Espèces nouvelles ou remarquables.

(\* : esp. nouvelle pour le département ; \*\* : esp. nouvelle pour la région).

*Anthoceros punctatus* L. 16, Ansac, CM 19, 23.9.86, CHARRAUD et ROGEON.

\* *Fossombronia pusilla* (L.) Nees. 16, Angoulême, Les Trois-Chênes, BL 76, 11.1985, R. BÉGAY, det. ROGEON.

*Jungermannia atrovirens* Dum. 17, St-Porchaire, La Rochecourbon, XR 77, 18.5.86, de ZUTTERE, R.B.P., SOTIAUX.

*Marchantia polymorpha* L. 17, St-Porchaire, La Rochecourbon, XR 77, 18.5.86, de ZUTTERE, R.B.P., SOTIAUX.

\* *Phaeoceros laevis* (L.) Prosk. 16, Messeux, BM 90, 2.11.1981, ROGEON.

\* *Riccia crozalsii* Lev. 85, Ile d'Yeu, pelouse à *Ophioglossum lusitanicum* aux abords de l'aérodrome, WS 47, 11.4.86, P. BOUDIER, vid. JOVET-AST. (voir note sur l'île d'Yeu dans le présent bulletin).

*Riccia huebeneriana* Lindenb. 16, Ansac, CM 19, 23.9.86, CHARRAUD et ROGEON.

*Amphidium mougeotii* (B. & S.) Schimp. 86, Brigueuil-le-Chantre, CM 53, 29.7.85, P. PLAT.

*Mnium marginatum* (With.) P. Beauv. 86, Brigueuil-le-Chantre, CM 53, 8.10.86, ROGEON et PLAT.

*Orthotrichum pulchellum* Brunt. 17, quelques tiges se maintiennent depuis 1982 au Grand-Village, XR 37 (1.3.86, R.B.P.).

\*\* *Schistidium maritimum* (Turn.) B. & S., c. fr. 85, Ile d'Yeu, falaise de la côte sau-

---

\* R.B.P., Les Andryales, 17550 Dolus.

vage vers la pointe des Corbeaux, WS 57, 10.4.86, P. BOUDIER, vid. R.B.P. (voir note sur l'île d'Yeu dans le présent bulletin).

\* *Sphagnum tenellum* (Brid.) Bory. 85, Challans, Le Préneau, WS 88, 25.6.86, BOUZILLÉ et GODEAU, det. R.B.P..

*Ulota phyllantha* Brid. 85, Jard-sur-Mer, XS 2, 28.5.86, HÉRAULT, L. et R.B.P..

## 2. Récoltes intéressantes hors du Centre-Ouest.

### 2.1. Contribution de P. BOUDIER

#### Finistère

- Bryophytes observées et récoltées à l'île Molène le 08.10.1986, UTM UU 56 :

*Cephaloziella divaricata*

*Fossombronia* sp.

*Frullania dilatata*

*Frullania tamarisci*

*Gongylanthus ericetorum* (N° 900)

*Lophocolea heterophylla*

*Scapania compacta* (N° 904)

*Bryum alpinum* (N° 904)

*Bryum capillare*

*Bryum radiculosum* (N° 897)

*Campylopus brevipilus* (N° 901)

*Campylopus introflexus*

*Desmatodon heimii* (N° 896)

*Grimmia trichophylla* (N° 903)

*Homalothecium lutescens*

*Hypnum cupressiforme*

*Polytrichum juniperinum*

*Tortella flavovirens* (N° 898)

*Tortula ruraliformis*

*Trichostomum littorale* Mitt. (N° 899)

*Ulota phyllantha* (N° 902)

*Zygodon baumgartneri* (N° 895)

#### Ariège :

*Seligeria donniana* c. fr.. Sentein, vallée de l'Isard, forêt de la Côte sur rocher à Ramonda myconi vers 1200 m. 02.07.1986 - n° 644 - CH 24.

#### Drôme :

*Seligeria acutifolia* c. fr.. (vid. R.B. PIERROT). Les Prés, en bordure de la D.306 près du carrefour du chemin du Chouet. Fissure dans roches marneuses avec *Eucladium verticillatum* et *Trichostomum crispulum*. 05.1980 - n° 26/877 et 26/879 - GK 03.

#### Eure-et-Loir :

*Orthodontium lineare* c. fr.. Senonches, forêt de Senonches près du rond de la Sablonnière, sur souche pourrissante en compagnie de *Dicranum scoparium*, *Dicranum montanum*, *Tetraphis pellucida* et *Lophocolea heterophylla*. 27.04.1986 - n° 595 - CP 57. 4<sup>e</sup> localité pour l'Eure-et-Loir.

*Seligeria donniana* c. fr.. Châteaudun, coteau du Loir au bois des Gâts. 08.05.1986 - n° 613 - CP 72. 2<sup>e</sup> localité pour l'Eure-et-Loir.

### 2.2. Contribution de P. BOUDIER et R. SORNICLÉ

#### Loiret

Récoltes effectuées le 30.09.1986 et complétées au petit étang de Veautre le 29.10.86 par R. SORNICLÉ. Références des récoltes dans l'herbier de P. BOUDIER.

*Nowellia curvifolia*, Dampierre-en-Burly, sur souche pourrissante de Pin sylvestre près de la queue de l'étang de Corcambon, UTM : DN 69. N° 885.

*Fossombronia foveolata* (vid. R.B.P.), Dampierre-en-Burly, zone tourbeuse en queue de l'étang de Corcambon, UTM : DN 69. N° 887.

*Bryum bornholmense*, N° 882-01 et 924 (vid. R.B.P.) ; *Bryum tenuisetum*, n° 882-02 (vid. R.B.P.) ; *Bryum klinggraeffii*, n° 925 ; *Ephemerum serratum*, *E. sessile*, n° 880 ; *Drepanocladus aduncus*, n° 883 ; *Riccia canaliculata*, n° 881-01 ; *Riccia cavernosa*, n° 881-02 ; Sully-sur-Loire, petit étang de Veautre, UTM : DN 49.

*Bryum tenuisetum* (vid. R.B.P.), Isdes, en bordure de l'étang de Ste-Claire, UTM : DN 47. N° 884.

### 2.3. Contribution du Dr DEBON.

*Pyramidula algeriensis* Chadeau & Douin. Alpes-Maritimes, Aspres de Biot, 6.12.1959, dét. R.B.P., vid. V. ALLORGE et M. BIZOT. Espèce nouvelle pour la France, restée inédite. Bryologue averti, au coup d'œil remarquable, le Dr DEBON est décédé le 20.10.1986 ; il laisse un herbier important.

### 2.4. Contribution de R.B. PIERROT.

*Lophocolea fragrans* (Moris et De Not.) Gott. et al. : Côtes-du-Nord, Ploumanach, VV 4, rochers humides, avec *Heterocladium heteropterum*, 12.8.1966.

*Metzgeria temperata* Kuw. : Ain, forêt de Seillon, avec *Platygyrium repens* sur hêtre, S.E.M. n° 2083, P. CUYNET, det. R.B.P. 1986.

*Campylopus introflexus* (Hedw.) Brid. : Toujours en expansion ; récolté à 44 Por-nic, WT 4, 29.5.86, et 56 Arzon, WT 1, pointe de Kerners, 2.6.86.

*Encalypta microstoma* Bals et De Not.. Hautes-Alpes, massif du Pelvoux, Glacier Blanc, près du refuge, 2500 m, N° 226, 10.8.1959, E. BONNOT et R.B.P., det. R.B.P. 1986.

*Fissidens rufulus* B.S. & G. : Finistère, Huelgoat, VU 1, blocs dans la rivière, 30.7.1954, R.B.P. 54172, det. BRUGGEMAN-NANNENGA (cf. The Section *Pachylomidium* (genus *Fissidens*), III. The *F. crassipes*-subcomplex (*F. bryoides*-complex), Proceedings of the Kon. Nederl. Akademie van Wetenschappen, series C, vol. 85 (1) : 59-104, 1982).

*Tortella flavovirens* (Bruch) Broth. var. *glareicola* (Christ.) Crundw. & Nyh. : Morbihan, St-Gildas-de-Rhuys, WT 1, 3.6.86.

### 2.5. Contribution de P. PLAT.

*Cololejeunea minutissima* (Sm.) Schiffn. : 36, St-Aigny, CM 46, 22.4.86.

*Lejeunea ulicina* (Tayl.) Gott. et al. : 36, Mérigny, CM 46, 16.4.86.

*Anomodon longifolius* (Brid.) Hartm. : 36, St-Aigny, CM 46, 22.4.86.

### 2.6. Contribution de J. SAPALY.

*Lejeunea lamacerina* (Steph.) Schiffn. : 15, Tourniac, DL 37-07, 13.08.86 ; 15, Arnac, DK 35-92, 21.08.86 ; 19, Soursac, DL 35-12, 13.08.86.

*Ptilidium ciliare* (L.) Hampe : 63, Le Mont-Dore, DL 86-43, 19.09.86 ; 63, Chambon-du-Lac, DL 88-42, 20.09.86.

*Ptilidium pulcherrimum* (G. Web.) Vainio : 43, Lavoute-sur-Loire, EK 70-97, 02.05.86.

*Hyocomium armoricum* (Brid.) Wijk & Marg. : 15, Cros-de-Montvert, DK 35-92, 06.08.86.

*Thuidium recognitum* (Hedw.) Lindb. : 15, Brezons, DK 35-92, 06.08.86.

### 2.7. Contribution de A. TERRISSE.

*Dichelyma falcatum* (Hedw.) Myr. : Pyrénées-Orientales, Angoustrine, DH 15-16, étang du Recou de la Grave, 2175 m, 1.09.86, dét. R.B.P. (1<sup>re</sup> localité des Pyrénées françaises ; une seule autre localité — inédite — dans les Alpes françaises).

### 3. Détermination des *Riccia*.

S. JOVET-AST. Les *Riccia* de la région méditerranéenne (*Cryptogamie-Bryologie-Lichénologie*, Tome 7, supplément au fascicule 3 : 283-431, 1986). 187,20 F franco, Cryptogamie-Bryol.-Lichén., 12, rue de Buffon, 75005 Paris.

Après avoir précisé les limites, les caractères des climats et des sols de la région méditerranéenne, l'auteur donne des généralités sur les *Riccia* méditerranéens. Ensuite, la partie la plus importante est consacrée aux 31 espèces reconnues dans la région étudiée : clés de détermination, description, remarques, habitat, distribution de chaque espèce qui est abondamment figurée (65 planches). Une bibliographie et un index complètent ce fascicule.

Cette étude remarquable d'un genre difficile, faite par une éminente spécialiste, rendra les plus grands services aux bryologues (qui l'attendaient depuis longtemps !) et aussi à tous les botanistes qui s'intéressent à la flore méditerranéenne. Elle constitue un outil indispensable à une bonne connaissance des espèces. L'auteur traite de la quasi-totalité des *Riccia* d'Europe : seuls *R. breidlerii*, *R. rhenana* (2 espèces non méditerranéennes présentes en France) et le très rare *R. daslandica* de Scandinavie n'y figurent pas.

R.B.P.

Il est envisagé de créer, au sein de la Société Botanique du Centre-Ouest, un groupe d'échanges de muscinées. Les sociétaires intéressés sont priés de se faire connaître avant le 1<sup>er</sup> janvier 1988 à : « P. BOUDIER, 17 rue des Moireries, Meslay-le-Vidame, 28360 Dammarie ». Selon le nombre de réponses, un règlement sera élaboré. Toutes suggestions sur l'organisation seront bienvenues.