

Glanures lichénologiques en Haute-Corrèze (Secteur Eymoutiers - Treignac - Bugeat - Gentioux)

par Jean BEGUINOT (*)

* Intéressant ensemble de *Cladoniae* terricoles dans la belle junipéraie-callunaie de Bellevue, entre Faux-la-Montagne et Gentioux : composition spécifique classique mais remarquable luxuriance (et fertilité) en exposition sud. Citons notamment : *Cladonia portentosa*, *Cladonia ciliata* var. *ciliata* et var. *tenuis*, *Cladonia arbuscula*, *Cladonia uncialis*, etc...

* Conformément au climat général subatlantique submontagnard de la région, les familles Pannariacées, Stictacées, Peltigéracées, Néphromacées sont assez bien représentées, en particulier sur les écorces. Sont répandues sur l'ensemble de la dition : *Pannaria conoplea*, *Lobaria scrobiculata*, (*Lobaria pulmonaria* plus répandu aux altitudes dépassant 700 m environ), *Sticta limbata*, *Peltigera collina*, *Nephroma parile* (type et, parfois, var. *reagens*), *Nephroma laevigatum*. Paraissent bien plus localisées : *Pannaria mediterranea* [à la traversée du ruisseau des Sagnes, entre La Celle et Villefauneix, très près d'une des plus luxuriantes stations de *Dendriscoaulon umhausense* (cf. Bull. SBCO 1983, 14, 158-159)], *Parmeliella plumbea* var. *myriocarpa* (même station et bois de Tarnac), *Lobaria amplissima* (un thalle stérile et non céphalodié à l'entrée sud de Villefauneix), *Sticta fuliginosa* (« Rocher des Folles » à Treignac et vallon forestier, 1 km à l'ouest de Tarnac).

* Ces caractéristiques climatiques expliquent également :

- l'abondance d'Usnées telles *Usnea ceratina* et la présence, localement, d'*Usnea rubicunda* (codominante avec *Cladonia caespititia* sur vieux tronc de châtaignier au « Moulin du Roc », entre Chamberêt et Doms ;

- la fréquence de *Graphis elegans* (surtout sur houx) et des *Cetrelia* du groupe *olivetorum* : *Cetrelia cetrarioides* (Duby) Culb. et Culb. et *Cetrelia monachorum* (Zahl.) Culb. et Culb., cette dernière chemoespèce remarquablement fructifiée dans le bois de Remeniéras entre Le Mazalaigue et La Celle (cf. Bull. SBCO 1984, 15, 151-152), station très menacée par une coupe à blanc en cours ;

- la présence de *Ephebe lanata* (sur affleurement granitique dans clairière, sur la pente occidentale du Mont Cé, 1 Km au sud du Mazaufroid), de *Anaptychia ciliaris* sur support granitique à la chapelle de La Celle ;

- la fertilité fréquente et la luxuriance de *Evernia prunastri* (et bien entendu la fertilité très fréquente de *Hypogymnia physodes*, *Hypogymnia tubulosa*, *Parmelia sulcata*) et celle — néanmoins exceptionnelle — de *Parmelia revoluta*, rencontrée avec deux jeunes apothécies au « Moulin du Roc » entre Chamberêt et Doms.

N.B. La nomenclature adoptée est celle utilisée par G. CLAUZADE et C. ROUX, 1985, « Lichens d'Europe Occidentale » Bull. Spéc. SBCO.

(*) J.B. : Le Bois Joli, 77 rue du Docteur Rebillard, 71200 LE CREUSOT.

* Enfin, une légère nuance thermique serait indiquée par la fréquence de *Normandina pulchella*, la présence locale de *Pannaria mediterranea* (déjà mentionnée) et de *Physcia tribacia* (sur vieilles tuiles, hameau de « L'Estivalerie » entre Chamberêt et Doms).