Récoltes bryologiques 1988 en Indre-et-Loire

par O. AICARDI*

- Jungermannia atrovirens Dum. et Lophozia turbinata (Raddi) Steph. (vid. R.B. PIER-ROT). Chargé: CN 55 (19-02). A la base humide d'une paroi calcaire exposée au nord en bordure de la route longeant la rive sud de la Loire.
- Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.. Forêt de Chinon: CN 03 (23-10). Quelques brins sur une souche de résineux dans le vallon très encaissé du ruisseau de la Doie au sud du carrefour de Xaintrailles.
- Aphanorhegma patens (Hedw.) Lindb.. Tours ; CN 24 (09-10). Sur la berge exondée de la rive sud du Cher à quelques dizaines de mètres du pont Saint-Sauveur. Avant cette récolte, j'avais en vain cherché cette plante sur les sables de la Loire, en plusieurs points de son cours, particulièrement dans les secteurs où *Riccia cavernosa* est abondante.
- Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schw.. Neuilly-le-Brignon; CN 30 (29-05). Sur un bloc de silex d'une structure rectangulaire plus ou moins écroulée du site archéologique en sous-bois.
- Brachythecium glareosum (Spr.) B.S.G. (vid. R.B. PIERROT). Le Grand Pressigny; CN 30 (29-05). Coteau de la Claise, au bord d'un sentier ombragé.
- Dicranella staphylina Whit (vid. R.B. PIERROT) Montlouis; CN 35 (18-06). Sur sol sableux humide en lisière d'un petit bois longé par la voie ferrée au nord du hameau de Rochepinard, avec Ceratodon purpureus, Barbula unguiculata, Bryum microerythrocarpum.
- Dicranum montanum Hedw. et D. tauricum Sap.. Tours; CN 24 (13-03). Sur des souches de la bordure nord du parc de Grandmont avec *Tetraphis pellucida* relativement abondant ici et, parfois même, fructifié.
- Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.. Monnaie; CN 36 (01-05). Sur un vieux toit d'ardoise dans le bourg. La fréquence de cette espèce est difficile à évaluer car son habitat usuel dans la région est souvent inaccessible.
- Grimmia tergestina Tomm. (vid. R.B. PIERROT). Chédigny; CN 43 (02-05). Sur les affleurements rocheux de l'une des buttes calcaires de Ville-Pays en situation chaude et intensément éclairée.
- Gymnostomum luisieri (Sérgio) Sérgio ex Crundw. (vid. R.B. PIERROT). Beaumont-La-Ronce; CN 26 (09-10). Fissures de paroi calcaire exposée au nord au voisinage de la D 29, avec Southbya nigrella et Encalypta streptocarpa.
- Isopterygium elegans (Brid.) Lindb.. Monnaie; CN 36 (02-05). Sur un talus dans la forêt Belier; cette espèce semble rare en Indre-et-Loire.

^{*} O.A., 10, Avenue de Grammont, 37000 TOURS.

- Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg. (vid. R.B. PIERROT). Saint-Règle; CN 55 (04-12). Sur une pente fraîche en sous-bois dans la vallée de la Masse.
- Tortella flavovirens (Bruch) Broth. (vid. R.B. PIERROT) Crouzilles; CN 12 (07-07). Sur un talus sablonneux dans le bois de Boizé. La présence de cette plante ici est plutôt insolite.
- Tortella inflexa (Bruch) Broth. Le Grand Pressigny; CN 30 (29-05). Sur une paroi calcaire tendre et humide des coteaux de la Claise, avec Rhynchostegiella tenella.
- Tortula subulata Hedw. Beaumont-La-Ronce; CN 27 (12-05). A la base d'un arbre sur talus sec à Arenaria montana en lisière de bois, en bordure de la D 29.
- Tortula virescens (De Not.) De Not.. Vouvray; CN 35 (21-03) Rochecorbon; CN 35 (21-03); Saint-Règle; CN 55 (04-12). Les trois récoltes sur troncs de tilleuls des places d'églises et des rues tranquilles. Espèce difficile à détecter, peut-être assez répandue.
- Weissia longifolia Mitt. var. longifolia. Azay-sur-Cher; CN 34 (20-06). A la base d'une grande falaise calcaire exposée au sud en bordure de la RN 76.

Nomenclature: CORLEY et al. 1981, GROLLE 1983.

Remerciements:

Je remercie vivement R.B. PIERROT qui a bien voulu vérifier une grande partie de mes déterminations.

Références bibliographiques :

PIERROT R.B., Les bryophytes du Centre-Ouest, bull. de la S.B.C.O. N° spécial 5-1982.

PIERROT R.B., 1976, *Dicranella staphylina* Whit. Bull. de la S.B.C.O. t. 7. SMITH AJE. 1980, The moss flora of Britain and Ireland.