

## Espèces intéressantes observées dans le département de la Corrèze

### - IV -

par Luc BRUNERYE (\*)

Cette liste succède à trois autres, indiquées en bibliographie *in fine*. Les stations citées ci-dessous ont été observées personnellement au cours des années 1979 à 1989 incluses. Par rapport aux publications précédentes j'ai abandonné la numérotation qui m'a semblé de peu d'utilité. J'ai par contre maintenu la précision, inaugurée dans la liste III, d'un troisième chiffre sur le quadrillage UTM, ce qui permet de situer la station dans un carré de 5 km de côté (1 = NO, 2 = SO, 3 = NE, 4 = SE). Bon nombre d'espèces déjà citées plusieurs fois, observées en de nouvelles stations, n'ont pas été reprises lorsqu'il s'avère qu'il s'agit de plantes assez communes dans une partie au moins du département.

#### LYCOPODIACÉES

- *Lycopodium clavatum* (Subcosm.)

- Saint-Merd-les-Oussines, alt. 890, DL 25(4). Vallée du ruisseau de l'Étang du Diable au sud-ouest de Lissac, dans une lande à Callune. 20-VIII-88. Station découverte par A. VILKS.

#### ÉQUISÉTACÉES

- *Equisetum sylvaticum* (Holarct.)

- Eygurande, alt. 790, DL 56(2). Rive droite du ruisseau au sud-est d'Eygerolles. 22-VIII-88. Station découverte par A. VILKS. Nouveau pour le département.

#### THÉLYPTÉRIDACÉES

- *Thelypteris limbosperma* (Europ.)

- Moustiers-Ventadour, alt. 520, DL 32(1). Bord de la RN 691, au sud des ruines de Ventadour, abondant. 9-VIII-84.

- *Thelypteris phegopteris* (Circumbor.)

- Cornil, alt. 280, CL 90(3). Chemin de la gare à Clayrat. 14-V-89.

---

(\*) L.B. : 21 rue Saint-Antoine, 75004 PARIS.

## ASPLENIACÉES

- *Asplenium billotii* (Médit.-Subatl.)
  - Brive, alt. 180, CK 89(3). Vallée de Planchetorte, en face de Vergnes, rochers de grès. 18-VIII-87.
- *Asplenium forisiense* (Submédit.-Atl.)
  - Camps, alt. 520, DK 28(3). Mur dans le village. 19-VIII-84.
  - Saint-Bonnet-les-Tours, alt. 350, DK 29(4). Rochers près les tours de Merle. 28-VII-81.
  - Servières-le-Château, alt. 280, DK 29(1). Gorges de la Glane. 1-VIII-81.
- *Asplenium x alternifolium*
  - Peret-bel-Air, alt. 670, DL 23(1). Muret à la Brette (vu par R. MAISON-NEUVE). 7-VIII-81.

## ATHYRIACÉES

- *Cystopteris fragilis* (Subcosm.)
  - Bort-les-Orgues, alt. 660, DL 52(3). Extrémité ouest des orgues, talus de la route au nord de la Colombière. 11-VIII-88.

## FAGACÉES

- *Quercus ilex* (Submédit.)
  - Chasteaux, alt. 180, CK 79(4). Haie à Merlières. 27-VII-85.
  - Chasteaux, alt. 280, CK 89(2). Haies et coteaux à Jauzac, A.C. 18-VIII-89.

## SANTALACÉES

- *Thesium alpinum* (Oroph. Euras.)
  - Bonnefond, alt. 820, DL 24(2). Talus de la route au sud-est du village (vu par R. MAISONNEUVE). 18-VIII-89.

## PHYTOLACCACÉES

- *Phytolacca americana* (Naturalisé)
  - Aubazines, alt. 320, CL 90(4). Canal des Moines, 1 pied. 13-VIII-86.
  - Reygade, alt. 160, DK 18(1). Grève de la Dordogne. 5-VIII-82.

## CARYOPHYLLACÉES

- *Arenaria controversa* (Endém. Esp. et S.O. France)
  - Allassac, alt. 200, CL 71(3). Eboulis de schistes entre la centrale

électrique du Saut du Saumon et le barrage. 25-VIII-88. Nouveau pour la Corrèze.

- *Gypsophila muralis* (Eur.-O.As.)
  - Le Lonzac, alt. 500, DL 03(1). Ancienne voie ferrée Seilhac-Treignac. 14-VIII-87.
- *Minuartia mediterranea* (Sub-Médit.)
  - Chasteaux, alt. 200, CK 79(4). Côte aride au nord-est de Roziers. 20-V-88. Nouveau pour la Corrèze.
- *Hornungia petraea* (Sub-Médit.)
  - Chasteaux, alt. 200, CK 79(4). Côte aride au nord-est de Roziers. 20-V-88.
- *Lepidium heterophyllum* (Subatl.)
  - Brive, alt. 160, CK 89(3). Vallée de Planchetorte, talus de route au nord-est des Vergnes. 18-VIII-87.

#### CRASSULACÉES

- *Sedum rubens* (S.Eur.-N.Afr.-As.min.)
  - Allassac, alt. 200, CL 71(3). Eboulis de schistes entre la centrale électrique du Saut du Saumon et le barrage. 25-VIII-88.

#### ROSACÉES

- *Agrimonia procera* (Eur.)
  - Jugeals-Nazareth, alt. 280, CK 89(4). Chemin sous bois, au-dessus de la voie ferrée, à l'est du village. 4-VIII-88.
- *Alchemilla inconcinna* (Oroph. C. et S. Eur.)
  - Eygurande, alt. 790, DL 56(2). Prés au sud-est d'Eygerolles. 22-VIII-88.
- *Amelanchier ovalis* (C. et S. Eur., N. Afr., As. min.)
  - Jugeals-Nazareth, alt. 320, CK 89(4). Falaise bajocienne au sud-est du village, R. 4-VIII-88. Station signalée par RUPIN : « rochers calcaires dominant le chemin de fer entre Nazareth et Bria ».
- *Crataegus laevigata* subsp. *laevigata* (Eur.)
  - La Chapelle-aux-Saints, alt. 135, CK 98(4). Vallée de la Sourdoire. 13-V-89. Semblé très rare en Corrèze.
- *Potentilla heptaphylla* (Médio-Eur.)
  - La Roche-près-Feyt, alt. 690, DL 66(2). Bord de la D 115 près du Moulin de la Roche. 22-VIII-88.
  - Eygurande, alt. 860, DL 56(2). Abondant dans les landes du Puy de Vareyron. 22-VIII-88.
  - Saint-Merd-les-Oussines, alt. 830, DL 25(4). Sud-ouest de Lissac. 20-VIII-88.

Semble assez répandu dans le nord-est du département. Ailleurs reste localisé sur les roches ultrabasiques (serpentine, éclogite).

- *Potentilla norvegica* (Adventice)
  - Monestier-Port-Dieu, alt. 560, DL 63(1). Grève de la retenue de Bort-les-Orgues. 14-VIII-88. Nouveau pour la Corrèze.
- *Sanguisorba officinalis* (Circumbor.)
  - Saint-Merd-les-Oussines, alt. 830, DL 25(4). Sud-ouest de Lissac. 20-VIII-88.
- *Sorbus domestica* (S. Eur.)
  - Saint-Cernin-de-Larche, alt. 260, CK 79(4). Causse de Cousage. 27-VII-85.
  - Noailles, alt. 220, CK 89(2). Bois sur le versant sud de la vallée sèche de Couze, au-dessus de la voie ferrée. 20-V-88.
- *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata* (S.O. Eur.)
  - Chasteaux, alt. 180, CK 89(2). Coteau aride à l'ouest du Soulier, au-dessus du Blagour. 5-VIII-86. Station signalée par RUPIN.

#### LÉGUMINEUSES

- *Argyrolobium zanonii* (O. Médit.)
  - Saint-Robert, alt. 310, CL 61(4). Coteau au sud-est de Puy Menier. 11-VIII-87.
  - Chasteaux, alt. 280, CK 79(4). Causse de Cousage. 14-VIII-88.
- *Chamaespartium sagittale* (C. et S. Eur.)
  - Bonnefond, alt. 280, DL 24(2). Talus de la route au sud-est du village (vu avec R. MAISONNEUVE). 18-VIII-82.
  - Turenne, alt. 340, CK 88(3). Pré sur « sidérolithique » au nord-ouest de Laboual. 21-V-88.
- *Coronilla varia* (O., C. et S. Eur., O. As.)
  - Bort-les-Orgues, alt. 620, DL 52(3). Pied des orgues vers les « grottes », peu commun. 11-VIII-88.
- *Cytisus purgans* (Oroph. O. Médit.)
  - Sérandon, alt. 450, DL 42(4). Gorges de la Dordogne, point de vue de Gratte-Bruyère. 8-VIII-88.
- *Medicago minima* (Médit., S.O. As.)
  - Chasteaux, alt. 200, CK 79(4). Côte aride au nord-est de Roziers. 20-V-88.
- *Ononis natrix* subsp. *natrix* (Sub-Médit.)
  - Végennes, alt. 200, DK 08(2). Coteau à l'ouest du village. 13-V-89.
- *Trifolium ochroleucon* (Eur.-O. As.)
  - Turenne, alt. 340, CK 88(3). Pré sur « sidérolithique » au nord-ouest de

Laboual. 21-V-88.

- *Trifolium scabrum* (Sub-Médit.)
  - Chasteaux, alt. 280, CK 79(4). Causse de Cousage. 14-VIII-88.

#### GÉRANIACÉES

- *Geranium sylvaticum* subsp. *sylvaticum* (Oroph. Eurosib.)
  - Noailles, alt. 190, CK 89(2). Bord de la Couze à Couze. 20-V-88. Station signalée par RUPIN, remarquable par sa basse altitude et son isolement en basse Corrèze.

#### LINACÉES

- *Linum austriacum* subsp. *collinum* (Sub.-Médit.)
  - Chasteaux, alt. 200, CK 79(4). Côte aride au nord-est de Roziers, R. 20-V-88.
- *Linum suffruticosum* subsp. *salsoloides* (S.O. Eur.)
  - Saint-Robert, alt. 310, CL 61(4). Coteau au sud-est de Puy Menier, abondant. 11-VIII-87.
- *Linum trigynum* (Sub-Médit.)
  - Jugeals-Nazareth, alt. 320, CK 89(4). Pelouse sur lapiaz, au sommet de la falaise bajocienne, au sud-est du village. 4-VIII-88.
  - Chasteaux, alt. 280, CK 79(4). Causse de Cousage. 14-VIII-88.

#### EUPHORBIACÉES

- *Euphorbia villosa* (S. Eurosib.)
  - Pierrefitte, alt. 300, DL 93(2). Bord de la Vézère. 18-VIII-86.
  - Saint-Merd-les-Oussines, alt. 750, DL 25(2). Bord de la Vézère au nord-ouest de Fournol. 20-VIII-88.
  - Laroche-près-Feyt, alt. 660, DL 66(2). Gorges de la Méouzette. 22-VIII-88.

#### CORIARIACÉES

- *Coriaria myrtifolia* (O. Médit.)
  - Jugeals-Nazareth, alt. 290, CK 89(4). Très localement quelques pieds stériles dans le bois sur éboulis, au pied de la falaise bajocienne, au sud-est du village. Station indiquée par RUPIN : « Rochers dominant le chemin de fer sous Nazareth, C. ». La plante s'est beaucoup raréfiée depuis, étouffée dans le taillis dense. L'espèce se trouve ici à son extrême limite nord.

#### ACÉRACÉES

- *Acer monspessulanum* (Circum-Médit.)

- Sérandon, alt. 450, DL 42(4). Gorges de la Dordogne, point de vue de Gratte-Bruyère. 8-VIII-88.

### TILIACÉES

• *Tilia platyphyllos* subsp. *platyphyllos* (Eur., Caucase, O. As.)

- Bort-les-Orgues, alt. 260, DL 52(3). Abondant dans le bois sous les orgues. 11-VIII-88.

- Chasteaux, alt. 200, CK 79(4). Forêt de Cousage sur pente nord (rebord du causse). 14-VIII-88.

Cet arbre semble rare en Corrèze. Les deux stations ci-dessus sont certainement naturelles. RUPIN indique le Tilleul à grandes feuilles à « Treignac, bord de la Vèzère » ; je n'y ai vu que *Tilia cordata* (= *T. parvifolia*), abondant.

### MALVACÉES

• *Althaea hirsuta* (Sub-Médit., O. As.)

- Saint-Cernin-de-Larche, alt. 280, CK 79(4). Causse de Cousage. 27-VII-85.

### THYMÉLÉACÉES

• *Daphne laureola* subsp. *laureola* (S. et O. Eur.)

- Collonges, alt. 280, CK 98(1). Puy de Vezy, bois (Chênaie - Charmaie - Frênaie) en bordure du plateau : abrupt du calcaire domérien supérieur. 5-VIII-87.

- Saillac, alt. 280, CK 98(1). Près du hameau de Juillac en situation absolument identique à celle de la station précédente. 5-VIII-87.

• *Daphne mezereum* (Eurosib.)

- Moustiers-Ventadour, alt. 550, DL 32(1). Rochers sous les ruines du château de Ventadour. 9-VIII-84.

### HYPÉRICACÉES

• *Hypericum x desetangii* (*H. perforatum* x *maculatum* subsp. *obtusiusculum*)

- Donzenac, alt. 200, CL 80(3). Fossé de la D 25 entre Travassac et Donzenac. 21-VIII-89. Nouveau pour la Corrèze.

• *Hypericum linariifolium* (Subatl.)

- Sérandon, alt. 450, DL 42(4). Gorges de la Dordogne, point de vue de Gratte-Bruyère. 8-VIII-88.

• *Hypericum maculatum* subsp. *maculatum* (Eurosib. ; subsp. oroph.)

- Ambrugeat, alt. 800, DL 24(4). Vallon du ruisseau de la Saulière. 31-VII-85.

La subsp. *maculatum*, assez répandue sur le Plateau de Millevaches, est une des caractéristiques de la prairie à *Gentiana lutea* subsp. *lutea*.

### OENOTHÉRACÉES

- *Epilobium collinum* (Eur.)

- Vignols, alt. 310, CL 72(4). Pont sur le ruisseau du Pont Sauvé. 10-VIII-89.

### OMBELLIFÈRES

- *Bupleurum baldense* subsp. *baldense* (O. Médit.-Atl.)

- Turenne, alt. 340, CK 88(3). Pelouses arides au nord-est de la Bleynie. 21-V-88.

- Jugeals-Nazareth, alt. 320, CK 89(4). Pelouse sur lapiaz au sommet de la falaise bajocienne, au sud-est du village. 4-VIII-88.

- Chasteaux, alt. 260, CK 89(4). Causse de Cousage. 14-VIII-88.

- *Meum athamanticum* (Oroph. O. et C. Eur.)

- Eygurande, alt. 820, DL 56(2). Lande entre Bongue et Eygerolles. 22-VIII-88. Station découverte par A. VILKS.

- Laroche-près-Feyt, alt. 700, DL 66(2). Bord de la D 115 près du Moulin de la Roche. 22-VIII-88.

- *Oenanthe pimpinelloides* (S. et O. Eur.)

- Turenne, alt. 340, CK 88(3). Pré sur « sidérolithique » au nord-ouest de Laboual. 21-V-88.

- Turenne, alt. 320, CK 88(3). Pré à Linoire. 21-V-88.

- Vègennes, alt. 200, CK 08(2). Pré à côté du cimetière. 13-V-89.

- *Peucedanum cervaria* (C. et S. Eur., Caucase, Algérie)

- Saint-Robert, alt. 310, CL 61(4). Coteau au sud-est de Puy Menier. 11-VIII-87.

- *Selinum pyrenaicum* (Oroph. S.O. Eur.)

- Saint-Merd-les-Oussines, alt. 790, DL 24(1). Pont Tort, bord du ruisseau des Maisons. 16-VIII-86.

### PRIMULACÉES

- *Lysimachia nummularia* (Eur.)

- Collonges, alt. 240, CK 99(2). Bord de ruisseau entre Collonges et Le Chastenet. 5-VIII-87.

- Lanteuil, alt. 190, CK 99(1). Vallée de la Loyre. 4-VIII-88.

- Chasteaux, alt. 160, CK 89(2). Source du Sorpt. 14-VIII-88.

Cette Lysimaque semble assez fréquente dans le Bassin de Brive alors qu'elle

est curieusement absente dans tout le reste du département.

#### RUBIACÉES

- *Galium lucidum* (Sub-Médit.)

- Saint-Cernin-de-Larche, alt. 270, CK 79(2). Causse de Cousage, sur les tumulus de Dolmens. 27-VII-85. Nouveau pour la Corrèze.

#### BORRAGINACÉES

- *Buglossoides purpureocaerulea* (S. Eur., S.O. As.)

- La Chapelle-aux-Saints, alt. 170, CK 98(4). Talus de la route à l'ouest de Bonneval. 13-V-89.

#### LABIÉES

- *Stachys alpina* (S. et C. Eur.)

- Jugeals-Nazareth, alt. 240, CK 89(4). Chemin sous bois au-dessus de la voie ferrée, à l'est de Jugeals. 4-VIII-88.

- *Stachys palustris* (Holarct.)

- La Chapelle-aux-Saints, alt. 135, CK 98(4). Bord de la Sourdoire. 13-V-89. Nouveau pour la Corrèze.

#### SOLANACÉES

- *Atropa bella-donna* (Eur., O. As.)

- Auriac, alt. 400, DL 30(3). Gorges de la Dordogne, très abondant sur le talus récent de la route de Valette. 8-VIII-88. Nouveau pour la Corrèze.

#### SCROFULARIACÉES

- *Veronica montana* (Eur., N. Afr.)

- Lanteuil, alt. 200, CK 99(1). Vallée de la Loyre. 4-VIII-88.

#### UTRICULARIACÉES

- *Utricularia vulgaris* (Holarct.)

- Sainte-Fortunade, alt. 450, DL 00(1). Etang de Lachaud. 13-VIII-82.

- La Cellé, alt. 680, DL 15(2). Etang des Goursolles. 26-VIII-83.

#### PLANTAGINACÉES

- *Plantago maritima* subsp. *maritima* (Eur.)

- Brive, alt. 280, CK 89(3). Coteau au sud de Laumont, au-dessus de la route. 18-VIII-87.



- Noailles, alt. 280, CK 89(1). Puy Laborie. 18-VIII-87.
- Végennes, alt. 240, DK 08(2). Coteau à l'ouest du village. 13-V-89.

Ces trois stations se trouvent sur des coteaux à sol squelettique formé par les marnes dolomitiques de l'Hettangien. Rappelons que les seules autres stations de cette espèce en Corrèze sont sur des serpentines, elles aussi riches en magnésium.

#### DIPSACACÉES

- *Dipsacus pilosus* (Euras.)
  - Turenne, alt. 310, CK 89(4). Bord de la D 8 au sud de Jugeals-Nazareth. 4-VIII-88.
  - Chasteaux, alt. 160, CK 89(2). Vallée du Sorpt, chemin au sud de Navarre. 14-VIII-88.
- *Knautia arvernensis* (Oroph. Franco-Ibér.)
  - Bort-les-Orgues, alt. 620, DL 52(3). Extrémité ouest des orgues, talus de la route au nord de La Colombière. 11-VIII-88.

#### CAMPANULACÉES

- *Campanula persicifolia* subsp. *persicifolia* (Euras.)
  - Bort-les-Orgues, alt. 620, DL 52(3). Extrémité ouest des orgues, talus de la route au nord de La Colombière. 11-VIII-88.

#### COMPOSÉES

- *Achillea ptarmica* (Eurosib.)
  - Laroche-près-Feyt, alt. 680, DL 66(2). Gorges de la Méouzette. 22-VIII-88.
- *Aster x salignus* (Adventice)
  - Bassignac-le-Bas, alt. 150, DK 08(3). Bord de la Dordogne. 2-VIII-89. Nouveau pour la Corrèze.
- *Carduncellus mitissimus* (Atl.)
  - Noailles, alt. 280, CK 89(1). Abondant sur le coteau, au nord de Puy Laborie. 18-VIII-87.
- *Centaurea*

#### **Centaurees de la section *Jacea* en Corrèze**

Les *Centaurea* de la section *Jaceae* constituent un groupe très complexe et diversement interprété selon les auteurs. Après étude comparative de Flora Europaea, de la Flore de France du C.N.R.S., de la Nouvelle Flore de Belgique

et des travaux de J. ARENES qui fut spécialiste français des Cynarocéphales, j'ai établi pour la Corrèze, d'après mes récoltes, la clef-classification suivante. Il s'agit d'un outil de travail permettant de donner un nom aux Centaurées rencontrées lors d'un relevé de terrain et ne prétendant aucunement à une valeur absolue, surtout en dehors du département pour lequel il a été élaboré. Toutes les « espèces » sont variables et les intermédiaires nombreux.

#### Série *Jaceae* :

Appendice ovale-large ou orbiculaire, fauve ou brun-pâle, recouvrant généralement les bractées, à bords entiers, denticulés ou lacérés. Pappus généralement absent. Fleurs externes rayonnantes ou non. Feuilles subentières ou plus ou moins lobées.

- Feuilles plus ou moins lancéolées-linéaires, plus ou moins blanchâtres:

***Centaurea angustifolia*** Schrank  
= *C. pannonica* Simonkai (Fl. Eur.)  
= *C. amara* auct.

Se trouve peut-être dans le sud-ouest du département. A vérifier.

- Feuilles oblongues-lancéolées généralement vertes :

***Centaurea jacea*** L. s.s.  
= *C. amara* L. p.p.  
Rare en Corrèze.

#### Série *Fimbriatae* :

Appendice plus ou moins triangulaire ou lancéolé, fauve ou brun-pâle, recouvrant les bractées, à bords fimbriés. Pappus présent ou absent. Fleurs extérieures rayonnantes ou non. Feuilles subentières ou lobées.

Cette série comprend *C. decipiens* Thuill. (= *C. serotina* Boreau) et *C. microptilon* G. et G. Je n'en ai, actuellement, trouvé aucun représentant en Corrèze.

#### Série *Ciliatae* :

Appendice triangulaire-ovale ou plus ou moins orbiculaire, brun-pâle à brun-noir, recouvrant ou non les bractées, pectiné ou cilié. Pappus présent ou non. Fleurs extérieures rayonnantes ou non. Feuilles subentières ou plus ou moins lobées.

- Appendice brun-pâle à brun, pectiné. Fleurs externes généralement rayonnantes. Feuilles généralement lobées :

***Centaurea pratensis*** Thuill.  
= *C. debeauxii* subsp. *thuillieri* Dostal  
(Fl. Eur.)

Très commun dans tout le département. C'est l'espèce la plus variable.

- Appendice brun à brun-noir, cilié. Fleurs externes généralement non rayonnantes. Feuilles généralement subentières :

+ Involucre plus ou moins sphérique, appendice à cils nombreux (12-16 paires), cachant les bractées :

+ Involucre gros (15-20 mm), appendice large, brun-noir, cils longs et sinueux :

***Centaurea nigra* L. s.s.**

Assez commun en haute Corrèze, rare ailleurs

+ Involucre moins gros (10-15 mm), appendice plus ou moins lancéolé, cils moins longs, peu sinueux :

***Centaurea nemoralis* Jord.**

= *C. debeauxii* subsp. *nemoralis*  
Dostal (Fl. Eur.)

Commun dans tout le département.

+ Involucre petit (7-12 mm), ovoïde, appendice étroit et cils moins nombreux (7-9 paires), écartés, laissant en partie à découvert les bractées :

***Centaurea debeauxii* G. et G.**

= *C. debeauxii* subsp. *debeauxii* (Fl. Eur.)

Rare en Corrèze.

P.S. : Je n'ai pas tenu compte du caractère souvent invoqué de présence ou absence de pappus pour deux raisons :

- il y a fréquemment un pappus très court et souvent incomplet ;

- les capitules sont presque toujours parasités par des larves d'insectes qui détruisent les graines, et l'on a beaucoup de mal à obtenir un nombre significatif de graines en bon état.

• *Centaurea debeauxii* subsp. *debeauxii* (Atl.)

- Chasteaux, alt. 180, CK 89(2). Coteau aride à l'ouest du Soulier. 5-VIII-86.

- Chenaillier-Mascheix, alt. 200, DK 08(3). Talus de la route descendant à la Dordogne. 2-VIII-89. Nouveau pour la Corrèze.

• *Centaurea montana* (Oroph. C. et S. Eur.)

- Saint-Etienne-aux-Clos, alt. 620, DL 55(4). Gorges du Chavanon, bois au nord des fours à chaux. 2-VIII-84.

• *Centaurea solstitialis* subsp. *solstitialis* (Sub-Médit.)

- Chasteaux, alt. 320, CK 89(3). Village de Crochet. 18-VIII-89. Nouveau pour la Corrèze.

• *Tanacetum corymbosum* subsp. *corymbosum* (C. et S. Eur.)

- Lissac-sur-Couze, alt. 200, CK 89(2). Assez abondant le long d'un chemin montant sur le coteau, à l'ouest de la D 154. 18-VIII-89.

- *Cirsium tuberosum* (Subatl.)

- Brive, alt. 280, CK 89(3). Coteau au sud de Laumont, au-dessus de la route (marnes de l'Hettangien). 18-VIII-87. Nouveau pour la Corrèze.

- *Filago vulgaris* (Paléotemp.)

- Bort-les-Orgues, alt. 620, DL 52(3). Coteau sous les orgues. 11-VIII-88.

- Chasteaux, alt. 280, CK 79(4). Causse de Cousage, coupe de bois. 14-VIII-88.

- *Inula salicina* subsp. *salicina* (Euras.)

- Chasteaux, alt. 180, CK 89(2). Côte aride à l'est du Soulier. 5-VIII-86.

- *Inula spiraeifolia* (S. Eur.)

- Lissac-sur-Couze, alt. 200, CK 89(2). Coteau à l'ouest de la D 154. 18-VIII-89. Nouveau pour la Corrèze.

- *Senecio nemorensis* subsp. *fuchsii* (Oroph. C. Eur.)

- Reygade, alt. 165, DK 18(1). Talus de la route longeant la Dordogne. 5-VIII-82.

## ALISMACÉES

- *Luronium natans* (Subatl.)

- La Celle, alt. 680, DL 15(2). Etang des Goursolles. 26-VIII-83.

- Saint-Merd-les-Oussines, alt. 890, DL 25(4). Etang de Bournel. 21-VIII-86.

## LILIACÉES

- *Allium ursinum* subsp. *ursinum* (Euras.)

- Saint-Rémy, alt. 690, DL 45(2). Bord de la Liège entre Le Madiolet et Mirambel, très local, R. 2-VIII-85.

- *Allium victorialis* (Oroph. Circumbor.)

- Pierrefitte, alt. 300, CL 93(2). Bord de la Vézère avec *Senecio cacaliaster* (T.R.), *Euphorbia villosa*... 18-VIII-86. Semble, jusqu'à présent, être la plus basse en altitude de toutes les stations qui ont colonisé les bords de la Vézère à partir des gorges situées en amont du barrage de Treignac.

- *Lilium martagon* (Oroph. Euras.)

- Bort-les-Orgues, alt. 620, DL 52(4). Bois sous les orgues. 11-VIII-88.

- *Paris quadrifolia* (Eurosib.)

- Bort-les-Orgues, alt. 620, DL 52(4). Bois sous les orgues. 11-VIII-88.

- *Polygonatum verticillatum* (Oroph. Euras.)

- Saint-Merd-les-Oussines, alt. 840, DL 25(4). Sud-ouest de Lissac. 20-

## VIII-88.

- Eygurande, alt. 810, DL 56(2). Rive droite du ruisseau au sud-est d'Eygerolles. 22-VIII-88.

- Laroche-près-Feyt, alt. 680, DL 66(2). Gorges de la Méouzette. 22-VIII-88.

- *Scilla autumnalis* (O. et S. Eur., O. As., N. Afr.)

- Chasteaux, alt. 280, CK 79(4). Causse de Cousage. 14-VIII-88.

- Chasteaux, alt. 280, CK 89(2). Puy de Crochet. 18-VIII-89.

## IRIDACÉES

- *Gladiolus italicus* (Eury-Médit.)

- La Chapelle-aux-Saints, alt. 160, CK 98(4). Talus de la route à l'ouest de Bonneval. 13-V-89.

## JUNCACÉES

- *Juncus capitatus* (Subcosm.)

- Brive, alt. 160, CK 89(3). Vallée de Planchetorte, grotte en face des Vergnes. 18-VIII-87.

- *Luzula nivea* (Oroph. C. Eur.)

- Rilhac-Xaintrie, alt. 600, DL 30(3). Gorges de la Dordogne, bord de la D 75 au sud de Spontour. 8-VIII-88.

## GRAMINÉES

- *Aira caryophyllea* subsp. *multiculmis* (Subatl.)

- Turenne, alt. 330, CK 88(3). Causse au nord-est de la Bleynie. 21-V-88.

- Chasteaux, alt. 280, CK 79(4). Causse de Cousage. 14-VIII-88.

Nouveau pour la Corrèze.

- *Brachypodium distachyon* (Paléothermophile)

- Chasteaux, alt. 280, CK 79(4). Causse de Cousage. 14-VIII-88.

- *Briza minor* (Sub-Médit.)

- Brive, alt. 160, CK 89(3). Vallée de Planchetorte, grotte en face des Vergnes. 18-VIII-87.

- *Bromus squarrosus* (S. Euras., N. Afr.)

- Chasteaux, alt. 160, CK 79(4). Côte aride au nord-est de Roziers. 20-V-88.

- Turenne, alt. 330, CK 88(3). Pelouses arides au nord-est de La Bleynie. 21-V-88.

- Chasteaux, alt. 280, CK 79(4). Causse de Cousage. 14-VIII-88.

- *Festuca arvernensis*
  - Monestier-Port-Dieu, alt. 680, DL 63(1). Site de Vie. 14-VIII-89.
- *Gastridium ventricosum* (Médit.-Atl.)
  - Chasteaux, alt. 280, CK 79(4). Causse de Cousage, chemins. 14-VIII-88.
- *Phleum pratense* subsp. *bertolonii* (Paléotemp.)
  - Chasteaux, alt. 280, CK 79(4). Causse de Cousage. 14-VIII-88.
- *Poa chaixii* (Eur., Caucase)
  - Lagraulière, alt. 380, CL 82(2). Forêt de Blanchefort. 6-VIII-84.
  - Moustier-Ventadour, alt. 490, DL 32(1). Bord de la Soudeillette. 9-VIII-84.
  - Pierrefitte, alt. 310, CL 93(2). Vallée de la Vézère. 18-VIII-86.
- *Sporobolus indicus* (Adventice)
  - Donzenac, alt. 280, CL 80(3). Travassac, déblais des anciennes ardoisières, sortie sud du village. 21-VIII-89.

#### CYPÉRACÉES

- *Carex disticha* (Euras.)
  - Le Lonzac, alt. 500, DL 03(1). Ancienne voie ferrée Seilhac - Treignac. 14-VIII-87.
- *Carex nigra* subsp. *juncella* Fries
  - Bonnefond, alt. 850, DL 24(1). Tourbière entre Le Bournet et le Puy de Razel. 5-VIII-89.

Sous-espèce boréale, caractérisée par ses feuilles longues et étroites et surtout par sa souche qui forme de gros touradons. Nouveau pour la Corrèze.
- *Carex lepidocarpa* (Eur.)
  - Curemonte, alt. 310, DK 08(2). Suintement sur le chemin partant du carrefour des D 153 et D 153e, à l'est de la butte aride, R. 21-VIII-87. Nouveau pour la Corrèze.
- *Carex pseudocyperus* (Paléotemp.)
  - Vignols, alt. 310, CL 72(4). Bord du ruisseau du Pont Sauvé, R. 10-VIII-89.
- *Carex pulicaris* (Euras.)
  - Bugeat, alt. 665, DL 15(4). Plaine d'Arvis, vu avec A. VILKS. 16-VIII-88.
- *Carex spicata* (Eur.)
  - Monestier-Port-Dieu, alt. 560, DL 63(1). Grève de la retenue de Bort-les-Orgues. 14-VIII-89.
- *Eriophorum latifolium* (Holarct.)
  - Curemonte, alt. 310, DK 08(2). Chemin partant du carrefour des D 153 et D 153e, à l'est de la butte aride, suintement sur marnes de l'Hettangien, T.R.

21-VIII-87.

Non signalé par RUPIN. LE GENDRE indique : « CC. dans les tourbières de Meymac (GONOD et LACHENAUD) ». Il s'agit là manifestement d'une erreur : seul *Eriophorum angustifolium* se trouve dans les tourbières du Plateau de Millevaches, il y est souvent très robuste avec de larges feuilles. La station des environs de Tulle indiquée « Le Pouget, etc... (Dr PUYAUBERT) » est probablement erronée elle aussi.

## ORCHIDÉES

- *Limodorum abortivum* Sub-Médit.)

- Noailles, alt. 230, CK 89(2). Bois sur le flanc sud de la vallée sèche de la Couze, au-dessus du chemin de fer. 20-V-88.

- *Spiranthes aestivalis* (Eur., N. Afr., As. min.)

- Le Pescher, alt. 530, DK 09(2). Landes de Roc-de-Maille : bord de ruisseau dans une dépression à Molinie, local. 8-VIII-86.

## Stations disparues

. Etang de Bournel (Saint-Merd-les-Oussines), DL 25(4), 21-VIII-86. Une augmentation importante du niveau de l'eau a entraîné une eutrophisation et la disparition d'*Isoetes lacustris*.

. Puy de la Jarrige (Chaumeil), DL 13(1), 16-VIII-88. Le taillis de Chênes à *Allium victorialis* et *Senecio cacaliaster* qui couronnait le Puy a cédé la place à une plantation de résineux. *Allium victorialis* a disparu. *Senecio cacaliaster* se maintient pour l'instant dans les landes voisines du Cirque de Fraysselines.

. Tourbière du Longéroux (Meymac), DL 25(4), VIII-86. La station de *Vaccinium microcarpum* que j'avais découverte en août 1972 a disparu par assèchement naturel et envahissement par la Callune. Cette station était la seule connue du Limousin, mais la plante peut exister dans une autre partie du Longéroux, ou ailleurs sur le Plateau de Millevaches : à rechercher.

## Bibliographie

ARÈNES, J., 1939. - Etudes sur les Composées Cynarocéphales de la flore française. II. Les Centaurées de la sous-section *Eu-Jaceae* Boiss. - Extrait du Bull. n° 4 de *Cynarocéphales de France* (polycopié), 46 p. Paris.

BRUNERYE, L., 1966. - Quelques plantes rares ou intéressantes des Monédières, premier complément au Catalogue d'Ernest Rupin. *Bull. Soc. scient. hist. archéol. Corrèze*, 88 : 10-19. Brive.

BRUNERYE, L., 1971. - Deuxième complément au Catalogue des plantes de

- Corrèze : stations d'espèces nouvelles, rares ou intéressantes. *Ibid.*, **93** : 11-17.
- BRUNERYE, L. et MAISONNEUVE, R., 1975. - Troisième complément au Catalogue des plantes de Corrèze. *Ibid.*, **97** : 29-36.
- BRUNERYE, L. et MAISONNEUVE, R., 1979. - Espèces intéressantes du département de la Corrèze, III. *Bull. S.B.C.O.*, n. s., **10** : 9-19.
- CONTRÉ, E et MAISONNEUVE, R., 1978. - Espèces intéressantes du département de la Corrèze, II. *Ibid.*, **9** : 288-316.
- LE GENDRE, Ch., 1914-1922. - Catalogue des plantes du Limousin. 2 vol. 312 et 410 p. *Soc. bot. et d'études scientifiques du Limousin*. Limoges.
- LE GENDRE, Ch., 1926. - Supplément au catalogue des plantes du Limousin. *Ibid.*, 94 p.
- MAISONNEUVE, R., 1977. - Espèces intéressantes (et souvent inédites) du département de la Corrèze. *Bull. S.B.C.O.*, n. s., **8** : 113-123.
- RUPIN, E., 1878 à 1885. - Catalogue des plantes qui croissent dans le département de la Corrèze. *Bull. Soc. scient. hist. archéol. Corrèze*. Brive.