

Compte rendu de la sortie mycologique du 21 octobre 1990 en forêt de Pons (Charente-Maritime)

par Christian YOU (*)

Encore une médiocre sortie, qui n'a pas permis, cette saison non plus, aux mycophiles charentais de profiter de la pousse des champignons pour améliorer leurs connaissances ! Une demi-douzaine de sociétaires s'étaient quand même donné rendez-vous pour une excursion que l'on savait par avance à peu près nulle.

En prospectant par le bas de la forêt longeant l'autoroute, nous récoltons *Marasmius splachnoides* (qui pousse en masse sur feuilles de chêne), à lames nettes et non pliciformes comme chez *M. epiphyllus*.

En progressant parmi les feuillus, chênes, charmes, alisiers, sorbiers domestiques, néfliers, érables champêtres, érables de Montpellier, nous notons :
Hypholoma fasciculare *Chlorociboria aeruginescens*

Collybia dryophila

et *Collybia peronata* à la base du pied couverte d'une laine hirsute typique, à saveur poivrée.

Puis, sous quelques pins :

Sparassis crispa *Mycena seynii*

Sur troncs et branches mortes :

Tremella mesenterica *Polyporus tuberaster*

Ganoderma lucidum

Nous avons ensuite gagné le haut de la forêt ; les espèces sont rares ; nous rencontrons :

Megacollybia platyphylla *Amanita citrina*

Armillaria tabescens *Clitocybe gibba*

Daedaleopsis confragosa *Stereum hirsutum*

et, à l'intérieur des bogues de châtaignier, *Rutstroemia echinophila* ; cette espèce semble passer inaperçue quoique commune ; elle parasite les bogues de l'année précédente.

L'après-midi, nous décidons d'un commun accord de revoir une partie basse de la forêt, plus humide. Même décor ; les champignons sont rares. On peut ajouter aux espèces du matin :

Russula amoenicolor *Crepidotus variabilis*

Micromphale foetidum *Mycena stylobates*

Coriolellus albidus *Boletus subtomentosus*

et *Postia caesia*, à surface méchuleuse touchée de bleuté et à chair molle.

(*) C. Y. : "Le Coteau", route de Tesson, 17800 PONS.