

Compte rendu de la sortie mycologique du 6 octobre 1991 en forêt de la Braconne (Charente)

par M. BOTINEAU*

Cette liste a été établie en collaboration avec MM. FROUIN et METOU. Nous les remercions bien vivement pour leurs indications.

Une vingtaine de participants de la Société Botanique du Centre-Ouest et de la Société Mycologique du Limousin se sont retrouvés ce jour au Rond-Point du Gros-Fayant, lieu traditionnel de rendez-vous.

Malheureusement, malgré quelques pluies tombées les jours précédents, le substrat demeure très sec, et les Macromycètes se sont montrés très rares. Nous donnons la liste des espèces rencontrées.

Matinée : secteur ouest et sud-ouest du Rond-Point du Gros-Fayant :

<i>Lactiporus sulfureus</i> , <i>Collybia dryophila</i> (CC), <i>Bjerkandera adusta</i> , <i>Bolbitius vitellinus</i> , <i>Vascellum pratense</i> , <i>Agaricus fuscofibrillosus</i> (C), <i>Chlorociboria aeruginascens</i> , <i>Fistulina hepatica</i> , <i>Marasmius rotula</i> (à collarium bien net), <i>Lycoperdon perlatum</i> , <i>Clitocybe gibba</i> , <i>Collybia peronata</i> , <i>Coprinus plicatilis</i> , <i>Clitopilus prunulus</i> ,	<i>Stereum hirsutum</i> (sur <i>Quercus</i>), <i>Pluteus cervinus</i> , <i>Bovista plumbea</i> , <i>Rickenella fibula</i> (dans les mousses), <i>Stereum insignitum</i> (sous <i>Fagus</i>), <i>Panellus stipticus</i> , <i>Tremella mesenterica</i> , <i>Ganoderma lucidum</i> (attaqué par des limaces !), <i>Macrolepiota gracilentata</i> (C), <i>Scleroderma citrinum</i> , <i>Oudemansiella radicata</i> et <i>Hypoxylon fragiforme</i> (sous <i>Fagus</i>), <i>Oudemansiella longipes</i> , <i>Coprinus cf. lagopus</i> , <i>Schizophyllum commune</i> .
--	---

Enfin, sur les côtés herbeux entourant le Rond-Point du Gros-Fayant, *Psathyrella candolleana* souligne le caractère nitrophile que prend le site.

Après-midi : alentours de la Fosse Limousine :

<i>Collybia dryophila</i> , <i>Ganoderma lucidum</i> , <i>Coprinus lagopus</i> , <i>Collybia peronata</i> ,	<i>Bovista plumbea</i> , <i>Lycoperdon echinatum</i> , <i>Fistulina hepatica</i> , <i>Oudemansiella longipes</i> ,
--	---

* M. B. : La Clef d'Or, 16410 DIGNAC.

Clitocybe gibba, *Collybia fusipes*,
Russula gr. *grisea* (cf. *parazurea*), *Lycoperdon piriforme*,
Lentinus tigrinus,
et, à proximité du parking de la maison forestière, *Psathyrella candolleana*.

L'espèce la plus intéressante est donc *Agaricus fuscofibrillosus*, déterminé par M. FROUIN. C'est un Agaric du groupe des *Sanguinolentae*, densément fibrilleux, brun foncé, et non floconneux ni squamuleux comme chez *Agaricus silvaticus*, *haemorrhoidarius*, ou *langei*. Liée aux bois de feuillus, cette espèce n'avait pas, à notre connaissance, été mentionnée à La Braconne.

(La nomenclature utilisée est celle suivie par M. BON (1988), et KÜHNER et ROMAGNÉSI (1974) pour *Agaricus fuscofibrillosus*).