

Contributions à l'inventaire de la flore

(Contributions collectées par André TERRISSE)

Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, les trouvailles intéressantes qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, avant le 15 février, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants :

- le nom de la plante ;
- le lieu exact avec indication de la commune (si possible, les coordonnées U.T.M.) et la date de la découverte ;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station.

On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le bulletin précédent.

Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce - qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire est très limitée, ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront, comme par le passé, faire l'objet d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du "Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination confirmée par ...".

De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :

- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier ;

- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop communes ;

- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

Département de l'Allier

Contribution de : M. BOUDRIE
et R. DESCHÂTRES

- *Asplenium forsiense*
 - Rochers siliceux au Roc des Chirlons, vallée de la Sioule, 2 km au sud-ouest de Jenzat (avril 1993 !, EM 11). Assez belle population.
- *Asplenium trichomanes* L. subsp. *pachyrachis* (Christ) Lovis & Reichstein
 - Vieux murs près de l'église de Nades (avril 1993 !, DM 91). Quelques pieds, avec l'autre sous-espèce, *quadri-valens*, et l'hybride entre les deux (*A. trichomanes* nothosubsp. *staufferi*).
- *Dryopteris expansa* (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy
 - Hêtraie-sapinière, alt. 1000 m, massif des Bois Noirs, à l'E-NE du Puy Snidre, 3 km au sud de Lavoine (septembre 1993 !, EL 58). Ça et là, avec *D. dilatata* et l'hybride entre les deux (*D. x ambroseae*).
- *Equisetum x litorale* (*E. arvense* x *E. fluviatile*)
 - Bords de l'étang de Goule, près du lieu-dit la Brosse, alt. 212 m, Valigny (R.D., octobre 1989 !).
 - Avec les deux espèces parentes.
- *Huperzia selago*
 - Berges de ruisseau sous hêtraie-sapinière, alt. 1000 m, vallée de la Besbre, massif des Bois Noirs, à l'E-NE du Puy Snidre, 3 km au sud de Lavoine (septembre 1993 !, EL 58). Une touffe. Localité indiquée par Michel RENARD.
- *Lycopodium clavatum*
 - Zones à callune sur sol granitique humide, anciennes carrières de La Bosse, 3 km à l'E-SE d'Echassières (revu avril 1993 !, DM 91).
- *Marsilea quadrifolia*
 - Étang de la Racherie (ou de la Goutte Arnaud), alt. 280 m, Saint-Gérandle-Puy (R.D., 1991-92 !). Plante abondante et très fertile, couvre des plages étendues sur les rives sableuses.
- *Oreopteris limbosperma* (Bell. ex All.) Holub (= *Thelypteris* L.)
 - Hêtraie-sapinière, alt. 1000 m, massif des Bois Noirs, à l'E-NE du Puy Snidre, 3 km au sud de Lavoine (septembre 1993 !, EL 58).
- *Pilularia globulifera*
 - Étang Billard, alt. 255 m, Thiel-sur-Acolin (R.D., septembre 1992 !). Plusieurs plages de l'ordre du mètre carré sur la rive NE, plante bien fertile. C'est la seule localité actuellement connue dans l'Allier, où l'espèce est en forte régression depuis un siècle (Cf. MIGOUT, Fl. Dép. Allier, 2ème éd., p. 468, 1890).
- *Thelypteris palustris*
 - Aulnaie-saussaie de la rive nord de l'étang de Billot, alt. 205 m, Lurcy-Lévis

(R.D., mai 1990 !). Plante abondante, mais localisée ; seule localité actuellement connue dans l'Allier.

Département des Alpes-de-Haute-Provence

Contribution de Robert AMAT

- *Abutilon theophrasti*
 - Commune d'Oraison, à 100 m environ au sud de la station d'épuration des Buissonnades, le long du chemin d'exploitation qui conduit au confluent de l'Asse et de la Durance (dans la ripisylve : *Populetalia albae*) : une trentaine de pieds, le 30 août 1994 : première observation pour le département.
- *Aegilops cylindrica*
 - Commune de Lurs, entrée ouest du village, à côté du transformateur E.D.F. (alt. 570 m), sur 3 m le long du chemin, dans une bordure d'*Elymus repens* subsp. *repens* : une dizaine de pieds. Noté à plusieurs reprises depuis le 15 juin 1982 ; dernière observation le 30 mai 1994.
 - Commune de Manosque, parking de la Villette, côté ravin des Couquières, également dans un peuplement d'*Elymus repens* subsp. *repens*, une quinzaine de pieds le 1^{er} juin 1994.

Ce taxon, qui ne figure pas dans le Catalogue de LAURENT (tome IV, 1992), est une nouveauté pour notre département.
- *Cleistogenes serotina* subsp. *serotina*

Cette plante, difficile à apercevoir, est donnée comme rare dans les Alpes-de-Haute-Provence ("dans l'extrême sud-est surtout"). On peut ajouter cette station, bien installée à Lurs sur le coteau de Rabourine (dans la rocaille au bord de la route D 462, alt. 490 m). Notée depuis le 16 septembre 1983 ; dernière observation le 11 octobre 1994.
- *Euphorbia hyberna* subsp. *canuti*
 - Commune de Forcalquier, lieu-dit le Clot de Melly (alt. 825 m). Abondante sur environ 1 000 m² à gauche du chemin en montant, sous un couvert du *Quercion pubescenti-petraeae*, entre les coussinets de *Cotinus coggygria* qui tapissent presque entièrement le sol. J'avais déjà noté ce taxon en 1993, j'y suis revenu le 1^{er} juin 1994 pour m'assurer de la détermination (en particulier de la réticulation et de la couleur des graines, parfaitement rouges). Cette Euphorbe n'avait encore jamais été relevée dans ce secteur, la subsp. *canuti* étant jusqu'ici connue seulement de la partie orientale de notre département.
- *Euphorbia prostrata*
 - Forcalquier (27 août 1994), à l'entrée de la piscine, 3 pieds vigoureux (j'avais déjà noté cette plante en 1981 dans un autre quartier, sur le trottoir en contrebas de la gendarmerie : mais, suivant les conclusions de P. HUGUET dans son étude sur "les Euphorbes prostrées de France", j'avais classé ce taxon sous le nom d'*Euphorbia chamaesyce* subsp. *chamaesyce* fo. *pilosa*).
 - Manosque (6 septembre 1994) dans une plate-bande du parc de Drouille, très abondante et vigoureuse sur environ 100 m². Détermination confirmée par C. MOULINE (I.N.R.A.). L'espèce ne figure pas au catalogue des Basses-Alpes.

- *Gagea foliosa*
 - Commune de Lurs, lieu-dit Rabourine, pelouse steppique (***Thero-Brachypodium***, dominante : *Stipa capillata*) le long de la route D 462 (alt. de 440 à 510 m). La station compte une soixantaine de pieds fleuris dispersés par groupes sur une aire assez étendue (environ 1 ha). Il s'agit d'une nouveauté pour le département. Dernière observation : 28 mars 1994. (cf. mon article dans le *Monde des Plantes* (1993, n° 447).
- *Hedysarum boutignyanum*
 - Commune de Prads. 3 pieds sur la pente du ravin longé par le sentier de l'Estrop, entre le Pas de l'Uscla et la Cabane de Pierre (1 550 m), le 20 juillet 1994.
 - Même commune. Versant nord du col du Talon (de 1 840 à 1 860 m), où la station couvre toute la pente sur au moins un hectare (21 juillet 1994). C'est, me semble-t-il, la première mention de ce taxon pour les Alpes-de-Haute-Provence.
- *Juncus fontanesii* subsp. *fontanesii*
 - Commune de Lurs, rive du Lauzon au lieu-dit la Vicarie (au pont). Un petit groupe de 4 ou 5 individus. Première observation du 14 juillet 1988, renouvelée le 13 juillet 1994. Deux autres stations sont citées par le Catalogue des Basses-Alpes (1992).
- *Juncus sphaerocarpus*
 - Commune de Pierrerue, lieu-dit la Tuilière. Observation du 12 mai 1994. Le site occupait 4 à 5 ares d'une friche sablonneuse légèrement en pente, vers 430 m d'altitude. Individus très nombreux, en groupes parfois serrés. Etant donné le statut du terrain, on peut considérer la station comme précaire. Première observation pour le département.
- *Lamium garganicum* subsp. *laevigatum*
 - Châteauneuf-lès-Moustiers, aux rochers de Notre-Dame, exactement à l'aplomb de la grotte abritant la chapelle : sujets abondants et de belle venue, le 22 mai 1994. Cette station s'ajoute à celles, déjà nombreuses, connues dans le quart nord-est de notre département, mais étend vers le sud (gorges du Verdon) l'aire occupée par ce taxon.
- *Paeonia officinalis* subsp. *villosa*
 - Commune d'Allons, montagne de Pra Chiriei (au-dessus de 1 200 m) et en particulier aux alentours du col de la Chamoussière et vers le Défens, où la plante couvre plusieurs hectares à travers la forêt de pins sylvestres. Il s'agit sans doute de la même station mentionnée (sans autre précision) par L. LAURENT dans son *Catalogue raisonné des plantes vasculaires des Basses-Alpes* T. 1 p.119 (1936). Dernière observation : 29 juin 1994.
- *Pulmonaria longifolia*
 - Commune de Volx, aux Ubacs (forêt mixte de ravin : *Pinus sylvestris* et *Quercus pubescens* subsp. *pubescens*, altitude 360 m), abondante sur une centaine de mètres le long de l'ancien chemin de Volx, ainsi que sur les pentes avoisinantes. 27 avril 1994.
 - Commune de Peyruis, au Col-Bas, 720 m (même écologie), très abondante sur plusieurs hectares le long du chemin du Défens. 17 avril 1994. Vraisemblablement, et selon les indications fournies par l'article de B.

GIRERD dans le n° 441 du *Monde des Plantes*, il s'agit de la subsp. *cevennensis*, qui ferait ainsi une avancée dans notre département.

- *Tulipa clusiana*
 - Manosque, lieu-dit Font-de-Guérin, propriété du Dr DEMAY. La station compte une vingtaine de pieds sur une superficie de deux ares environ (olivette). D'après l'inventaire du Conservatoire de Gap, cette espèce en régression n'existe que sur deux stations en Provence : celle-ci serait donc la troisième.
- *Tulipa gallica* Loisel.
 - Vilhosc, champ de céréales (alt. 575 m) au bord de la route D 217 entre la colline de Beaudouze et le ravin de Damarouès. Non cité dans le catalogue de LAURENT-DONADILLE (1989). Espèce critique non reconnue par *FLORA EUROPAEA* mais figurant dans l'inventaire du Conservatoire botanique alpin (Gap) avec la mention : "groupe d'espèces mal connues". Voir à ce sujet VILMORIN et GUINOCHE (Flore de France, C.N.R.S. p. 1 103).
- *Utricularia vulgaris*
 - Oraison, étangs des Buissonnades, 10 août 1994.

Bien que fréquentant ces lieux depuis de nombreuses années, je n'avais encore jamais noté la présence de cette remarquable plante d'eau ! C'est donc une première observation pour le département, ce taxon ne figurant pas dans le complément au Catalogue des Basses-Alpes édité en 1986 par P. DONADILLE. Cette utriculaire a complètement ceinturé les deux étangs, même à proximité de la partie aménagée en base de loisirs !

Département de l'Aveyron

Contribution de : Michel BOUDRIE

- *Asplenium trichomanes* L. subsp. *quadrivalens* D.E. Meyer
 - Vieux murs calcaires, Le Causse, 3-4 km au nord-est d'Estaing (juillet 1990 !, DK 73).
 - Rochers calcaires, 3 km à l'O-SO de Couffouleux (octobre 1994 !, DJ 84).
- *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. *cambrensis* Fraser-Jenkins.
 - Rochers siliceux, alt. 350 m, bords de la D 621, vallée de la Truyère, à 1 km au sud de Brézou (septembre 1994 !, DK 75).
 - Talus ombragés, alt. 300 m, bords de la D 621, vallée de la Truyère rive gauche, à 1,3 km au S-SO de Vallon (septembre 1994 !, DK 75). Avec *D. affinis* subsp. *affinis* et *D. oreades* (= *D. abbreviata*).
- *Polystichum setiferum*
 - Bords de la D 22, au nord-est d'Estaing (juillet 1990 !, DK 73).
 - Bords de la D 621, vallée de la Truyère, entre le pont du Brézou et le pont de Vallon (octobre 1994 !, DK 75).
 - Bords de la D 33, 2 km au nord de Plaisance (octobre 1994 !, DJ 66).
- *Polypodium x mantoniae* Rothm. (*P. interjectum* x *P. vulgare*)
 - Talus ombragé, bord de la D 51, entre Barre et Peux, à 3 km à l'O-SO de Couffouleux (octobre 1994 !, DJ 84). Avec les parents, nouveau pour le département.

Département de la Charente

Contribution de : Michel BOUDRIE

- *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. *affinis*
 - Base de rochers, coteau boisé en rive droite de la Tardoire, en amont du pont de la D 699, à 3 km à l'E-NE d'Ecuras (octobre 1994 !, CL 16). Quelques pieds çà et là.

Contribution de : René CHASTAGNOL

- *Geranium macrorrhizum*
 - Commune de Puymoyen, dans le village Le Petit Rochefort, sur le bord ouest de la route ; 2 ou 3 pieds, encore fleuris le 25 décembre 1994. Insolite, parce qu'il fait penser aux espèces montagnardes *G. sylvaticum* subsp. *sylvaticum* et *G. phaeum*.

Contribution de : J.-C. GUÉRIN,
J.-M. MATHÉ, A. MERLE

- *Epipactis muelleri*
 - Bois des Couradeaux, 2 km au sud-ouest de Tuzie, BL 79, quelques pieds disséminés (6 juillet 1994).
 - Bois de la Faye, 2,5 km au sud de Rouillac, YR 27, quelques pieds en bordure du chemin (fin juin 1994).
- *Gymnadenia odoratissima*
 - Minuscule coteau calcaire au lieu-dit Chez Boiteau, 2 km au sud de Saint-Cybardeaux, YR 38, 30 pieds (28 mai 1994).
- *Limodorum abortivum* subsp. *trabutianum*
 - Bois Redon, 800 m à l'est du théâtre gallo-romain des Bouchauds (Cne de Genac), BL 68. Station découverte en 1988. Floraison régulière observée depuis (jusqu'à 30 tiges fleuries en 1989), 6 plantes fleuries le 23 mai 1994.
- *Ophrys apifera* subsp. *apifera* fo. *chlorantha*
 - Coteau calcaire longeant la voie ferrée, 1,5 km au sud-ouest de Tuzie, BL 79, 1 pied en lisière (28 mai 1994).
 - Clairière à 500 m au nord-ouest de l'église de Châtres (Cne de Saint-Brice), YR 16, 2 pieds (6 juin 1994).
- *Ophrys apifera* subsp. *apifera* var. *trollii* fo. *chlorantha*
 - Clairière à 500 m au nord-ouest de l'église de Châtres (Cne de Saint-Brice), YR 16, 5 pieds (observation de Pascal LAVOUÉ, 6 juin 1994).
- *Ophrys santonica* Mathé et Melki [espèce nouvelle, cf. *L'Orchidophile*, **112** (juillet 1994) et **113** (octobre 1994)]
 - Pente herbeuse à genévriers près de Bois Redon (Cne de Genac), BL 68, environ 60 pieds (juillet 1994).
 - Clairière dans la partie sud du bois des Bouchauds, 2,5 km au nord-est de Saint-Cybardeaux, YR 38, 20 pieds (juillet 1994).

- Coteau calcaire longeant la voie ferrée, 1,5 km au sud-ouest de Tuzie, BL 79, nombreux pieds (plus de 100) (juillet 1994).
- Coteau calcaire près de "la Cabane", 2 km au nord de Mansle (Cne de Fontclaireau), BL 88, plus de 50 pieds (juillet 1994).
- *Ophrys scolopax* subsp. *scolopax* fo. *bicolor*
 - Coteau à 1 km au sud de Mansle, BL 88, 2 pieds (observation de Patrice LAVOUË, juillet 1994)

Contribution de : Philippe JOURDE
et Pascale GUICHON

- *Carex digitata*
 - Mouthiers-sur-Boême, le Grand Guillon, bordure d'un chemin en lisière de bois (20 avril 1994).
- *Linum austriacum* subsp. *collinum*
 - Châteauneuf-sur-Charente, coteau de Fontaury. Trois pieds (12 mai 1994).
- *Ophrys insectifera*
 - Cognac, parc François 1^{er}. 6 pieds (mai 1994).

Département de la Charente-Maritime

Contribution de : Yves BARON

- *Bupleurum lancifolium*
 - La Villedieu, près de la forêt d'Ensigné et de la D 950, avec *Centaurea cyanus*, *Galium tricornutum*, *Adonis annua* subsp. *annua*, *Ranunculus arvensis*, *Petroselinum segetum*, *Buglossoides arvensis* subsp. *arvensis* ; 27 mai 1994.

Contribution de : Michel BOUDRIE

- *Polystichum x bicknellii* (*P. aculeatum* x *P. setiferum*)
 - Talus boisé dans d'anciennes carrières, vallée de l'Arnoult, au sud-est de Varzay (juin 1994 !, XR 76). Plusieurs pieds, avec *P. aculeatum* indiqué par A. BOURASSEAU.

Contribution de : Pierre CHAMPAGNE

- *Epipactis palustris*
 - Les Allassins, Passe des Soeurs (commune de Grand Village, XR 38) ; 10 pieds (mi-juillet 1994).
- *Spiranthes aestivalis*
 - Les Allassins, Passe des Soeurs (commune de Grand Village, XR 38). Station située sur la dune fixée, dans une dépression humide très importante en 1994, où elle a été recouverte par les eaux pendant les mois d'hiver et au début du printemps. Environ une centaine de pieds fleuris au 10-15 juillet, sur le déclin de la

floraison d'*Epipactis palustris* (plusieurs centaines de pieds, dont de nombreux sujets de la variété *albiflora*).

En mai, présence de *Platanthera chlorantha*, *Cephalanthera rubra*, dans les buissons de saules.

Contribution de : J.-C. GUÉRIN,
J.-M. MATHÉ, A. MERLET

- *Ophrys santonica* Mathé et Melki (cf. note ci-dessus, Charente)
 - Carrière de Saint-Mandé, YS 00, 5 pieds, mi-juillet 1994.
 - Coteau de la Borderie (Cne de Vilmorin), YR 09, 50 pieds, mi-juillet 1994.
 - La Basse Chailloterie (Cne de la Villedieu), YS 10.

Contribution de : Philippe JOURDE
et Pascale GUICHON

- *Ajuga chamaepitys* subsp. *chamaepitys*
 - Yves-sur-Mer, réserve naturelle du marais d'Yves, sur une dune fossile (XS 50.02). Une quarantaine de pieds (mai 1994).
 - Sainte-Gemme, Cadeuil, à l'est de la route départementale 733 (XR 60.70). Une quinzaine de pieds (mai 1994).
- *Andryala integrifolia*
 - Chaniers, Chantemerle, près du centre équestre de Saintes. Quelques dizaines de pieds en bordure d'une vigne (juillet 1994).
- *Apera interrupta*
 - Châtelailon-Plage, Saint-Jean-des-Sables. Sur plusieurs m² (mai 1994).
- *Aquilegia vulgaris*
 - Thairé-d'Aunis, petit bois entre le Moulin de Lhouet et La Gravelle. Une trentaine de pieds (juin 1994).
- *Aster Linosyris*
 - Pérignac, petite pelouse sèche relictuelle en bordure de vigne, au sud de Sainte-Foy. Une cinquantaine de pieds (septembre 1994).
 - Chérac, coteau calcaire près de Le Gite. 75 pieds (septembre 1994).
 - Mons, petite pelouse sèche relictuelle de 100 x 50 m en bordure d'un bois au sud de la Tacherie. Plusieurs milliers de pieds, au point que la pelouse en est jaune (septembre 1994).
- *Astragalus monspessulanus*
 - Esnandes, Pointe Saint-Clément, sur le sommet de la falaise (XS 42.23). Quelques pieds (31 août 1994).
- *Baldellia ranunculoides*
 - Saint-Vivien, Les Arènes. Commune, en compagnie de *Ranunculus ophioglossifolius* (juin 1994).
 - Yves-sur-mer, Voutron. Quelques pieds près de la station de pompage (juin 1994).
 - La Gripperie-Saint-Symphorien, dans les fossés du bois de la Frénaie (25 mai 1993).

- *Bellardia trixago*
 - Saint-Georges d'Oléron, La Sorine, près du petit bois de Tirançon. Une centaine de pieds (4 juin 1994).
 - Saint-Georges d'Oléron, arrière-dune au nord de la Gautrelle (5 juin 1994).
 - Saint-Georges d'Oléron, arrière-dune de la plage de Boyarville (4 juin 1994).
- *Biscutella guillonii*
 - Haimps, Chantecroix, dans une petite chaume relictuelle entre les vignes, le long de la route départementale 939. Quelques pieds (octobre 1994).
 - Brie-sous-Matha, dans une ancienne carrière le long de la route de Ballans (octobre 1994).
- *Bombycilaena erecta*
 - Châtelailлон-Plage, Saint-Jean-des-Sables. Une trentaine de pieds (juin 1994).
 - Angoulins-sur-Mer, Pointe du Chay. Une vingtaine de pieds dans la station de *Neatostema apulum* (mai 1994).
- *Bupleurum tenuissimum* subsp. *tenuissimum*
 - Angoulins-sur-Mer, marais du Chay. L'espèce est abondante sur la digue qui borde le marais (5 août 1994).
- *Carex demissa* (= *C. viridula* subsp. *oedocarpa*)
 - Dompierre-sur-Mer, Chagnolet, sous le pont du canal de Marans à la Rochelle (17 septembre 1994).
- *Carex liparocapos* (= *C. nitida*)
 - Chaumes de Sèchebec (25 avril 1993), une vingtaine de pieds.
- *Carex pallescens*
 - La Gripperie-Saint-Symphorien, Bois de la Frênaie (25 mai 1993).
- *Carex pendula*
 - Le Seure, très abondant dans la vallée de l'Antenne (septembre 1994).
- *Carex pseudocyperus*
 - Aigrefeuille, berges du lac de Frace. Quelques pieds (22 juin 1993).
- *Carex punctata*
 - Saint-Sornin, Le Talut. Quelques touffes (29 mai 1993).
- *Carex tomentosa*
 - Bords, Charron, bois de la Cabane. Quelques pieds (3 mai 1992).
- *Centaurea calcitrapa*
 - Saint-Vivien, au sud des Arènes. Abondante près d'une cabane à vaches (août 1994).
- *Centaurea scabiosa*
 - Thairé, moissons au sud du bois de la Garde. Une dizaine de pieds (26 juillet 1993).
- *Cirsium tuberosum*
 - Saint-Vivien, secteur au sud des Arènes. Quelques pieds (juillet 1994).
- *Dorycnium pentaphyllum* subsp. *pentaphyllum*
 - Échebrune, talus exposé, entre Usson et Meussac. Quelques touffes (5 octobre 1994).
 - Marignac, coteau calcaire exposé au sud-ouest entre Usseau et Chadenac (5 octobre 1994).
 - Chérac, Le Gite, quelques touffes (octobre 1994).
 - Meux, coteaux calcaires (septembre 1994).

- *Echinops ritro* subsp. *ritro*
 - Châtelailлон-Plage, 3 pieds sur un coteau exposé au sud-ouest (29 juillet 1993 ; présents aussi en 1994).
- *Euphorbia serrata*
 - Angoulins-sur-Mer, Pointe du Chay. Plusieurs centaines de pieds entre les moissons (juin 1994).
 - Angoulins-sur-Mer, bord de la voie ferrée au niveau de Saint-Jean-des-Sables. Sur les 10 pieds observés en 1993, seuls 2 ont survécu à la réfection de la clôture qui borde la voie (juillet 1994).
 - Châtelailлон-Plage, les deux pieds bordant la voie ferrée au niveau du château d'Orbigny ont été passés aux herbicides par les employés de la S.N.C.F., qui "nettoyaient" les ballasts (juillet 1994).
- *Galium arenarium*
 - Saint-Georges d'Oléron, dune de la plage de Boyarville. Une dizaine de pieds épars (4 juin 1994).
- *Geranium sanguineum*
 - Thairé-d'Aunis, bois du Jaud. Une cinquantaine de pieds (17 mai 1993).
 - Saint-Savinien, en lisière d'un bois de chênes verts entre le bourg et Vaufranche (juin 1994).
- *Hottonia palustris*
 - Saint-Sornin, le pont des Brandes. Une centaine de pieds (mai 1994).
 - Aigrefeuille-d'Aunis, lac de Frace, quelques pieds (avril 1994).
- *Inula helenium*
 - Saint-Just-Luzac, La Parisse. Une cinquantaine de pieds (26 juin 1994).
 - Saint-Laurent-de-la-Prée, le long de l'ancienne route nationale. Une trentaine de pieds (juin 1993).
 - Saint-Laurent-de-la-Prée, le long du canal de Charras, au niveau de l'Houmée (juillet 1994).
 - Ardillères, bord de la route entre le canal de Charras et la Grande Cabane. En tout une centaine de pieds (juin 93).
 - Breuil-Magné, levée des Parpaings. Quelques pieds (juillet 1994).
- *Inula salicina* subsp. *salicina*
 - Croix-Chapeau, côte de Roulecul. Quelques touffes en bordure des moissons (27 juillet 1993).
 - Thairé-d'Aunis, moissons au sud du bois de la Garde (août 1994).
- *Inula spiraeifolia*
 - Breuil-Magné, côte du Liron. Abondante (juin 1993).
 - Chérac, le Gîte. Une trentaine de pieds (25 septembre 1994).
 - Châtelailлон-Plage, Les Boucholeurs, sur la falaise (juin 1994).
- *Linaria thymifolia*
 - Saint-Georges-d'Oléron, dune de la plage de Boyardville. Trois pieds (septembre 1994).
- *Ludwigia peploides*
 - Ciré-d'Aunis, canal de Charras entre le pont de Lagord et la vanne de la Pelle Rouge : 1 pied en 1991, 523 en 1994. Par endroit, la plante couvre le canal sur toute sa largeur et grimpe sur les berges.
 - Dompierre, Chagnolet, canal de Marans à La Rochelle. Premier pied noté en 1993.

- Échillais, canal de la Broidoire entre Saint-Agnant et le bois du Chay : premier pied en 1993, une centaine en 1994.
- *Medicago orbicularis*
 - Châtelailon-Plage, sables de Saint-Jean-des-Sables. Quelques pieds (3 juin 1993).
- *Nigella damascena*
 - Port-d'Envaux, Bois de la Vallée ou bois des Héros. Trois pieds en bordure de moissons au nord de La Vignerie (mai 1993).
L'espèce semble devenir de plus en plus rare. Les quelques stations que je connaissais entre Châtelailon et Aigrefeuille ont toutes disparu.
- *Ophioglossum vulgatum*
 - Le Château-d'Oléron, Fief Melin (XR 37.83 ; 6 mai 1994).
 - Saint-Sornin, entre la Massonne et la Grande Mauvinière (XR 58-59.71). Une quarantaine de pieds (10 avril 1994).
 - Saint-Just-Luzac, entre le Moulin des Sables et Boisrond, au N-NE d'Artouan (XR 52.72 ; 10 avril 1994).
- *Ophrys passionis* Sennen (cf. le "Guide des Orchidées d'Europe", de P. DELFORGE, p. 425)
 - Châtelailon-Plage, Saint-Jean-des-Sables. Une trentaine de pieds bien individualisés et localisés au sein d'une population d'*Ophrys sphegodes* typiques. La floraison de ce taxon est d'un mois plus tardive que celle de l'*Ophrys araignée* typique. La pilosité et la forme du labelle sont bien différentes. Population connue depuis 1991 mais identifiée grâce au livre de DELFORGE en mai 1994.
- *Ophrys sphegodes* subsp. *litigiosa* (= *O. araneola*)
 - Angoulins-sur-Mer, Pointe du Chay. Une vingtaine de pieds localisés (avril 1993 et 1994).
 - Saint-Savinien, chaume de Sèchebec. Huit pieds (avril 1994).
 - Bords, Charron, ourlet du bois de la Cabane. Trois pieds (avril 1994).
- *Ophrys insectifera*
 - Landrais, entre le Moulin et les Granges. Six pieds (mai 1993).
 - Virson, bois de la Garenne. Cinq pieds (mai 1993).
- *Parentucellia latifolia*
 - Angoulins-sur-Mer, Pointe du Chay. Espèce en expansion notée en 1992 pour la première fois. Près de 200 pieds en 1994.
- *Plantago arenaria*
 - Châtelailon-Plage, Saint-Jean-des-Sables. Plusieurs milliers de pieds. Espèce en expansion, seule capable de rivaliser avec *Lagurus ovatus* sur ces sables anthropisés (juillet 1994).
- *Platanthera bifolia*
 - Aigrefeuille-d'Aunis, pourtour du lac de France. 50 pieds (mai 1993).
- *Scrophularia scorodonia*
 - Saint-Georges-d'Oléron, bordure d'une haie et d'un canal, Tirançon. 50 pieds (4 juin 1994).
- *Serapias parviflora*
 - Le Château-d'Oléron, Fief Melin. 26 pieds (6 mai 1994).
- *Sideritis hyssopifolia* subsp. *guillonii*
 - Montils, pelouse calcaire relictuelle près de l'ancienne laiterie. Deux pieds (septembre 1994).

- Chérac, le Gite. Quelques pieds (septembre 1994).
- *Silene conica* subsp. *conica*
 - Châtelailion-Plage, sables entre le château d'Orbigny et Saint-Jean-des-Sables (29 avril 1992).
- *Silene otites* subsp. *otites*
 - Châtelailion-Plage, sables entre le château d'Orbigny et Saint-Jean-des-Sables. Une quarantaine de pieds (13 juillet 1993).
- *Spiranthes spiralis*
 - Meschers-sur-Gironde, plage des Vergnes. Une trentaine de pieds (17 septembre 1994).
 - Chérac, le Gite. Une vingtaine de pieds (octobre 1994).
 - Pérignac, sud de Sainte-Foy. Cinquante pieds (octobre 1994).
 - Châtelailion-Plage, sables au nord du Château d'Orbigny (septembre 1994).
 - Dompierre-sur-Mer, sur les talus du canal de Marans à La Rochelle. Plus de 800 pieds en plusieurs stations.
 - Bords et Saint-Savinien, plusieurs milliers de pieds (septembre 1994).
 - Mons, sud de la Tacherie. Une vingtaine de pieds (octobre 1994).
- *Tetragonolobus maritimus* (= *Lotus maritimus*)
 - Saint-Sornin, bord de la D 118 entre La Grande Mauvinière et la Massonne (10 avril 1994).
 - Aytré, marais d'arrière-dune. Abondant (avril 1993).
 - Le Château-d'Oléron, Fief Melin (mai 1994).
 - Yves-sur-Mer, Voutron (mai 1994).
- *Trigonella gladiata*
 - Châtelailion-Plage, sables et talus calcaires de Saint-Jean-des-Sables. Une vingtaine de pieds (16 mai 1993).
- *Utricularia australis*
 - Yves-sur-mer, Voutron, abondante près de la station de pompage (août 1994).
- *Vulpia ciliata* subsp. *ambigua*
 - Châtelailion-Plage, sables entre le château d'Orbigny et Saint-Jean-des-Sables où l'espèce est abondante avec d'autres *Vulpia* (mai 1994).
 - Yves-sur-Mer, réserve naturelle du Marais d'Yves, dune fossile (mai 1994). Le Cinquième Supplément de la Flore de COSTE donne cette espèce comme présente "dans les sables maritimes depuis Châtelailion (Charente-Maritime) jusqu'en Belgique et au sud de la Grande-Bretagne". La découverte de la plante sur la commune d'Yves fait descendre sa répartition de quelques kilomètres vers le sud. Il est fortement probable qu'une recherche plus attentive nous fasse découvrir cette espèce ailleurs dans le département.
- *Wolffia arrhiza*
 - Yves-sur-Mer, en plusieurs points du marais de Voutron (septembre 1994).

Contribution de : Ch. LAHONDÈRE et R. DAUNAS

- *Ammi visnaga*
 - Sur la digue parallèle à la Charente à Saint-Laurent-de-la-Prée ; quelques individus ; juin 1994.

- *Arenaria serpyllifolia* var. *macrocarpa*
 - Dans l'**Artemisio - Ephedretum** de la Pointe Espagnole, près de Ronce-les-Bains, commune de La Tremblade ; mai 1994.
- *Arthrocnemum fruticosum* var. *deflexa* Rouy
 - Avec le type, marais du Galon d'Or, près de Ronce-les-Bains, commune de La Tremblade ; juin 1994.
- *Asphodelus albus* subsp. *albus*
 - Espèce rare, semble-t-il, dans les landes de Montendre ; en bordure d'un bois de châtaigniers au lieu-dit "Prends-tu-Garde" à Montlieu-la-Garde ; avril 1994.
- *Cardamine parviflora*
 - Abondant dans une petite zone marécageuse en bordure d'un ruisseaulet, affluent de la Saye, à l'intérieur du camp militaire de Bussac - Bédenac ; mai 1993.
- *Carex umbrosa* subsp. *umbrosa*
 - Près d'un point d'eau au sud de Bussac-Forêt ; avril 1994.
- *Cistus salvifolius*
 - Manteau d'un bois de plusieurs chênes (dont *Quercus pyrenaica*) au lieu-dit "La Forêt", au sud de Sablonceaux ; mai 1994.
- *Cytisus striatus*
 - Bord de la route Royan-Rochefort au nord de Cadeuil, commune de La Gripperie-Saint-Symphorien ; juin 1994 (avec *Cytisus scoparius* subsp. *scoparius*).
- *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *fuchsii*
 - Talus en bordure de la chênaie pubescente entre Bords et Charron, commune de Bords ; quelques individus ; juin 1994.
- *Daphne laureola* subsp. *laureola*
 - Lieu-dit "La Forêt" au sud-est de Sablonceaux, bois à *Quercus ilex*, *Q. pubescens* hybride, *Q. robur* subsp. *robur* ; mai 1994.
- *Dianthus gallicus*
 - Très belle colonie dans une clairière du **Pino - Quercetum ilicis**, dans le secteur dit des "Vignes" à Saint-Georges de Didonne ; ailleurs rare en lisière du même bois ; septembre 1994.
 - Également présent dans la dune boisée des Vergnes à Meschers ; septembre 1994.
- *Draba muralis*
 - Sable le long d'un pare-feu longeant la voie ferrée au sud de Bussac-Forêt ; avril 1994.
- *Euphorbia polygonifolia*
 - Dans l'**Euphorbio - Ammophiletum**, où l'espèce est rarissime ; vieux phare de La Coubre à La Tremblade, novembre 1993.
- *Festuca lemanii*
 - Pelouses calcaires de Bougneau au nord-est de Pons ; mai 1994.
- *Festuca rubra* subsp. *rubra* et *Festuca juncifolia*
 - Sable en bordure de l'aulnaie du Galon d'Or à Ronce-les-Bains, commune de La Tremblade ; mai 1994.
- *Gentiana pneumonanthe*
 - Lande à *Erica scoparia*, *Molinia caerulea* subsp. *caerulea* et *Erica ciliaris* ; La Génetouse ; octobre 1993.

- *Gratiola officinalis*
 - Petite zone marécageuse en bordure d'un ruisseau, affluent de la Saye, à l'intérieur du camp militaire de Bussac-Bédenac ; mai 1993.
- *Linaria pelisseriana*
 - Forêt de la Coubre au sud de la Maison forestière des Brisquettes, au bord de la "Tranchée de la Base" ; une vingtaine d'individus découverts par G. ESTÈVE ; mai 1994.
- *Linaria thymifolia*
 - Flèche de sable de la Pointe de La Coubre, où l'espèce n'est pas rare dans l'**Euphorbio - Ammophiletum** ; octobre 1993.
- *Malva moschata*
 - Bordure de la lande à *Cytisus scoparius*, près des argiles à kaolin, Clérac ; juillet 1993.
- *Matthiola sinuata*
 - Espèce très rare sur les dunes des côtes de la Saintonge continentale ; quelques individus dans l'**Euphorbio - Ammophiletum** du nord de La Grande-Côte à Saint-Palais sur Mer ; novembre 1993.
- *Narcissus x medioluteus*
 - Plusieurs touffes dans une prairie de fauche au lieu-dit "Prends-tu-Garde" à Montlieu-la-Garde ; avril 1994.
- *Oenanthe foucaudii*
 - Rares individus dans le marais de Langlade, en face du hameau de Langlade, commune des Gonds ; septembre 1993.
- *Oenothera humifusa* Nutt.
 - Cette très rare Onagre a été observée par M. CAUNAN, agent de l'O.N.F., dans l'**Artemisio - Ephedretum** au nord de la Pointe Espagnole et par l'un de nous (Ch. L.) dans la même association mais au sud de la même Pointe, près de Ronce-les-Bains ; mai 1995.
 - La plante a été découverte à la Pointe Espagnole en 1956 par l'un de nous (R. D.) en compagnie de Louis RALLET. Elle est donc en expansion dans cette station. Elle avait également été vue dans les années 50 à Saint-Georges-de-Didonne. Elle ne s'y est pas maintenue, semble-t-il.
- *Omalotheca sylvatica*
 - Sables secs en bordure du pénitencier de Bédenac, juin 1993.
- *Orchis mascula* subsp. *mascula*
 - Chaumes de Sèchebec entre Saint-Savinien et Bords ; un individu ; mai 1994.
- *Paspalum dilatatum*
 - Bord de la route depuis Marans jusqu'au pont surplombant la route Rochefort-Royan, un peu au nord de Cadeuil ; très abondant par endroits (sans doute semé par les services de l'Équipement) ; septembre 1994.
- *Phillyrea angustifolia*
 - Très rare dans la forêt des Saumonards non loin du Fort des Saumonards ; juin 1994 (station découverte par René CHASTAGNOL).
- *Prunus fruticans* Weihe
 - Bois du **Pino - Quercetum ilicis** au Galon d'Or à Ronce-les-Bains, commune de La Tremblade ; mai 1994.

- *Scilla verna*
 - Un individu en bordure d'un chemin près du lieu-dit "Prends-tu-Garde" à Montlieu-la-Garde ; avril 1994. Cette plante avait été signalée par les botanistes du siècle dernier. Retrouvée par Mireille FLEURANCEAU dans les années 60, elle n'existe en Charente-Maritime que dans les landes du sud de ce département où elle est rare.
- *Scorzonera hirsuta*
 - Quelques individus bien localisés sur les chaumes de Sèchebec, entre Bords et Saint-Savinien ; juin 1994.
- *Senecio inaequidens*
 - Quelques pieds dans une clairière du **Pino - Quercetum ilicis**, vers Suzac, commune de Saint-Georges-de-Didonne ; septembre 1994.
- *Serapias lingua*
 - Chaumes de Sèchebec entre Bords et Saint-Savinien ; très rare, mais nous l'avons observé sur ces chaumes trois ou quatre fois depuis plusieurs années et en des points différents ; mai 1994.
- *Serratula tinctoria* subsp. *seoani* Lange
 - Bussac-Forêt, dans le secteur de La Lagune ; très bien caractérisé ici ; septembre 1993.
- *Silene vulgaris* subsp. *thorei*
 - Très commun dans l'**Euphorbio - Ammophiletum** du nord de La Grande-Côte, à Saint-Palais-sur-Mer ; novembre 1993.
- *Stachys arvensis*
 - Cultures sur sables et argiles au nord de Cadeuil, en allant vers Pont-L'Abbé d'Arnoult ; mars 1994.
- *Teesdalia nudicaulis*
 - Sables le long d'un pare-feu longeant la voie ferrée au sud de Bussac-Forêt ; avril 1994.

Contribution de : André TERRISSE

Toutes les notes qui suivent concernent l'île de Ré.

- *Allium ampeloprasum*
 - Dans une dépression de l'arrière-dune du Pas des Boeufs, au Bois (XS 24 14 ; 10 juin 1994) : une trentaine de tiges fleuries, très robustes : certaines mesurent près de 2 mètres ; les feuilles sont encore vertes.
- *Cynosurus echinatus*
 - Au bord d'un chemin sableux au Peu des Aumonts, au sud-est du Bois (XS 26 14 ; 29 juin 1994) : quelques dizaines de pieds, parmi des milliers de tiges de *Lagurus ovatus*. L'espèce était plus commune il y a un siècle ; pourtant LLOYD (4e éd.), qui cite plusieurs stations en "Char.-Inf.", ne l'indique pas sur Ré. C'est la 2e citation récente pour cette espèce dans le Centre-Ouest (cf. *Bull. S.B.C.O.* **23**, p. 161).
- *Montia perfoliata*
 - Le Griveau (Saint-Clément) ; dans un recoin, très ombragé par des cyprès, du terrain de camping "La Côte Sauvage" (XS 1220 ; 26 mars 1994). Cette station se trouve donc au nord-ouest de l'île, alors que les stations précédemment découvertes se situaient au contraire au sud-est (cf. *Bull. S.B.C.O.* **24**, p. 109 et 334).

Sous l'ombre très épaisse, peu de plantes parviennent à végéter. Le peuplement monospécifique de *M. perfoliata* est entouré de peuplements semblablement monospécifiques de *Stellaria pallida*.

- *Parentucellia viscosa*
 - Les Conches, près de la Pointe de Chauveau : une dizaine de pieds seulement, dans une friche, parmi les milliers de tiges de *Bellardia trixago* (XS 3211 ; 7 juin 1994). C'est la seule station actuellement connue sur l'Île pour cette espèce.
- *Tragus racemosus*
 - La Patache, dans un terrain vague proche du rivage, portant des traces de pneus (XS 1620 ; 19 septembre 1994) quelques dizaines de pieds, étalés sur le sol et composés chacun de plusieurs tiges ; sur un même pied on peut voir souvent des tiges dont les fleurs ne sont pas encore épanouies, alors que d'autres ont déjà perdu leurs fruits et se réduisent à un rachis. L'espèce était sûrement plus commune autrefois. Cependant LLOYD (4e éd.) et Ph. ROUSSEAU ne la citent sur Ré qu'en une seule station, la même et dans les mêmes termes : « Fort du Martrais (Lemarié) ». C'est la 3^e station actuellement connue dans le Centre-Ouest, les autres se trouvant à Pons (Ch. YOU) et à l'île d'Elle (cf. ci-dessous contribution TOUSSAINT pour la Vendée).

Contribution de : B. TOUSSAINT
(botaniste au Parc Naturel Régional du Marais Poitevin
d'octobre 1991 à février 1995)

- *Althaea hirsuta*
 - Saint-Xandre. Bord d'une culture, près de la station d'épuration, à la Sauzaie. 5 juillet 1993. XS 42.
- *Lemna minuta* Humb., Bonpl. et Kunth (= *L. minuscula*)
 - Abondant dans les marais mouillés ou desséchés doux ou très faiblement saumâtres.
- *Ludwigia peploides*
 - (Voir note concernant cette espèce en contribution pour la Vendée)
 - En Charente-Maritime, je l'ai notée sur les communes de La Ronde, Taugon et Marans (septembre 1993).
- *Marrubium vulgare*
 - Charron : "Richebonne". Accotement calcaire. 30 juillet 1993. XS 43.

Département du Cher

Contribution de : Michel BOUDRIE

- *Asplenium x alternifolium* Wulf. nothosubsp. *alternifolium* (*A. septentrionale* x *A. trichomanes* subsp. *trichomanes*)
 - Rochers siliceux, près de l'ancien "moulin brûlé", rive gauche de l'Arnon, au sud de Culan (mars 1994 !, DM 55). Un pied, avec les parents, retrouvé sur indications de J. PRUDHOMME.

- *Blechnum spicant*
 - Vallon du ruisseau de Chanays, à 5,5 km à l'ouest de Jars (septembre 1994 !, DN 75).
- *Phyllitis scolopendrium*
 - Vallée de l'Arnon, en aval des ruines du moulin des Fougères, 2 km au nord-est de Sidiailles (juillet 1992 !, DM 45).
- *Osmunda regalis*
 - Vallon du ruisseau de Chanays, entre les Sergents et le Gué des Ruesses, à 5,5 km à l'ouest de Jars (septembre 1994 !, DN 75).
- *Equisetum x litorale* (*E. arvense* x *E. fluviatile*)
 - Vallon du ruisseau de Chanays, entre les Sergents et le Gué des Ruesses, à 5,5 km à l'ouest de Jars (septembre 1994 !, DN 75). Nouveau pour le département.

Département de la Corrèze

Contribution de : Michel BOUDRIE

- *Cryptogramma crispa*
 - Anfractuosités de rochers granitiques, alt. 850 m, puy de Roc-Bas, au nord-est de Pradines (revu, septembre 1992 !, DL 14). Une assez belle touffe.
- *Adiantum capillus-veneris* L.
 - Bords de la Couze, Le Soulier, au nord-est de Chasteaux (juillet 1994 !, CK 79).

Département de la Creuse

Contribution de : Michel BOUDRIE

- *Lycopodiella inundata* (= *Lepidotis l.*)
 - Place nue parmi les sphaignes, tourbière des Moulières, à 1,8 km au nord-est de Faux-la-Montagne (juillet 1993 !, DL 16). Une quinzaine de pieds sur 1/4 de m².
- *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. *affinis*
 - Vallon boisé frais, affluent de la Petite Creuse, au sud de Linard (mai 1994 !, sortie S.B.C.O., DM 18). Quelques pieds, deuxième station du département.
- *Phegopteris connectilis* (= *Thelypteris phegopteris*)
 - Talus humide, alt. 800 m, bord de la D 26A, près de Valéoux, au sud de La Nouaille (juillet 1994 !, DL 27).

Département de la Dordogne

Contribution de : Pamela LABATUT

- *Anacamptis pyramidalis* x *Orchis coriophora* subsp. *fragrans* (= x *Anacamptorchis simorreensis* Cam. et Berg.)
 - Un pied parmi ses parents nombreux (5 juin 1994 ; Cause-de-Clérans). La forme de la hampe florale, allongée et non pyramidale, rappelle celle

d'*Orchis fragrans*, alors que les fleurs ressemblent à celles de l'*Anacamptis* : pétales et sépales sont réunis en casque mais sont ouverts au sommet et ne forment pas la pointe propre à *O. fragrans*. Par sa longueur et sa forme, l'épéron est intermédiaire : il est plus court que celui de l'*Anacamptis* (filiforme), mais plus long que celui de l'*O. fragrans* (conique).

- *Dorycnium pentaphyllum* subsp. *pentaphyllum*
 - Une touffe : Les Thèves, Saint-Perdoux (11 juin 1994).
- *Legousia hybrida*
 - Friche calcaire, Peyregrand et La Graulet, Saint-Capraise d'Eymet (16 juin 1994), avec *Phyteuma orbiculare*, *Centaureum pulchellum*, *Althaea hirsuta*, *Inula montana*, *Spartium junceum*, *Carduncellus mitissimus*, *Helichrysum stoechas* subsp. *stoechas*, *Teucrium montanum*, *Teucrium botrys*.
- *Scilla autumnalis*
 - Au lieu-dit Capy, commune de Beaumont (7 septembre 1994), avec *Phyteuma orbiculare*.
- *Sedum cepaea*
 - Belle population sur un talus au bord d'un V.O., à Puypezac, Bergerac (15 juillet 1994).
- *Senecio erucifolius*
 - Commun entre Faux et Beaumont-du-Périgord (7 juillet 1994).
- *Tolpis barbata*
 - Peyroudal, Sainte-Foy-les-Vignes (commune de Bergerac) : 4 pieds sur un talus sec (20 septembre 1994).

Département du Gard

Contribution de : Christian MOULINE

- *Cistus populifolius* subsp. *populifolius*
 - Au sud-ouest du col d'Uglas : abondant au nord-ouest de "Le Fès" (EJ 78, 9 août 1994).
- *Cistus varius* (= *C. pouzolzii* Delile)
 - Au sud-ouest du col d'Uglas : assez abondant au nord-ouest de "Le Fès" (EJ 78, 9 août 1994).
- *Eragrostis mexicana* (Horneman.) Link subsp. *virescens* (C. Presl) Koch et Sánchez (= *E. virescens* C. Presl)
 - À Aubord, au sud-ouest de Nîmes : 2 individus dans un jardin (FJ 04, 10 août 1994). Détermination confirmée par P. JAUZEIN.

Département de la Gironde

Contribution de : Laurent BUSNEL

- *Romulea bulbocodium*
 - Berme au carrefour des routes D 256 et D 652 entre Sanguinet et Meyran. Une dizaine de pieds, le 30 avril 1995, à proximité de *Silene gallica* très commun.

Contribution de : Patrick DAUPHIN

- *Panicum dichotomiflorum*
 - Gravières de Lauvirat, près de Coutras (octobre 1994). Cette espèce, d'origine américaine, est abondante en cette station.

Contribution de : André LABATUT

- *Adiantum capillus-veneris*
 - Gorges du Ciron, en aval du Pont des Gillets, Pompéjac (YQ 11, septembre 1994) : belle station aux frondes luxuriantes, très localisée.
 - Saint-Emilion (YQ 27, décembre 1994) : entrées d'anciennes carrières reconverties en caves pour le vieillissement des vins.
- *Equisetum ramosissimum*
 - Quelques touffes sur le bord d'un chemin qui longe la Garonne, au lieu-dit "le Bout-de-l'île" (Ludon-Médoc, XQ 89, août 1992).
 - Quelques touffes croissent dans une haie vive parallèle à la rivière Dordogne, le long de la D 130, à la sortie nord-est de Sainte-Foy-la-Grande (Pineuilh, BK 86, décembre 1994). Cette prêle est très abondante en rive opposée, à Port-Sainte-Foy et Ponchapt, mais cette rive droite appartient au département de la Dordogne.
- *Polypodium australe* (= *P. cambricum*)
 - Stations isolées, épiphytes ou sur vieux murs :
 - 1 - Vallée de la Garonne :
 - Beguey (YQ 14, février 1993).
 - Parc du château Margaux, Margaux (XQ 88, mai 1993).
 - 2 - Entre-Deux-Mers :
 - Frontenac (YQ 25, février 1993 (confirmation d'une indication d'É. CONTRÉ)).
 - Daignac (YQ 16, février 1994).
- *Polystichum aculeatum*
 - Hostens (XQ 83, avril 1994).

Département de l'Indre

Contribution de : Michel BOUDRIE

- *Asplenium ruta-muraria*
 - Vieux murs, Champillet (octobre 1987 !, DM 35).
 - Rochers calcaires, bord de la D 50 au nord de Mérigny (février 1988 !, CM 46).
 - Rochers calcaires, vallée de la Creuse entre Bénavant et Fontgombault (juin 1988 !, CM 47).
- *Asplenium trichomanes* subsp. *trichomanes*
 - Rochers siliceux, vallée de l'Anglin, au-dessous de Seillant (juin 1991 !, CM 74).
 - Rochers siliceux, vallée de la Creuse, au Pont Noir près de Gargillesse et entre Cuzion et le pont des Piles (janvier 1988 !, CM 94 et 95).

- *Athyrium filix-femina*
 - Vallée de l'Anglin, au-dessous de Seillant (juin 1991, CM 74).
 - Vallée de l'Indre, 1 km au sud de Briantes, au sud-est de La Châtre (juin 1990 !, DM 25).
 - Bois de Lureuil, à 1,5 km au sud-est de Lureuil (juillet 1990 !, CM 57).
 - Vallon de Rouilly, affluent rive gauche de la Creuse, 4 km à l'est du Blanc (juillet 1992 !, CM 56).
- *Equisetum fluviatile*
 - Prés et fossés marécageux, bords de la D 83, vallée de l'Indre, 1 km au sud de Briantes, au sud-est de La Châtre (juin 1990 !, DM 25).
- *Equisetum x moorei* (*E. hyemale* x *E. ramosissimum*)
 - Talus buissonneux en lisière d'une peupleraie, marais et étang de la Gailleterie, à 3 km à l'est de Martizay (mars 1989 !, CM 53). Station indiquée par P. PLAT.
- *Ophioglossum vulgatum*
 - Prairie humide le long de la D 21, à 3 km au nord de Mézières-en-Brenne (mai 1991 !, CM 69).
- *Osmunda regalis*
 - Rives de l'Anglin, en dessous de Seillant (juin 1991 !, CM 74).

Département de l'Indre-et-Loire

Contribution de : Michel BOUDRIE

- *Blechnum spicant*
 - Talus boisé, ravin des Vallées, 1 km au S-SO de Cheillé (F. BOTTÉ et M.B., septembre 1990 !, CN 03).
- *Equisetum fluviatile*
 - Sous-bois marécageux, forêt de Preuilly, 7 km à l'est de Preuilly-sur-Claise (août 1988 !, CM 49).
 - Sous-bois marécageux le long de la D 61, forêt d'Amboise, 1 km au sud de Saint-Règle (septembre 1989 !, CN 55).

Contribution de : Christian MOULINE

- *Centaurea calcitrapa*
 - Au sud-ouest de Chinon, lieu-dit "Grigny" ; abondant dans 3 prairies pâturées par des bovins et des ovins (BN 82, 12 juin 1994).
- *Cephalanthera damasonium*
 - A Larçay : petite population d'une vingtaine d'individus (en pleine floraison) dans un bois frais situé en bordure du Cher (CN 34, 17 mai 1994).
- *Coronilla emerus* subsp. *emerus* (= *Hippocrepis emerus* (L.) P. Lassen)
 - Au sud de Louestault : petite population sans doute subsponnée en bordure de la route qui longe la propriété du château de Fontenailles (CN 27, 30 juin 1994).
- *Cynoglossum officinale*
 - Quelques centaines de mètres à l'est de Saint-Pierre-des-Corps (route

N 76) : environ une cinquantaine d'individus dans un terrain vague sableux. Espèce autrefois commune, mais peu observée actuellement (25 mai 1994).

- *Reseda phyteuma*
 - A Tours : un individu observé en bordure de la voie ferrée Tours-Bordeaux (1^{er} juin 1994).
- *Rumex patientia* subsp. *patientia*
 - A Monnaie : 3 individus probablement subsponnés sur un talus situé en bordure de la route N 10 (CN 36, mai 1993 et mai 1994).
- *Silybum marianum*
 - A l'ouest de Tours : "La Guignière" : petite population en bordure de la route N 152 (22 mai 1994).

Contribution de : Michel ROCHER

- *Allium ursinum* subsp. *ursinum*
 - Forêt de Preuilley, Bossay-sur-Claise (10 mai 1993). Plante non signalée pour cet arrondissement dans le "Catalogue raisonné des plantes vasculaires d'Indre-et-Loire" d'E.-H. TOURLET (1908).
- *Alopecurus aequalis*
 - Étang Neuf, en Forêt de Preuilley, Charnizay (17 juin 1993).
 - Étang Vaillant, en Forêt de Preuilley, Charnizay (18 juin 1993).
- *Anagallis minima*
 - Chemin en Forêt de Preuilley, Charnizay (22 juillet 1993).
- *Anagallis tenella*
 - Étang des Fontaines, Bossay-sur-Claise (17 juin 1993).
- *Athyrium filix-femina*
 - Signalée rare dans le catalogue de E.-H. TOURLET (1908), et dans le Vallon du Gué de la Vie. Retrouvée entre les étangs inondant aujourd'hui ce même vallon, Bossay-sur-Claise (10 mai 1993).
- *Betula pubescens* subsp. *pubescens*
 - Les Brandes, Bossay-sur-Claise (12 avril 1993).
 - Forêt de Preuilley, Bossay-sur-Claise (10 mai 1993).
 - Étang Neuf en Forêt de Preuilley, Charnizay (19 juillet 1993).
- *Blechnum spicant*
 - Plante retrouvée, considérée RR. dans le catalogue d'E.-H. TOURLET (1908), et signalée par ARISTOBILE en Forêt de Preuilley.
 - Bois entre l'Étang du Gué d'Alezan et l'Étang des Faillards, en Forêt de Preuilley, Bossay-sur-Claise (21 juillet 1993).
 - Fontaine de l'Étang des Fontaines, en Forêt de Preuilley, Bossay-sur-Claise (17 juin 1993).
- *Carex disticha*
 - Étang du Gué d'Alezan, en Forêt de Preuilley, Bossay-sur-Claise (10 mai 1993).
- *Cicendia filiformis*
 - Une seule plante à l'Étang Vaillant, Charnizay (18 juin 1993).
- *Coronilla varia*
 - Près de Piederteau, Bossay-sur-Claise (22 juin 1993).

- *Digitalis lutea* subsp. *lutea*
 - Dans un coteau boisé aux Piverdières du Grand-Pressigny (9 mars 1993).
 - Épars sur quelques ourlets et abondant sur une coupe en Forêt de Preuilley, Charnizay (17 juin 1993). Mentionnée ici, RR., dans le catalogue d'E.-H. TOURLET (1908) par ARISTOBILE.
- *Dipsacus pilosus*
 - Rive droite de La Creuse, non loin du bourg de Tournon-Saint-Pierre (27 novembre 1993).
- *Drosera rotundifolia*
 - Signalée R. dans le catalogue d'E.-H. TOURLET (1908), et dans le Vallon du Gué de la Vie par ARISTOBILE. Retrouvée à l'Étang des Faillards (quelques pieds) et à l'Étang du Gué d'Alezan (abondant avec quelques pieds de *Pinguicula lusitanica* non signalés), Bossay-sur-Claise (10 mai 1993).
- *Dryopteris carthusiana*
 - Étang des Fontaines, étang du Gué d'Alezan et bois en amont, Bossay-sur-Claise (10 mai 1993).
- *Eriophorum angustifolium*
 - Étang du Gué d'Alezan, Bossay-sur-Claise (10 mai 1993).
- *Euphorbia hyberna* subsp. *hyberna*
 - Forêt de Preuilley, Bossay-sur-Claise (10 mai 1993).
- *Euphorbia villosa*
 - Chemins au nord de la Vallée des Bois, Boussay (22 mai 1993).
- *Exaculum pusillum*
 - Étang du Bois Rond, étang Vaillant, commune de Charnizay (19 juillet 1993).
- *Gypsophila muralis*
 - Étang du Chaiseau, avec *Pulicaria vulgaris* et quelques pieds de *Potentilla supina*. Le Petit-Pressigny (21 juillet 1993).
- *Hottonia palustris*
 - Étang des Faillards, Forêt de Preuilley, Bossay-sur-Claise (10 mai 1993).
 - Mare permanente non loin de La Rolle en Forêt de Preuilley, Bossay-sur-Claise (18 juin 1993).
 - Étang du Gué d'Alezan en Forêt de Preuilley, Bossay-sur-Claise (18 juin 1993).
- *Impatiens glandulifera*
 - Rives du Brignon, Ferrière-Larçon (8 septembre 1993).
- *Inula conyza*
 - Étang de La Rolle, Forêt de Preuilley (18 juin 1993).
- *Juncus heterophyllus*
 - Nombreux à l'étang Neuf en assec, Charnizay (17 juin 1993).
 - Étang Vaillant, Étang du Bois Rond, Charnizay (19 septembre 1993).
- *Littorella uniflora*
 - Signalée dans le catalogue d'E.-H. TOURLET (1908) à l'étang Vaillant, Charnizay (retrouvée le 18 juin 1993).
- *Najas marina*
 - Étang du Gué d'Alezan en forêt de Preuilley, Bossay-sur-Claise (8 octobre 1993).
- *Oenanthe peucedanifolia*
 - Étang des Fontaines en forêt de Preuilley, Bossay-sur-Claise (17 juin 1993).

- *Osmunda regalis*
- Vallon inondé par les étangs en forêt de Preuilly, Bossay-sur-Claise (10 mai 1993).
- *Parentucellia viscosa*
- Étang Perrière, Bossay-sur-Claise (22 juin 1993).
- *Pilularia globulifera*
- Inondée et exondée à l'étang Neuf, Charnizay (17 juin 1993).
- *Potentilla supina*
- Un seul pied à l'étang Vaillant, Charnizay (18 juin 1993).
- *Scutellaria minor*
- Autour de divers étangs de La Forêt de Preuilly, communes de Charnizay et de Bossay-sur-Claise (juillet 1993).
- *Thalictrum flavum* subsp. *flavum*
- Une seule touffe à l'étang du Gué d'Alezan en forêt de Preuilly, Bossay-sur-Claise (9 septembre 1993).
- *Trapa natans*
- Étang Neuf et Étang des Fontaines en forêt de Preuilly, respectivement sur les communes de Charnizay et de Bossay-sur-Claise (17 juin 1993).

Département des Landes

Contribution de : Michel BOUDRIE

- *Equisetum x litorale* (*E. arvense* x *E. fluviatile*)
- Talus et sous-bois marécageux, au bord de la D 652, près du pont de la Barthe, 3 km à l'ouest de Soustons (août 1985 !, XP 34).

Contribution de : Laurent BUSNEL

- *Silene portensis*
- Rive nord-est du lac marin d'Hossegor, sur le haut de plage. Disséminé en mai 1995.
- *Linaria spartea*
- Messicole très raréfiée en Aquitaine retrouvée en mai 1995 au sud-ouest de Léon. Environ 50 pieds. Espèce qui va être inscrite sur la liste des plantes protégées au plan national. Localisation exacte de la station et type de biotope volontairement non mentionnés. Cette linaria sera visible dans les années à venir au Jardin Botanique de Bordeaux et au Conservatoire Botanique National de Brest.

Département du Loir-et-Cher

Contribution de : Laurent BUSNEL

- *Chrysanthemum segetum*
Messicole retrouvée en Loir-et-Cher sur deux parcelles cultivées durant l'automne 1994 (octobre) ; plus de 100 pieds :

- Chaumont-sur-Loire (au sud de...) : "La Haute Noue", en bordure est de la D 114 ;
- Vallières-les-Grandes : "La Boucherie", à l'ouest de la D 27.
- *Lupinus angustifolius* subsp. *angustifolius*
 - Chouzy-sur-Cisse : sablière abandonnée en bordure de la N 152 ; environ 10 pieds en mai 1995.
- *Oenothera erythrosepala*
 - Chouzy-sur-Cisse : sablière abandonnée en bordure de la N 152 ; environ 10 pieds en mai 1995.

Département du Lot

Contribution de Jean-Pierre JACOB

- *Arabis stricta* (= *A. scabra*)
 - Bouziès : falaises longeant la D 41 à l'ouest du Célé à environ 1 km au nord de Conduché ; rare à 1,50 m du sol (CK 92 - 10 avril 1994).
- *Cardamine heptaphylla*
 - Saint-Médard : charmaie à 1 km à l'est sur la rive gauche du Vert (CK 63 - 10 avril 1992).
- *Carum verticillatum*
 - Lavercantière : chemin forestier qui mène aux étangs du Frau à partir de la D 50 (CK 64 - 4 août 1994).
- *Chaenorhinum organifolium* subsp. *organifolium*
 - Bouziès : falaises à l'ouest du Célé, au nord de Conduché sur la route de Cabrerets : ce sont probablement les stations où l'abbé V. BACH, le 5 Juin 1902, récolta la plante et l'envoya à E. MALINVAUD (voir *Bull. Soc. bot. Fr. T.* 54 - 1907, p. 503 (CK 92 - 10 avril 1994)).
- *Convallaria majalis*
 - Saint-Denis Catus : La Brousse, nombreuses plantes en sous-bois le long du bord est de la D 12 (CK 73 - 29 mai 1994).
- *Doronicum pardalianches*
 - Saint-Médard : charmaie, rive gauche du Vert, 1 km à l'Est du village (abondant non fleuri le 19 avril 1992 ; quelques plantes encore fleuries le 8 juin 1992 - CK 63).
- *Drosera intermedia*
 - Lavercantière : étang du Frau, abondant dans une station sur sol sableux suintant (CK 64 - 4 août 1994).
- *Drosera rotundifolia*
 - Lavercantière : étang du Frau, avec le précédent, abondant sur les coussins de sphaignes (CK 64 - 4 août 1994).
- *Eragrostis barrelieri*
 - Cahors : quelques pieds dans un massif de fleurs, rive droite du Lot, non loin du Pont Valentré (CK 72 - 1^{er} septembre 1994).
- *Euphorbia chamaesyce* subsp. *chamaesyce*
 - Cahors : cour privée de l'ancien Magasin des Tabacs, non loin des allées Fénélon, station urbaine avec des plantes bien développées, fructifiant abondamment ; détermination confirmée par R. CORILLION (CK 72 - 27 août 1994).

- *Euphorbia prostrata*
 - Cahors : petite population au bord du parc de stationnement, devant "la Jardinerie" (bord gauche de la D 8 dans la direction de Pradines) (CK72 - 1^{er} septembre 1994).
 - Saint-Cirq Lapopie : belle station place du Sombral devant le rocher ; d'autres exemplaires disséminés dans la rue qui descend vers le musée Rigaut ; détermination confirmée par R. CORILLION (CK92 - 2 septembre 1994).
- *Galanthus nivalis* subsp. *nivalis*
 - Ussel : bord gauche de la D 127 en direction de la N 20, au niveau de la Combe de Génies, loin de toute habitation, population importante (CK 73 - 5 mars 1994).
- *Geranium nodosum*
 - Peyrilles : fossé du diable près de Dégagnazés, en sous-bois aux environs d'une source (CK 74 - 12 août 1992).
 - Saint-Denis Catus : La Brousse, bord droit de la D 12 dans la direction de Peyrilles, une dizaine de plantes (CK 73 - 7 août 1992).
 - Saint-Jean de Laur : sous-bois autour du gouffre de Lantoui ; non fleuri (DK 11 - 27 avril 1994).
- *Helleborus viridis* subsp. *occidentalis*
 - Ussel : combe de Lagasse aux alentours de la D 21 et du ruisseau, en lisière de charmaie ; pas rare sur une distance de 1 500 m environ (CK 73 - 5 mars 1994).
- *Hypericum elodes*
 - Lavercantière : rives de l'étang du Frau (CK 64 - 4 août 1994).
- *Isatis tinctoria*
 - Cabrerets : falaise au nord du village, fleuri, donc identifiable à distance au-dessus des maisons (CK 92 - 29 avril 1994).
 - Luzech : petite route vers l'Impernal et Calvignac à la sortie du village, dans la falaise et sur le bord de la route, en fruits ; assez rare station signalée par R. VIROT et H. BESANÇON le 29 juillet 1977 (CK 62 - 28 mai 1994).
- *Lilium martagon*
 - Saint-Médard : charmaie rive gauche de Vert, à 1 km à l'est du village, nombreuses plantes (CK 63 - 8 juin 1992).
- *Mercurialis huetii*
 - Cabrerets : Vallée de la Sagne, une vingtaine de plantes sur une petite vire calcaire au pied d'une petite falaise qui longe la D 13, avec *Ranunculus gramineus* (CK 83 - 12 mai 1991).
 - Marcilhac-sur-Célé : environ 1 km au sud-ouest du village sur des éboulis grossiers au bord de la D 41 (DK 03 - 29 avril 1994). Ce taxon, peu cité à ma connaissance (une station à Souillac en 1978 : R. VIROT et H. BESANÇON), doit passer facilement inaperçu, car on rencontre couramment dans les Causses du Quercy des milieux favorables.
- *Narthecium ossifragum*
 - Saint-Denis Catus : La Brousse, fossé suintant longeant le côté est de la D 12 ; petite population - en fruit (CK 73 - 7 août 1992).

- *Ornithogalum pyrenaicum*
 - Saint-Médard Catus : Charmaie à 1 km à l'est du village rive gauche du Vert ; assez abondant en sous-bois (CK 73 - 7 août 1992).
 - Saint-Denis Catus : Galdou, quelques pieds au bord de la route qui traverse une chênaie-charmaie près du hameau du Brugas ; longues tiges sèches (CK 73 - hiver 93-94).
- *Osmunda regalis*
 - Saint-Denis Catus : La Brousse, population importante en sous-bois humide : bord est de la D12 (CK 73 - 7 août 1992 - revue en 1994).
- *Piptatherum virescens*
 - Bouzies : vallée du Célé, çà et là sur un talus formé par des éboulis graveleux au pied de la falaise le long de la D 41, 3 km au sud de Cabrerets (CK 92 - 16 mai 1994).
- *Rhynchospora alba*
 - Lavercantière : étang du Frau, abondant (CK 64 - 4 août 1994).
- *Solanum chenopodioides* Lam.
 - Luzech : à la sortie du village, sur la petite route qui monte vers l'Impernal et Calvignac ; station découverte en 1977 par R. VIROT et H. BESANÇON ; la plante se maintient mais n'est pas abondante (CK 62 - 28 mai 1994).

Département du Maine-et-Loire

Contribution de : Serge BRAUD et Michel CHARRIER

- *Corydalis lutea*
 - Bécon-les-Granits : 2 touffes sur un vieux mur (14 mai 1994 ; XT 66).
 - Souzay-Champigny : plusieurs touffes sur un mur en tuffeau (12 juin 1994 ; YT 23).
- *Isopyrum thalictroides*
 - Montjean-sur-Loire : une importante population dans un coteau calcaire boisé, au lieu-dit Châteaupanne ; avec *Doronicum plantagineum* (12 mars 1994 ; XT 64).
- *Lathraea clandestina*
 - Chaudron-en-Mauges : un groupe d'une dizaine de fleurs totalement blanches, le long du ruisseau du Pont-Laurent (2 avril 1994 ; XT 53). Pour cette plante, très commune en Anjou armoricain, c'est le seul cas d'albinisme qu'il nous a été donné d'observer.
- *Lathraea squamaria*
 - Saumur : une population couvrant environ 2 m² dans un coteau boisé (19 mars 1994 ; YT 23). Probablement l'une des stations mentionnées par M. PIRON (1977) dans la "Flore du Saumurois". Semble être à l'heure actuelle la seule connue dans le département.
- *Oxalis acetosella*
 - Chaudron-en-Mauges : 1 pied le long du ruisseau du Pont-Laurent (2 avril 1994 ; XT 53).
 - Noyant-la-Gravoyère : une importante station près de l'étang de la Corbinière (16 avril 1994 ; XT 58) ; localité mentionnée par A. BOREAU (1859).

- *Scilla bifolia*
 - Saumur : très commun sur un coteau boisé en rive sud de la Loire (19 mars 1994 ; YT 23) ; station mentionnée par M. PIRON (1977).
- *Trapa natans*
 - Etang de Passavant-sur-Layon : rare (29 juillet 1994 ; XT 92).
 - Etang de Challain-la-Potherie : peu commun (14 juillet 1994 ; XT 47).

Contribution de : Laurent BUSNEL

- *Bupleurum lancifolium*
 - Parcelle cultivée au nord-est de la Z. I. de Méron vers le lieu-dit "La Perrière". Retrouvé en 1993 et 1994 durant le mois de juin avec Dominique TESSIER et Mme de MEULAN : de 50 à 100 pieds.

Département des Pyrénées-Atlantiques

Contribution de : Michel BOUDRIE

- *Polystichum x illyricum* (*P. aculeatum* x *P. lonchitis*)
 - Rochers calcaires, alt. 1350 m, gorges de la perte du Bitet, vallon du Bitet, Les Eaux-Chaudes (août 1986 !, YN 05).
- *Asplenium trichomanes* L. nothosubsp. *lusaticum* (D.E. Meyer) Lawalrée (*A. trichomanes* subsp. *trichomanes* x subsp. *quadrivalens*)
 - Rochers siliceux, vallée du ruisseau d'Ossiartéa, affluent rive gauche du Bastan, Bidarray (novembre 1985 !, XN 39).

Département des Pyrénées-Orientales (ouest et zones voisines de l'Ariège et de l'Aude)

Contribution de : G. BOSC, Ch. CHAFFIN,
A. TERRISSE (qui a rédigé ces notes), E. VIAUD.

- *Campanula persicifolia* subsp. *subpyrenaica*
 - Prairie en lisière de la forêt de Niave (11, A.T., 15 juillet 1994), au bord de la D 20 ; quelques pieds en mélange avec le type, subsp. *persicifolia*, qui est beaucoup plus abondant ; à une exception près (un calice portant quelques rares soies), ou bien le calice est entièrement glabre (subsp. *persicifolia*), ou bien il est densément hirsute (subsp. *subpyrenaica*).
- *Carex cespitosa*
 - Lors d'une visite (A.T., 19 juillet 1994) à la station découverte l'an dernier (*Bull. S.B.C.O.*, **25**, p. 236) à l'est de Formiguères (mais sur la commune de Matemale), j'ai eu la surprise de voir que cette année les tiges fertiles étaient nombreuses : plusieurs dizaines par touradon. Sans doute faut-il y voir la conséquence des précipitations abondantes de l'hiver dernier, donnant une couche de neige plus épaisse qui subsista plus longtemps ? Une prospection plus complète (A. T., E. V., 15 et 22 août 1994) nous a permis de délimiter, au moins provisoirement, l'aire de ce carex en Capcir :

nous avons rencontré 4 stations importantes (en tout plusieurs hectares) et quelques touradons isolés, sur les pentes de la rive droite de l'Aude (quelques pieds seulement sur la rive gauche, près du pont à l'ouest de la Torre de Creu). La limite nord se situe à 300 m au sud de Vilanova (commune de Formiguères, et la limite sud 400 m au sud de la Torre de Creu (commune de Matemale). L'écart extrême entre les stations est de 2 km environ. (Cf. *Monde des Plantes*, **451**, p. 19).

- *Epipactis palustris*

- Dans le Val de Galbe, au sud - sud-est de la cote 1625, qui correspond au pont près duquel se rejoignent les deux pistes (66, DH 2221, 1630 m, G. B., A. T., E. V., 5 août 1994) : peuplement compact de près de 200 tiges fleuries, dans une mouillère en pente exposée au nord.

Nous avons vainement recherché, par deux fois, cette station découverte il y a une dizaine d'années par Ch. BERNARD et G. BOSCH.

- *Gentianella hypericifolia*

- Au sud du col de Pailhères, sur une pelouse en pente exposée au nord, parmi les touffes de *Vaccinium myrtillus* et de *V. uliginosum* subsp. *uliginosum* et à quelques mètres de *Lycopodium clavatum* (09, DH 1731, 1980 m, Ch. CH., A. T., 27 août 1994).

Cette gentiane annuelle à fleurs blanchâtres est beaucoup plus rare que *G. campestris*, à laquelle elle ressemble beaucoup (on en fait parfois une sous-espèce de cette dernière).

- *Linaria vulgaris*

- Sur la rive nord-ouest de l'étang de Puyvalador (66, DH 2822, 1430 m, A. T., E. V., 17 août 1994).

Cette linaria, si commune dans le Centre-Ouest, si spectaculaire avec ses grandes fleurs d'un jaune soufre qui se remarquent d'autant mieux qu'elles s'épanouissent à une époque tardive, ne figure ni dans l'ouvrage de GAUTIER ni dans les zones "P.-O." et "Ai" du catalogue de GAUSSEN ; l'espèce de ce groupe commune dans la partie orientale des Pyrénées est *L. angustissima* (= *L. italica*). Il est donc possible qu'il s'agisse ici d'une introduction accidentelle et il n'est pas certain que la plante s'y maintiendra.

- *Milium effusum*

- Au sud de l'estany de la Pradella (étang de Pradeilles) (66, DH 1810, 1940 m, A. T., 28 juillet 1994).

Non seulement il ne s'agit pas ici d'une hêtraie, mais même pas d'un sous-bois : les pieds de *M. effusum* sont disséminés parmi les touffes de rhododendrons, sur une pente exposée au nord.

- *Polycnemum arvense*


- Dans la partie la plus aride d'une friche, au lieu-dit Solà de Rigat, au nord d'Osséja (66, DG 1698, 1225 m, G. B., A. T., 29 juillet 1994).

C'est la première fois que je rencontre cette espèce en Cerdagne, où elle n'est indiquée ni par GAUTIER ni par GAUSSEN.

- *Saxifraga clusii* subsp. *clusii*

- Au sud du col de Pailhères, dans les rochers au-dessus d'une plaque de neige (09, DH 1731, 1970 m, Ch. CH., A. T., 27 août 1994).

Cette saxifrage ressemble beaucoup à *S. stellaris* subsp. *alpigena* (GAUTIER



Carex cespitosa. Matemale (Pyrénées-Orientales). 22 août 1994.

En bas : touradons.

En haut, à gauche : tige fructifère.

En haut, à droite : utricule.

(Photographies E. Viaud)



en fait une variété de cette dernière), mais elle est beaucoup plus rare et son écologie est bien différente : fissures de rochers, et non milieux saturés d'humidité.

- *Trigonella polyceratia*

- Pla de Medes, au nord-ouest de Nahuja (66, DG 1698, 1235 m, G. B., A. T., 29 juillet 1994).

La station n'est pas nouvelle (cf. *Bull. S.B.C.O.*, **19**, p.154), mais la plante n'apparaît pas tous les ans, en rapport avec le statut du terrain (cultures alternant avec friches de plusieurs années). Une 2^{ème} visite plus tardive (A. T., E. V., 13 août 1994) a permis de repérer plus facilement les pieds qui étaient alors en grande partie fructifiés : nous en avons vu plusieurs centaines.

Signalons une "approximation" de la flore de FOURNIER : « RRR (0-800 m) : Pyr.-Or. (Cerdagne) » ; or aucun point de la Cerdagne française n'est situé à une altitude inférieure à 1200 m !

Contribution de : Henri MICHAUD et André DENIS

- *Valantia hispida*

- Cases-de-Pène, rive gauche de l'Agly, en direction de Tautavel, avec *Stipa offneri*, *Convolvulus lanuginosus*, *Ononis pubescens*... (Observée avec M. A. BOUCHET et T. MENUT).

Département de la Savoie

Contribution de Patrice LAVOUÉ et Michel ROCHER

- *Orchis spitzelii* subsp. *spitzelii*

- Commune de Jarzy, le 16 juin 1994, à une altitude d'environ 1 500 mètres, sur une station où domine *Laserpitium siler* subsp. *siler*. C'est probablement la première mention pour le département.

Contribution de : Christian MOULINE

- *Chenopodium foliosum* (= *Blitum virgatum* L.)

- Commune d'Aussois : Fort Victor-Emmanuel : quelques individus observés dans les décombres (19 juillet 1994).

Département des Deux-Sèvres

Contributions de : Yves BARON (Y. B.),
Antoine CHASTENET (A. C.) et Patrick GATIGNOL (P. G.)

- *Crucianella angustifolia*

- Site de Griffèrus : Argenton-Château, quelques pieds dans une pelouse acidophile ; 17 avril 1994 ; P. G.

- *Deschampsia media*

- Communal des Boisses : Brioux-sur-Boutonne, quelques touffes dissémi-

nées le long d'un fossé. Station déjà connue d'E. CONTRÉ (compte rendu du 6 juin 1976) ; 7 juillet 1994 ; P. G.

- *Galium boreale*
 - Brûlain, à la Chagnée ; 27 mai 1994 ; Y.B. Cette espèce s'ajoute aux orchidées signalées ici par J.-Cl. GUÉRIN et A. MERLET (cf. *Bull. S.B.C.O.* **25**, p. 241) : *Orchis coriophora* subsp. *coriophora*, *Ophrys apifera* subsp. *apifera*, *O. apifera* subsp. *bicolor* Naegeli, *O. scolopax* subsp. *scolopax*, *Anacamptis pyramidalis*, *Himantoglossum hircinum* subsp. *hircinum*.
- *Inula salicina* subsp. *salicina*
 - Pamproux ; 29 mai 1994 ; A. C. et al..
- *Kickxia cirrhosa*
 - Lande du Bois Moreau : Argenton-Château, quelques pieds de cette espèce protégée sur le plan national dans un chemin parcourant une lande. Nouvelle station très intéressante puisqu'elle fait progresser la limite septentrionale d'environ 200 km ; 3 juillet 1994 ; P. G., A. C. et François BOTTÉ.
- *Lathyrus panonicus* subsp. *asphodeloides*
 - Pamproux avec *Inula salicina* ; 29 mai 1994 ; A. C., Alain LETIENT, Thierry CHERIOT et Michel CAUPENNE.
- *Ophrys fuciflora* subsp. *fuciflora*
 - Pamproux avec *Ophrys fuciflora* x *scolopax*, *Ophrys fuciflora* x *sphegodes*, *Ophrys scolopax* subsp. *scolopax* et *Serapias lingua* ; 29 mai 1994 ; A. C., Alain LETIENT, Thierry CHERIOT et Michel CAUPENNE.
- *Orchis coriophora*
 - Brûlain, à la Chagnée, environ 50 pieds, avec *Ophrys apifera* subsp. *apifera*, *O. apifera* subsp. *bicolor* Naegeli, *O. scolopax* subsp. *scolopax*, *Anacamptis pyramidalis*, *Himantoglossum hircinum* subsp. *hircinum*, *Galium boreale* (sur indication de J.-Cl. GUÉRIN et A. MERLET) ; 27 mai 1994 ; Y. B.
- *Spiranthes spiralis*
 - Pamproux ; 11 septembre 1994 ; Alain LETIENT.

Contribution de : Gaston BONNIN

- *Gratiola officinalis*
 - Clussais-La Pommeraie : en marge N-E de la ZNIEFF et des parcelles concernées par le Conservatoire des Espaces Naturels du Poitou-Charentes. Belles colonies occupant de petites mares rondes au bord d'un chemin de terre. 30 août 1994.
- *Osmunda regalis*
 - Forêt de Secondigny, dans un vaste secteur soumis à des coupes de régénération. Deux nouvelles stations au bord d'un ruisseau. 12 juin 1994 (Sortie du Cercle des Naturalistes), avec : *Anagallis tenella* (ruisseau et micro-tourbières), *Ranunculus omiophyllus* (= *R. lenormandii*), *Eleocharis multicaulis* (f. *viviparis*), *Dryopteris dilatata* (une petite colonie).
- *Polycarpon tetraphyllum*
 - Apparu à Niort, dans mon jardin, en 1990, dans un semis de carottes sous châssis. Au mélange habituel de compost et de terreau du commerce j'avais ajouté un sable gris, très fin, utilisé pour la mise en place des réseaux

souterrains de câbles électriques ou téléphoniques. J'essaierai de trouver l'origine de ce matériau fréquemment employé. Chaque année le Polycarbon revient en force et se montre envahissant jusqu'aux premières gelées sérieuses. Affaire à suivre.

- *Scorzonera laciniata* (= *Podospermum l.*)
 - Clussais-La-Pommeraiie. Partie haute du chemin à Gratiolle, 3 spécimens de cette espèce, connue pour être polymorphe, présentent des tiges multiples et des petits capitules mais les feuilles de la base sont exactement conformes à celles du type. Station inédite. L'abbé GUYON l'avait signalé, en 1860, à Messé, à une dizaine de km à l'est de Clussais.
- *Xeranthemum cylindraceum*
 - Bougon, bords du chemin marneux qui accède aux "Chaumes de Gandomé" 5 pieds. Station inédite. 20 juillet 1994.

Contribution de : J.-C. GUÉRIN, J.-M. MATHÉ, A. MERLET

- *Ophrys fusca* subsp. *fusca*
 - Chaumes de Gandomé (Cne de Bougon), YS 23, environ 10 pieds (5 juin 1994).
- *Orchis laxiflora* subsp. *palustris*
 - Prairies de Chevais (Cne de Clussais-la-Pommeraiie), BM 73, 20 pieds, avec *Orchis laxiflora* subsp. *laxiflora* (plus de 100 pieds) et *Dactylorhiza incarnata* subsp. *incarnata* (29 mai 1994).
- *Serapias lingua*
 - Chaumes de Gandomé (Cne de Bougon), YS 23, environ 20 pieds (5 juin 1994).

Contribution de : B. TOUSSAINT
(botaniste au Parc Naturel Régional du Marais Poitevin
d'octobre 1991 à février 1995)

- *Lathyrus pannonicus* subsp. *asphodeloides*
 - Saint-Georges-de-Rex : "La Chaume du Gazon". Accotement fauché, en limite du marais des Mottes. Une vingtaine de pieds. 22 avril 1994. XS 82.
- *Lemna minuta* Humb., Bonpl. et Kunth (= *L. minuscula*)
 - Abondant dans les marais de la Venise Verte.
- *Ludwigia peploides*
 - (Voir note concernant cette espèce en contribution pour la Vendée). Dans la Venise Verte, je l'ai notée sur les communes du Vanneau et d'Arçais, mais elle existe probablement aussi, en amont, sur les communes de Coulon et Magné. Elle est présente également à Saint-Hilaire-la-Palud.

Département de la Vendée

Contribution de : Serge BRAUD et Michel CHARRIER

- *Chrysosplenium oppositifolium*
 - Mallièvre : une belle station en rive gauche de la Sèvre (28 mars 1994 ; XS 69).

- *Dryopteris affinis* subsp. *borreri*
 - Saint-Hilaire-de-Mortagne (commune de Mortagne-sur-Sèvre), lieu-dit "Rochard", vallée de la Sèvre : rare (juillet 1994 ; XT 50).
 - Saint-Laurent-sur-Sèvre, au viaduc de Barbin : 2 pieds (juillet 1994 ; XT 50).
- *Fritillaria meleagris* subsp. *meleagris*
 - Mallièvre, vallée de la Sèvre : rare (28 mars 1994 ; XS 69).
- *Osmunda regalis*
 - La Verrie, ruisseau "Le Blanc" : 1 pied (mai 1994 ; XT 50).
- *Oxalis acetosella*
 - Mallièvre, vallée de la Sèvre : 2 stations (28 mars 1994 ; XS 69).

Contribution de : B. TOUSSAINT
(botaniste au Parc Naturel Régional du Marais Poitevin
d'octobre 1991 à février 1995)

- *Abutilon theophrasti*
 - Damvix : "Marais communal". Déblais de terre. Quelques pieds. 15 septembre 1992. XS 73.
- *Achillea ptarmica*
 - Saint-Benoist-sur-Mer : "Les Prés de la Claye". Prairie humide. 14 juin 1993. XS 24.
- *Adonis annua* subsp. *annua*
 - Champagné-les-Marais : "Les Grainetières". Moissons. Quelques pieds. 15 juillet 1993. XS 43.
 - Saint-Michel-en-l'Herm : "Les Chauds". Bord d'une charrière, sur bri subsaumâtre. Un pied. 10 mai 1993. XS 33.
- *Aira caryophyllea* s. l.
 - Triaize : "La Joyeuse". Prairie méso-hygrophile sub-halophile de fauche. 2 juin 1992. XS 34.
- *Ajuga chamaepitys* subsp. *chamaepitys*
 - Chaillé-les-Marais : "Chaillezay". Pelouse calcaire pâturée par des ovins. 29 avril 1992. XS 54.
- *Althaea cannabina*
 - Auzay : "La Garenne Aujard". Talus calcaire. 29 août 1994. XS 64.
 - Sérigné. Talus calcaire au bord de la D23, à l'ouest du village. 18 juillet 1992. XS 65.
 - Le Gué de Velluire. Accotement calcaire au nord du village, vers Velluire (D65). 29 août 1994. XS 63.
 - Vix : "Les Terrières". Coteau calcaire. 22 juin 1993. XS 63.
- *Apium inundatum*
 - Triaize : "Dixmérie". Assez abondant dans une dépression humide d'une prairie sub-halophile. 10 juin 1993. XS 34.
 - Triaize : "Marais communal". Même écologie que la population précédente. 14 juin 1993. XS 34.
 - Moreilles : "Ruines de Mirandes". Même écologie que les deux populations précédentes. 9 juin 1993. XS 44.

- *Baccharis halimifolia*
 - Champagné-les-Marais : "La Loge". Un pied dans une parcelle labourée en friche. Il s'agit, à ma connaissance, de la première station de cette espèce à l'intérieur du Marais Poitevin. Elle est abondante sur le littoral de la Haute-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer. 30 août 1994. XS 43.
- *Bupleurum tenuissimum* subsp. *tenuissimum*
 - Grues : "Les Prés de la Louraye". Prairie sub-halophile. Cette ombellifère discrète est plus fréquente à l'ouest, dans les marais d'Angles-Longeville, La Tranche-sur-Mer. 3 mars 1992. XS 24.
 - Les Magnils Reigniers : "Le Booth Bourdin". 8 septembre 1993. XS 34.
- *Calendula arvensis*
 - Chaillé-les-Marais. Zone rudéralisée, sur le coteau calcaire. Août 1992. XS 54.
 - Pissotte : "Les Perrottes". Limite communale Fontenay-le-Comte/Pissotte, dans les terrains d'une pépinière. Septembre 1994. XS 64.
 - Fontenay-le-Comte. Parterre de la clinique vétérinaire. Août 1994. XS 64.
- *Callitriche truncata* subsp. *occidentalis*
 - Grues : "Les Prés de la Louraye". Abreuvoir. Juin 1992. XS 24.
 - Saint-Michel-en-l'Herm "Les Chauds". Abreuvoir. 19 juin 1992. XS 33.
 - Triaize : "La Cabane Neuve". Fossé subsaumâtre à *Myriophyllum spicatum*. 23 juillet 1993. XS 34.
 - Maillezais : "Les Prises". 27 mai 1994. XS 73.
 - Nieul-sur-l'Autize. Dans l'Autize. 29 juin 1993. XS 74.
- *Campanula glomerata* subsp. *glomerata*
 - Saint-Hilaire-des-Loges. Coteau calcaire à l'est de la ferme de Sanguin (limite communale). Quelques pieds, en ourlet, entre une prairie sèche pâturée et un fourré d'épineux (protégés par une clôture). 29 juin 1993. XS 74.
- *Cardamine parviflora*
 - Les Magnils Reigniers : "Les Hautes Routes de Beugné". Mai 1992. XS 34.
 - Luçon : "Chanteloup". 7 mai 1993. XS 34.
 - Triaize : "La Joyeuse". Mai 1992. XS 34.
 - Triaize : "Les Morinières". 6 mai 1993. XS 33.
 - Triaize : "Dixmérie". Mai 1992. XS 34.
 - Luçon. Marais entre la base de loisirs et le Canal de Luçon. Mai/juin 1992 et 1993. XS 44.
 - Luçon : "Le Pont à Didot". 12 mai 1993. XS 44.
 - Champagné-les-Marais : "Le Farcin". 12 mai 1993. XS 44.
 - Champagné-les-Marais : "Bellevue". 10 mai 1993. XS 43.
 - Moreilles : "Ruines de Mirandes". 9 juin 1993. XS 44.
 - Moreilles : "Sainte-Foix". 10 juin 1993. XS 44.
 - Puyravault : "La Colomberie". Mai 1993. XS 43.
 - Maillé : "Sainte-Germaine". 4 mai 1994. XS 73.
 - Maillé : "La Grande Bernegoue, l'Ouilette". 4 mai 1994. XS 73.
 - Maillezais : "Anchais, Marais des Fours". Mai 1994. XS 63.
 - Saint-Vincent-sur-Graon : "Marais de Marigny". Mai 1993. XS 34.
 - La Bretonnière : "Marais des Vaches". 19 mai 1993. XS 34.
- *Carduncellus mitissimus*
 - Maillezais : "Bel-Orient". 9 juillet 1993. XS 73.

Signalé non loin de là, au tout début de ce siècle, par Th. BLANCHARD (*Bul.*

de la Soc. Bot. des Deux-Sèvres, **14**, 1902) et considéré depuis comme disparu de Vendée. J'ai retrouvé une station de quelques dizaines de pieds, sur une petite pelouse calcaire, en contrebas de la route de Bel-Orient, avec *Teucrium montanum*, *Festuca marginata* (Hachel) K. Richter s. l., *Inula montana* et d'autres calcicoles rares en Vendée. Le site vient d'être notifié en ZNIEFF.

- *Carex divisa*
 - Benet : "Sainte-Christine, Marais des Vachères". Prairie tourbeuse. Une colonie de quelques m².
 - Cette espèce, très abondante dans les marais subsaumâtres occidentaux du Marais Poitevin (jusqu'aux environs de Maillezais), est très rare dans sa partie tourbeuse (Venise Verte). Mai 1994. XS 73.
 - La Couture : "Les Pacaudières". Prairie alluviale de la vallée du Lay. Station éloignée de l'aire continue de distribution locale de l'espèce. On ne la retrouve en aval qu'au sud de la D 949, exception faite du communal de la Claye. 18 mai 1993. XS 35.
- *Carex vesicaria*
 - Le Champ-Saint-Père : "Marais de la Gîte du Bougré". Quelques m² dans une prairie humide. Juin 1992. XS 35.
 - Saint-Vincent-sur-Graon : "Marais de Marigny". Fossé atterri. 10 juin 1992. XS 34.
- *Carthamus lanatus* subsp. *lanatus*
 - Chaillé-les-Marais : "Chaillezay". Pelouse calcaire pâturée par des ovins. Octobre 1991. XS 54.
 - Saint-Vincent-sur-Graon : "Marigny". Coteau calcaire. 2 juillet 1992. XS 24.
- *Centaurea cyanus*
 - Sérigné : "Pont Martin". Une dizaine de pieds sur un talus calcaire, en face de la ferme de Pont Martin. Juillet 1992. XS 65.
- *Cerastium dubium*

L'espèce est relativement abondante dans les prairies humides douces ou sub-halophiles des marais de la Bretonnière, Marigny (Saint-Vincent-sur-Graon), Curzon, Grues, Les Magnils Reigniers, Saint-Denis-du-Payré, Triaize, Luçon, Champagné-les-Marais, Moreilles, Sainte-Radegonde-des-Noyers. XS 24, XS 34, XS 35, XS 43, XS 44, XS 54.

Elle se raréfie très fortement vers l'est.

 - Maillé : "Sainte-Germaine". 4 mai 1994. XS 73.
- *Ceratophyllum submersum*
 - Saint-Denis-du-Payré : "Pré Rond". Abreuvoir. 14 mai 1992. XS 34.
 - Saint-Michel-en-l'Herm. Abreuvoir, dans le marais au nord de la laiterie. 27 mars 1992. XS 33.
 - Champagné-les-Marais. Abreuvoir, dans un ancien marais salant au sud de "La Charrie". 22 septembre 1993. XS 43.
- *Cirsium eriophorum*
 - Saint-Martin-des-Fontaines : "La Grange". 16 août 1992. XS 65.
- *Crepis pulchra*
 - Sérigné : "Coutigny". Talus calcaire. 1^{er} juin 1992. XS 65.
- *Cuscuta scandens* Brot. subsp. *scandens* var. *bidentis* (Berthiot) Kerguelen (= *C. australis* var. *bidentis*).
 - La Ronde : "Le Passage de la Ronde". Berge, en bordure d'un champ de maïs.

- 20 août 1992. XS73.
- *Dactylorhiza incarnata*
 - Benet : "Aziré". Abondant dans une prairie humide, en limite plaine-marais. 10 mai 1994. XS 73.
 - *Damasonium alisma*
 - La Bretonnière : "Marais des Vaches". Quelques pieds. 12 juin 1992. XS 35.
 - La Claye : "Marais communal". Assez abondant, en deux endroits piétinés humides. 14 juin 1993. XS 34.
 - Saint-Vincent-sur-Graon : "Marais de Marigny". Dans un fossé atterri, près de la rivière Margot. 21 juin 1993. XS 34.
 - Grues : "Les Frais". Vase asséchée d'une tonne de chasse. Juin 1994. XS 24.
 - Triaize : "Marais communal". 14 juin 1993. XS 34.
 - *Elatine macropoda*
 - Découvert par P. DUPONT en 1993, sur la "Réserve naturelle M. Brosselin", de Saint-Denis-du-Payré. Je l'y ai observé en 1994 en deux endroits, sur la vase exondée du plan d'eau principal. 1^{er} juillet 1994. XS 34.
 - *Elodea nuttallii*
 - Sainte-Radegonde-des-Noyers, Canal du Clain. 12 juillet 1993. XS 54.
 - Très abondant dans les canaux et fossés des marais de la Vieille Autize (Bouillé-Courdault, Benet, Saint-Sigismond...). Mai 1994. XS 73, XS 83.
 - *Erigeron karvinskianus*
 - Fontenay-le-Comte. Abondamment naturalisé sur les murs bordant la rivière Vendée, au centre ville. 23 avril 1994. XS 64.
 - *Euphorbia palustris*
 - Fontaines : "Les Grands Marais". Un pied, en bordure d'une peupleraie. 21 avril 1994. XS 64.
 - *Festuca marginata* (Hachel) K. Richter s. l.
 - Maillezais : "Bel-Orient". Pelouse calcaire ouverte sur une micro-falaise, en contrebas de la route vers Bel-Orient. 9 juillet 1993. XS 73.
 - *Fritillaria meleagris* subsp. *meleagris*
 - Saint-Cyr-des-Gâts : "Le Défend". Forêts et prairies alluviales de la Smagne. 29 mars 1992. XS 65.
 - *Galeopsis ladanum*
 - Saint-Cyr-des-Gâts : "Le Champ Pouilloux". Talus siliceux sec au bord d'une route. 2 août 1992. XS 65.
 - Il s'agit bien de *G. ladanum* au sens de *FLORA EUROPAEA*. C'est, à notre connaissance, **la première mention de ce taxon dans le Centre-Ouest.**
 - *Glaux maritima*
 - Triaize : "Les Grands Morvents". Prairie sub-halophile (***Alopecuro - Juncetum***). 10 juin 1993. XS 34.
 - *Gratiola officinalis*
 - La Bretonnière : "Marais des Vaches". 19 mai 1993. XS 34.
 - Le Champ-Saint-Père : "La Rintruère". 18 mai 1993. XS 35.
 - Saint-Vincent-sur-Graon. Abondant dans plusieurs prairies de la vallée du Graon et du marais de Marigny. Mai 1993. XS 25 et XS 34.
 - Saint-Benoist-sur-Mer : "Les Chaintres". Une petite station dans une prairie humide. 24 mai 1993. XS 24.

- Luçon. Prairie sub-halophile humide, en bordure de la D 746, au nord des Fontenelles. Juin 1993. XS 44.
- *Hyoscyamus niger*
 - Triaize. Quelques pieds sur un remblai à rudérales, dans l'ancien marais salant. 23 juin 1993. XS 43.
- *Hypericum androsaemum*
 - Saint-Cyr-des-Gâts : "Le Défend". Berge de la Smagne. 6 juin 1992. XS 65.
- *Hypericum elodes*
 - Saint-Cyr-des-Gâts : "Le Chêne-Tors". Rive sablonneuse exondée d'un étang. 6 septembre 1992.
- *Inula britannica*
 - Le Champ-Saint-Père : "La Rintruère". Prairie naturelle humide dulcicole. 10 juin 1993. XS 25.
 - Saint-Vincent-sur-Graon : "Les Aires". Prairie de la vallée du Graon. 21 mai 1993. XS 25.
 - Saint-Vincent-sur-Graon : "Marais de Marigny". Prairies dulcicoles. 1 juin 1993. XS 34.
 - Grues : "Près de la Louraye". Prairie sub-halophile. 15 juillet 1993. XS 24.
 - Triaize : "La Grenouillère". Prairie sub-halophile. 26 juillet 1993. XS 33.
 - Triaize : "Marais communal". Prairie sub-halophile. 14 juin 1993. XS 34.
 - Triaize : "Les Bosses". Prairie sub-halophile. 11 juin 1993. XS 34.
 - Luçon. Noté dans trois prairies sub-halophiles des marais entre la base de loisirs et le Canal de Luçon. Juin 1993. XS 44.
- *Inula helenium*
 - Moreilles : "Ruines de Mirandes". Quelques dizaines de pieds au bord d'une charrière. 19 juillet 1994. XS 44.
 - Champagné-les-Marais. Accotement routier entre le Canal de Vienne et la ferme de Prédeville. 26 juillet 1993. XS 43.
 - Maillezais : "Marais de la Bourse de Chay". Sur la levée de la Ceinture de la Bourse de Chay. 13 juillet 1994. XS 73.
 - Saint-Pierre-le-Vieux : "La Grande Cabane". Une petite station sur un accotement. 3 juin 1994. XS 64.
- *Inula montana*
 - Maillezais : "Bel-Orient". Un pied, sur une micro-falaise calcaire à *Festuca marginata* (Hachel) K. Richter, en contrebas de la route de Bel-Orient. Au début de ce siècle, l'espèce était signalée très abondante dans ce secteur par Th. BLANCHARD (voir note sur *Carduncellus*). 9 juillet 1993. XS 73.
- *Inula salicina* subsp. *salicina*
 - Saint-Hilaire-la-Palud : "Les Prises de l'Île-Bapaume". Pelouse sur marne en bordure du marais, avec *Filipendula vulgaris* et *Scirpus holoschoenus*. Cette intéressante pelouse a été labourée en 1994 ! Il s'agissait sans doute d'un individu du **Blackstonio-Silaetum**. 2 septembre 1993. XS 72.
- *Legousia speculum-veneris*
 - Damvix : "La Devise". Accotement décapé de sa terre végétale de la D 25. Un pied. Juin 1994. XS 73.
- *Lemna minuta* Humb., Bonpl. et Kunth (= *L. minuscula*)
 - Abondant dans les marais mouillés ou desséchés doux ou très faiblement saumâtres.

- *Lepidium latifolium*
 - Grues. Bord d'un fossé longeant la route vers la ferme de la Louraye. 7 juillet 1992. XS 24.
 - Triaize. Route des Prises, au nord de la Digue des Balises. 23 juin 1993. XS 33.
- *Lotus angustissimus*
 - Grues : "La Louraye". Prairie naturelle, sur un ancien dépôt sablonneux éolien (ou marin ?). 27 mai 1992. XS 24.
- *Ludwigia peploides*

En extension rapide depuis quelques années dans le Marais Poitevin. P. DUPONT a déterminé pour la première fois *L. uruguayensis* (= *L. grandiflora*) sur l'Île de Charrouin (Vix) en 1988 (où elle avait été volontairement introduite dans un étang quelques années auparavant).

Aujourd'hui, c'est *L. peploides* qui est observée dans le marais mouillé, un peu partout le long de la Sèvre Niortaise et de ses canaux et fossés voisins, de Niort à l'estuaire.

En Vendée, l'espèce est particulièrement abondante sur la commune de Damvix et, dans une moindre mesure, sur les communes de Maillé et Le Mazeau (septembre 1993).
- *Marrubium vulgare*
 - Maillezais. Parking du site de l'Abbaye. Un pied vigoureux. 17 juillet 1992. XS 73.
- *Marsilea quadrifolia*

L'unique localité de cette espèce (protégée en France) dans le Marais Poitevin, près du camping du Port de Moricq (Angles, XS 13), est connue de longue date. En 1992, *Marsilea* y était très abondant. Je ne l'y ai pas observé en 1993 et seuls quelques pieds, bien malingres, ont pu être repérés en 1994, sur la vase exondée.

Espérons que la quasi disparition de l'espèce lors de ces deux dernières années n'est que le fait d'événements climatiques défavorables ou de la gestion du niveau d'eau dans le canal incompatible avec le développement de *Marsilea* et non le prémice de sa complète et irréversible disparition du Marais Poitevin.

Notons encore que *Nymphoides peltata*, qui lui était associé dans la station, n'a été revu lors d'aucune de nos visites.
- *Melilotus altissima*
 - Les Magnils Reigniers. Charrière, à l'est du marais communal. Un pied. 21 juillet 1993. XS 34.
- *Moenchia erecta* subsp. *erecta*
 - Saint-Denis-du-Payré : "Source de la Bonne Mort". Prairie humide sub-halophile. 24 avril 1992. XS 34.
- *Myosotis sicula*

Identifié par J. LAMBINON (Univ. de Liège), sur le marais communal du Poiré-sur-Velluire, dans le groupement hygrophile à *Ranunculus ophioglossifolius* et *Oenanthe fistulosa*. Nous avons récolté d'autres myosotis du groupe *cespitosa*, afin de déterminer l'abondance de *Myosotis sicula* dans le Marais Poitevin. 3 juin 1992. XS 54.

- *Myosurus minimus*
 - Triaize : "La Joyeuse". Zone humide piétinée, à l'entrée de deux parcelles. 2 juin 1992. XS 34.
 - Moreilles : "Sainte-Foix". Charrière. 10 juin 1993. XS 44.
- *Odontites jaubertiana* subsp. *jaubertiana*
 - Chaix. Talus, en bordure de la D 938 ter et d'une friche calcicole. 14 septembre 1993. XS 64.
 - Vix : "Les Terrières". Coteau calcaire, près du terrain de moto-cross. Juin 1993. XS 63.
- *Orchis ustulata*
 - Saint-Sigismond : "Le Coudreau, l'Angle Petit". Une dizaine de pieds fleuris, dans une prairie en bordure du marais. 13 avril 1994. XS 73.
- *Orobanche hederarum*
 - Maillezais. Mur envahi de lierre, à l'entrée de l'abbaye. 30 mai 1992. XS 73.
- *Pedicularis sylvatica* subsp. *sylvatica*
 - Saint-Cyr-des-Gâts : "Les Basses Vallées". Accotement siliceux sec à *Erica cinerea* et *E. ciliaris*. 12 avril 1993. XS 65.
- *Petasites fragrans*
 - L'Île d'Elle : "Soulisse". Naturalisé sur le coteau calcaire. 7 janvier 1994. XS 53.
- *Potamogeton bertholdii*
 - Champagné-les-Marais : "Beaumont". 12 juillet 1993. XS 44.
 - Moreilles : "Pont de Broc". Canal de Vienne. 12 juillet 1993. XS 44.
- *Potamogeton coloratus*
 - Benet : "Marais de Lesson". Petit fossé atterri, dans un bas-marais alcalin. Il s'agit de la première donnée récente de présence de l'espèce dans la partie vendéenne du Marais Poitevin.
- *Pulicaria vulgaris*
 - Saint-Benoist-sur-Mer : "Près de la Claye". Berge pâturée du Petit Lay. Octobre 1991. XS 24.
 - Triaize : "Dixmérie". Bord d'un abreuvoir. Septembre 1993. XS 34.
- *Ranunculus ophioglossifolius*
 - La Couture : "Les Pacaudières". Prairie alluviale de la vallée du Lay. Station isolée de l'aire principale de l'espèce dans cette partie du Marais Poitevin. Elle est déjà relativement plus fréquente en aval, dans le Marais de Marigny (Saint-Vincent-sur-Graon) et je l'ai notée deux fois dans le Marais des Vaches (La Bretonnière). 18 mai 1993. XS 35.
 - Maillé "Sainte-Germaine, l'Ouilette". 4 mai 1994. XS 73.
- *Rorippa sylvestris* subsp. *sylvestris*
 - Saint-Vincent-sur-Graon : "Marais de Marigny". Dans une dépression humide d'une prairie. 10 juin 1992. XS 34.
- *Rosa agrestis*
 - Maillezais : "Bel-Orient". Un pied, au bord de la route, à l'entrée de la pelouse à *Carduncellus mitissimus*. 16 mai 1994. XS 73.
- *Sagittaria sagittifolia*
 - Saint-Vincent-sur-Graon : "Marais de Marigny". Un pied stérile. 9 octobre 1991. XS 34.
 - Liez : "Le Garoussou, ruisseau des Vieux Moulins". 13 juin 1994. XS 73.

- *Salicornia ramosissima*
 - Triaize "Communal des Claires". Station la plus interne dans le Marais Poitevin. 15 juin 1993. XS 44.
- *Scandix pecten-veneris* subsp. *pecten-veneris*
 - Saint-Pierre-le-Vieux : "Le Raseur". Talus calcaire. 5 avril 1994. XS 74.
- *Sedum cepaea*
 - Saint-Cyr-des-Gâts. Vieux mur, au bord de la route vers Bâtion (Marsais). 11 juillet 1992. XS 65.
- *Sedum rubens*
 - Saint-Cyr-des-Gâts. Vieux mur, au bord de la route vers Bâtion (Marsais). 11 juillet 1992. XS 65.
- *Spiranthes spiralis*
 - Saint-Denis-du-Payré : "Réserve naturelle M. Brosselin". Quelques pieds dans une prairie méso-hygrophile sub-halophile. 8 octobre 1992. XS 34.
 - Vouvant. Des centaines de pieds, sur des remblais recouverts d'une pelouse ouverte, près du barrage à l'ouest du village. 6 septembre 1992. XS 76.
- *Stellaria palustris*
 - La Bretonnière : "Le Perthuis". Quelques pieds, dans une prairie humide (déjà signalé dans le secteur lors de l'étude de la S.B.C.O., en 1982). 1^{er} juin 1993. XS 35.
- *Teucrium montanum*
 - Maillezais : "Bel-Orient". Micro-falaise calcaire à *Festuca marginata* (Hackel) K. Richter et *Inula montana*, en contrebas de la route de Bel-Orient. Quelques pieds. 9 juillet 1993. XS 73.
- *Teucrium scordium* s. l.
 - Champagné-les-Marais : "La Vergne". Fossé atterri. Juillet 1993. XS 44.
 - Sainte-Radegonde-des-Noyers : "La Petite Vendée". Berge d'un fossé. 7 juillet 1992. XS 54.
- *Tragus racemosus*
 - L'Île d'Elle. Naturalisé sur la voie ferrée et ses abords. 17 août 1992. XS 53.
- *Trifolium patens*
 - Nalliers : "Bot Neuf". Talus herbeux en marais inondable. 23 juin 1993. XS 44.
- *Vicia lutea* subsp. *lutea*
 - Saint-Cyr-des-Gâts : "Riblavet". Talus herbeux. 20 juin 1992. XS 65.
 - Le Champ-Saint-Père : "Le Terrier du Platane". Friche. 30 juillet 1993. XS 35.
- *Xeranthemum cylindraceum*
 - Le Champ-Saint-Père : "Terrier du Platane". Talus sec, au bord du chemin longeant la voie ferrée. 30 juillet 1993. XS 35.

Département de la Vienne

Contributions de : Yves BARON (Y. B.),
Antoine CHASTENET (A. C.) et Patrick GATIGNOL (P. G.)

- *Anagallis arvensis* var. *carnea*
 - Plan d'eau de Saint-Cyr. Abondante depuis plusieurs années sur les rives graveleuses d'un plan d'eau. Cette espèce, outre sa coloration, est reconnaissable à ses grandes corolles ; 29 juin 1994 ; P. G.

- *Anagallis minima*
 - Forêt de Moulière, plusieurs stations ; juin 1994 ; A. C.
- *Briza minor*
 - Le Vigeant, à la Pierre Brune, friche en limite d'un champ et du C.E.T. (messicole en grande raréfaction), avec *Misopates orontium*, *Lythrum hyssopifolia*, *Lobelia urens* ; 4 juillet 1994 ; Y. B.
- *Bupleurum baldense* subsp. *baldense* (= *B. aristatum*)
 - La Bussière ; 14 mai 1994 ; A. C., Y. B., P. G. et la S.B.C.O.-86.
- *Campanula erinus*
 - Béruges ; 28 mai 1994 ; A. C., P. G. et la S.B.C.O.-86.
 - Cissé, Peu-Blanc, friche bordant la N 148b ; 12 juin 1994 ; Y. B.
- *Campanula persicifolia* subsp. *persicifolia*
 - Lussac-les-Châteaux, talus de la D 749 ; 18 mai 1994 ; Y. B.
- *Carex disticha*
 - Montreuil-Bonnin avec *Carex elata* subsp. *elata* ; 28 mai 1994 ; P. G., A. C. et la S.B.C.O.-86.
- *Carex lepidocarpa*
 - Montreuil-Bonnin ; 28 mai 1994 ; A. C.
- *Carex pendula*
 - Ouzilly-Vignolles, bord de la Dive, à Sauzeau ; 11 juillet 1994 ; Y. B.
- *Carex rostrata*
 - Forêt de Moulière ; 17 juin 1994 ; A. C.
- *Centaurea aspera* subsp. *aspera*
 - Forêt de Vouillé ; 12 août 1994 ; A. C.
- *Cicendia filiformis*
 - Pare-feux de la forêt de Moulière avec *Scleranthus annuus* subsp. *polycarpus* ; 8 juillet 1994 ; A. C.
- *Dactylorhiza elata* subsp. *sesquipedalis*
 - Marçay, la Rigaudière, diverses variétés, avec *Orchis laxiflora* subsp. *laxiflora* ; 21 mai 1994 ; Y. B.
- *Epilobium montanum*
 - Forêt de Moulière (Zone du Grand Recoin), quelques pieds dans un chemin forestier ; 9 juin 1994 ; P. G.
- *Epipactis microphylla*
 - Forêt de Moulière ; 1 juin 1994 ; A. C.
- *Erica vagans*
 - Forêt de Moulière ; 24 juin 1994 ; A. C.
- *Euphorbia seguierana* subsp. *seguierana*
 - Roches-Prémarie, les Rochereaux ; 17 juin 1994 ; Y. B.
- *Euphorbia serrulata* (= *E. stricta*)
 - Ouzilly-Vignolles, bord de la Dive, près de Sauzeau ; 11 juillet 1994 ; Y. B.
- *Exaculum pusillum*
 - Pare-feux de la forêt de Moulière avec *Scleranthus annuus* subsp. *polycarpus* ; 8 juillet 1994 ; A. C.
- *Galium odoratum*
 - Forêt de Moulière, plusieurs stations ; 1 juin 1994 ; A. C.
- *Hippuris vulgaris*
 - Saint-Maurice la Clouère, lors de la session des micromycètes ! ; 12 juin 1994 ; A. C.

- *Hordelymus europaeus*
 - Forêt de Moulière ; 1 juin 1994 ; A. C.
- *Hottonia palustris*
 - Forêt de Moulière, plusieurs stations ; 1 juin 1994 ; A. C.
- *Hypericum androsaemum*
 - Forêt de Moulière, plusieurs stations ; juin 1994 ; A. C.
- *Inula montana*
 - La Bussière, à la Maçonnière, avec *Fumana procumbens*, *Linum tenuifolium*, *Medicago orbicularis*, *Bupleurum baldense* subsp. *baldense* ; 14 mai 1995 ; Y. B., et la S.B.C.O.-86.
- *Lathraea squamaria*
 - Coteau face au bois de la Berge-Sommières du Clain, quelques pieds sur une pente boisée ; 7 avril 1994 ; P. G.
- *Lathyrus nissolia*
 - Sanxay dans une ancienne marnière ; 29 mai 1994 ; A. C.
 - Chemin près du Pinail ; 24 juin 1994 ; A. C.
- *Lathyrus tuberosus*
 - Vouneuil-sur-Vienne ; 26 juin 1994 ; A. C.
- *Linum strictum* L. subsp. *strictum*
 - Béruges, coteau de la Bourdillère, 2^{ème} station de la Vienne ; 28 mai 1994 ; A. C., Y. B., P. G. et la S.B.C.O.-86.
- *Ludwigia peploides*
 - Sainte-Radegonde, mare à Cenau ; 21 mai 1994 ; Y. B.
- *Misopates orontium*
 - Le Vigeant, la Pierre-Brune ; 4 juillet 1994 ; Saint-Benoît, chemin de la Fauquerie ; 31 août 1994 ; Y. B.
- *Narcissus poeticus* subsp. *poeticus*
 - Ayron, au bord de la Vendelogne. Cette station insolite pose la question de son origine ; 2 avril 1994 ; A. C.
- *Odontites jaubertiana* subsp. *jaubertiana*
 - Maillé ; 16 septembre 1994 ; A. C.
- *Orchis militaris*
 - Roches-Prémarie, à Pouzac, un seul pied, 4^{ème} station pour la Vienne, avec *Orchis morio* subsp. *morio*, *O. ustulata* (abondant), *Aceras anthropophorum*, *Himantoglossum hircinum* subsp. *hircinum*, *Ophrys apifera* subsp. *apifera*, *O. sphegodes* subsp. *sphegodes*, *Astragalus glycyphyllos*, *Veronica prostrata* subsp. *scheereri* ; 5 mai 1994 ; Y. B.
- *Pilularia globulifera*
 - Forêt de Moulière, plusieurs stations ; juin 1994 ; A. C.
- *Radiola linoides*
 - Forêt de Moulière, plusieurs stations ; juin 1994 ; A. C.
- *Ranunculus aquatilis*
 - Découverte par T. ANTON dans de nombreuses mares du Pinail. Curieusement cette espèce ne semble pas avoir été mentionnée auparavant. Réserve du Pinail, Vouneuil-sur-Vienne ; 12 avril 1994 ; P. G.
- *Ranunculus trichophyllus* subsp. *trichophyllus*
 - Landes du Pâtural des chiens - Champagné Saint-Hilaire, abondante dans un fossé rempli d'eau en compagnie d'*Alisma lanceolatum* ; 7 mai 1994 ; P. G.

- *Rubus idaeus*
 - Forêt de Moulière ; 6 juin 1994 ; A. C.
- *Scirpus holoschoenus*
 - Plan d'eau de Saint-Cyr. Une touffe sur la rive d'un plan d'eau certainement apportée ici par les pèlerinages des véliplanchistes ; 29 juin 1994 ; P. G.
- *Scirpus maritimus* subsp. *maritimus*
 - Etang d'Ayron ; 10 septembre 1994 ; A. C., Y. B. et M. MORINEAU.
- *Senecio aquaticus* s. l.
 - Prairie de Montreuil-Bonnin. Quelques pieds de cette espèce qui était présumée disparue du département. Il pourrait s'agir ici de la sous-espèce *barbareifolius* mais des critères intermédiaires avec la sous-espèce *aquaticus* n'ont pas permis d'assurer la détermination ; 14 juin 1994 ; P. G.
- *Simethis planifolia*
 - Forêt de Moulière ; 5 juillet 1994 ; Alain LETIENT.
- *Sisymbrella aspera* subsp. *aspera*
 - Brion, bois de l'Eau, avec *Inula salicina* subsp. *salicina*, *Euphorbia brittingeri*, *Gymnadenia conopsea*, *Ophrys insectifera* ; 26 mai 1994 ; Y. B.
- *Sparganium minimum*
 - Sanxay dans une ancienne marnière ; 29 mai 1994 ; A. C.
- *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata*
 - Château-Larcher, plateau des Chaumes, avec *Arenaria controversa* (localisé), *Bombacillaena erecta*, *Bupleurum baldense* subsp. *baldense*, *Fumana procumbens*, *Gastroidium ventricosum*, *Geranium sanguineum*, *Helianthemum salicifolium*, *Trifolium scabrum*, *T. striatum*, *Veronica prostrata* subsp. *scheereri* (cf. C.R. sortie S.B.C.O.) ; 22 avril 1994 ; 17 juin 1994 ; 26 juin 1994 ; Y. B.
- *Stachys alpina*
 - Lusignan (importante station) ; 18 mai 1994 ; A. C.
 - Brin à Latillé ; 6 juin 1994 ; A. C. et P. G.
- *Stachys palustris*
 - Prairie de Montreuil-Bonnin, très abondant avec *Juncus subnodulosus*, *Oenanthe fistulosa*, dans une prairie humide ; 14 juin 1994 ; P. G.
- *Teucrium botrys*
 - Ensoulesse, un pied dans un champ cultivé ; 17 novembre 1994 ; P. G.
- *Veronica acinifolia*
 - Saint-Maurice-la-Clouère, à la Croix du Roy ; 13 avril 1994 ; Y. B.
- *Veronica acinifolia*
 - Brion, près du bois de l'Eau ; 26 mai 1994 ; Y. B.
- *Xeranthemum cylindraceum*
 - Frontenay-sur-Dive, à Bédelong ; 11 juillet 1994 ; Y. B.

Contribution de : Michel BOUDRIE

- *Polystichum lonchitis*
 - La petite colonie de ce *Polystichum* montagnard, observée par Y. BARON de 1962 jusque vers 1973 (Cf. *Bull. Soc. bot. Centre-Ouest*, 1973, t. 4, n.s., p. 64-65), soumise aux vicissitudes de la S.N.C.F., ne semble hélas pas avoir résisté à l'agression perfide des désherbants. Recherché en juillet 1992, non revu.
- *Polystichum setiferum*
 - Talus, vallée de la Vienne, 3 km au nord d'Availles-Limouzine (février

1989 !, CM 21).

- Pentes boisées, vallée de la Gartempe, aux Portes d'Enfer, 3 km au sud-ouest de Lathus (juillet 1990 !, CM 43).

- Ravin ombragé, bord de la route de Sillards, à 500 m à l'ouest de Saulgé (P. PLAT et M.B., juillet 1990 !, CM 33).

Contribution de Laurent BUSNEL

- *Linaria repens* var. *galioides* Chav. (= *Linaria galioides* G. Bonnier)
 - Migné-Auxance : dans un fossé à l'ouest de la déviation de la N 147 ; juin 1995. Un comptage chromosomique de cette variété en comparaison avec l'espèce *L. repens* (= *L. striata*) est en cours.

Département de la Haute-Vienne

Contribution de : Michel BOUDRIE

- *Dryopteris deweveri* (J. Jansen) J. Jansen & Wachter (*D. carthusianax* *D. dilatata*)
 - Sous-bois, bords de la Benaize près du moulin de Cromac, Cromac (juin 1991 !, CM 63). Plusieurs pieds, avec les parents.
- *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. *affinis*
 - Bords de ruisseau, arboretum de la Jonchère, La Jonchère- Saint-Maurice (juillet 1994 !, CL 89).
- *Phegopteris connectilis* (Michx) Watt (= *Thelypteris phegopteris*)
 - Bords de rivière boisés, alt. 450 m, affluent rive droite de la Combade descendant du Mont-Gargan, entre Excidioux et le moulin des Buges, 2 km à l'est de Saint-Gilles-les-Forêts (juillet 1992 !, CL 95).
 - Talus ombragés, bord de la D 39 et ravin au sud-est du Mont-Gargan, à 1,3 km au nord de Surdoux (juillet 1992 !, CL 95). Avec *Oreopteris limbosperma* et *Polystichum aculeatum*.
- *Phyllitis scolopendrium*
 - Bords de ruisseau et vieux murs, moulin de Cromac, Cromac (juin 1991 !, CM 63).
 - Puits de l'ancienne ferme fortifiée du Fermigier, 2 km au sud-ouest de Pensol (juillet 1992 !, CL 25).
 - Parmi les ruines d'anciennes forges, vallée de la Tardoire, à Peyrassoulat, 2 km au sud de Chéronnac (juillet 1992 !, CL 26).

Inventaire floristique de Ré : corrections

Page 3, dernière ligne : lire : "ait été sous-estimée", au lieu de "aient été sous-estimées".

Page 8, ligne 13 : lire "du Pleurote", au lieu de "de la Pleurote".

Page 75, 1^{ère} col., ligne 11 : lire : "scabres ou garnies" au lieu de "scabres à garnies".

Page 106, 2^{ème} col., avant-dernière ligne : *Carex muricata* subsp. *muricata* n'existe pas en France, comme me l'a fait remarquer Ch. CHAFFIN ; il s'agit en réalité de *Carex spicata* (= *C. muricata* L. ; c'est le n°3823 de la flore de COSTE).

Page 110 : lire : *Aetheorhiza*, au lieu de *Aetheoriza*.

A. T.