

Contributions à l'inventaire de la flore

Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, **les trouvailles intéressantes** qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, **avant le 31 mars**, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants :

- le nom de la plante ;
- le lieu exact **avec indication de la commune en premier lieu**, puis du lieudit (en fournissant, si possible, les coordonnées U.T.M.) et la date de la découverte ;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station ;
- ces contributions seront **classées par département (en suivant l'ordre des numéros minéralogiques) et à l'intérieur de chaque département par ordre alphabétique.**

On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le bulletin précédent.

Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce - qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du "Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination confirmée par ...".

De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :

- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier ;
- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop communes ;
- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

N.B. : Les départements sont rangés par ordre alphabétique.

Contributions classées par département

04 - Département des Alpes-de-Haute-Provence

Contribution de Emmanuel FOURNIER et Séverine HUBERT

► *Lepidium villarsii*

- Larche, à hauteur de Maisonméanes. 10 juillet 1999.
- Larche, aux environs du Col de Larche. 11 juillet 1999.
- Saint-Paul, aux environs de la Blachière. 12 juillet 1999.
- Saint-Paul, entre Maurin et le Plan de Parouart, par le GR passant au nord de ce dernier. 12 juillet 1999.

05 - Département des Hautes-Alpes

Contribution de Emmanuel FOURNIER et Séverine HUBERT

► *Lepidium villarsii* :

- Ristolas. Trouvé en redescendant du Col de Lacroix par le GR 58b, au-dessus de 2000 m, le 14 juillet 1999. Cette localité ne figure pas dans l'Atlas de la Flore des Hautes-Alpes d'E. CHAS, 1994.

16 - Département de la Charente

Contribution de Yves BARON

► *Wahlenbergia hederacea*

- Exideuil. Tourbière de la Garenne, avec *Anagallis tenella*, *Carex laevigata*, *Dactylorhiza* cf. *elata*, *Eriophorum angustifolium*, *Helodes palustris*, *Scirpus sylvaticus*. 30 juin 1999. (Y.B.).

Contributions de Bruno HÉRAULT

► *Cardamine bulbifera*

- Champagne-Mouton. La station du bord de l'Or se maintient. Environ 250 individus observés le 4 avril 1999 en compagnie d'*Arum maculatum*, *Ranunculus auricomus* et *Lathraea clandestina*.

► *Carex pendula*

- Chantillac. Une vingtaine de touffes disséminées sûr le bord de la Pimperade au lieu-dit La Guérinière accompagnées de *Lathraea clandestina* et *Symphytum tuberosum*. 7 avril 1999.

➤ *Carex tomentosa*

- Montchaude. Un groupe d'une trentaine d'individus colonise une clairière de la partie boisée du coteau de Marvaux. 13 avril 1999.

➤ *Coronilla scorpioides*

- Rouillet-Saint-Estèphe. 25 individus groupés en bas d'une colline calcaire située entre le bourg et le site des Meulières. 13 mai 1999. Taxon menacé en Poitou-Charentes.

➤ *Gladiolus italicus*

- Montchaude. Trois individus repérés le 12 mai 1999 sur le talus gauche de la route de Barret. Ils étaient cueillis deux jours plus tard...

➤ *Lathyrus nissolia*

- Montchaude. Cette gesse est présente sur le centre du coteau calcaire de Marvaux. 5 avril 1999.

- Montchaude. Présente également dans une prairie interne au bois de la chapelle Saint-Mathurin. Station située à quelque 500 m de la première. 12 juin 1999.

➤ *Prunus padus* subsp. *padus*

- Chantillac. Découvert en milieu de forêt à la Guérinière. Il s'agit d'un individu isolé, d'indigénat douteux mais dont l'arrivée en ce lieu reste un mystère. Seule piste, une ligne de chemin de fer désaffectée passe à une centaine de mètres.

Contribution de : Christian LAHONDÈRE

➤ *Rosa stylosa*

- Courcôme, Les Touradots : manteau de la chênaie pubescente. Juin 2000.

Cette espèce se distingue de *Rosa canina* par ses styles soudés en une colonne unique : des ouvrages anciens (P. FOURNIER la considère comme une variété de *R. canina*) ne la distinguant pas, sa répartition est à préciser.

Contribution de Jean TERRISSE

➤ *Arenaria controversa*

- Claix, chaumes de Clérignac, plus d'un millier de pieds (18 mai 1999) (en compagnie de : *Linum austriacum*, *Convolvulus cantabrica*, *Rhamnus saxatilis*, *Globularia valentina* etc, vus par Y. BARON le 18 septembre 1998).

➤ *Carex pulicaris*

- Berneuil, bois des Maîtres Jacques, quelques touffes en sous-bois clair (23 mai 1999) ;

- Rougnac, landes mésophiles à l'est de la Longère, quelques touffes (22 juin 1999) ;

- Saint-Vallier, vallée de la Poussonne au sud du bois du Canage, rare (29 juin 1999).

➤ *Centaurea cyanus*

- Champniers, "les Limbaudières", abondant (au moins 1000 pieds fleuris !) dans un champ de colza (29 mai 1999).

➤ *Dryopteris affinis*

- Rougnac, plusieurs dizaines de touffes dans un vallon humide au nord du château de Montchoix (22 juin 1999).

➤ *Erica vagans*

- Berneuil, bois des Maîtres Jacques, très abondante en lisière de route et des layons forestiers. Il s'agit de la 2^{ème} station du département signalée ces 20 dernières années (23 mai 1999).

- *Linum strictum*
 - Claix, chaumes de Clérignac, rare (18 mai 1999).
- *Lysimachia nemorum*
 - Cherves-Chatelars, RR dans l'aulnaie-frênaie sur alluvions siliceuses en bas du coteau (*Lilium martagon*, *Carex strigosa*, *Chrysosplenium oppositifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Veronica montana*, *Adoxa moschatellina*, *Galium odoratum*, déjà signalés là, ont tous été revus) (22 juin 1999).
- *Oronis striata*
 - Claix, chaumes de Clérignac (18 mai 1999).
- *Orchis militaris*
 - Berneuil, bois des Maîtres Jacques, quelques pieds le long de la route (présence également de *Cephalanthera rubra*) (23 mai 1999).
- *Osmunda regalis*
 - Saint-Vallier, Nauve de la Violette, quelques individus en compagnie de *Narthecium ossifragum* et *Drosera rotundifolia*, déjà signalés sur cette Z.N.I.E.F.F. (29 juin 1999).
- *Parnassia palustris*
 - Saint-Amand-de-Montmoreau, existe toujours dans un bas-marais sur suintement de pente dans une prairie humide à l'ouest de Lafaitteau, au moins 50 individus (en compagnie de *Pinguicula lusitanica* et *Carex pulicaris*, déjà signalés là). Cette localité connue depuis plus de 20 ans est, à notre connaissance, la seule station actuelle de Charente (30 juin 1999).
- *Salix repens*
 - Saint-Vallier, AC zone tourbeuse vers Virgareu (en compagnie de *Pinguicula lusitanica*, déjà connue de cette Z.N.I.E.F.F.) (29 juin 1999).
- *Sedum rubens*
 - Claix, chaumes de Clérignac, abondant dans une jachère calcaire pierreuse (18 mai 1999).

17 - Département de la Charente-Maritime

Contributions de : Yves BARON (Y.B.), Patrick GATIGNOL (P.G.).

- *Geranium sanguineum*
 - La Jard à la Galette. 4 mai 1999. (Y.B.).
- *Hedypnois cretica*
 - Ré. Forêt du Lizay. Plusieurs pieds situés face à un grand parking pour cette espèce méditerranéenne qui pourrait se répandre. En effet, cela constitue la deuxième station de l'île après celle découverte par A. TERRISSE en bordure du parking de la plage de Gros Jonc. 24 mai 1999. (P.G.).
- *Mnuartia mediterranea*
 - Ré. Bois de Trousse Chemise. C'est bien à cette espèce qu'il faut rapporter les individus à port fastigié et à court pédoncule (confirmation : J. TERRISSE). 25 mai 1999. (P.G.).
- *Ranunculus ophitoglossifolius*
 - Colombiers. Marais de la Seugne. 4 mai 1999. (Y.B.).

Contribution de : Christian LAHONDÈRE

- *Astragalus purpureus*
 - Saint-Saturnin-du-Bois au Fief de la Garde : ourlet en bordure d'un sentier dans le bois, quelques pieds. Juin 2000.

➤ *Briza minor*

- La Gripperie-Saint-Symphorien à La Massonne : sables humides près d'un petit étang, quelques pieds. Juin 2000.

➤ *Carex depauperata*

- La Gripperie-Saint-Symphorien à La Massonne : en bordure du bois près la propriété, une touffe (peut-être davantage ?). Juin 2000.

➤ *Equisetum × moorei*

- La Gripperie-Saint-Symphorien en bordure de l'ancienne route D. 733, en lisière du bois, au sud de la route de Saint-Sornin : quelques pieds connus là depuis plusieurs années. Juin 2000.

➤ *Orchis laxiflora* subsp. *laxiflora*

- La Gripperie-Saint-Symphorien à La Massonne : dans une prairie humide, en fin de floraison. Début juin 2000.

➤ *Ranunculus ophitoglossifolius*

- La Gripperie, La Massonne : dans une prairie humide, quelques pieds. Juin 2000.

➤ *Scorzonera hispanica*

- Genouillé, Terrier de Mugon, quelques pieds en pleine floraison dans le fossé au bord de la route. Juin 2000.

➤ *Trifolium michelianum*

- La Gripperie, La Massonne : dans une prairie humide quelques pieds. Juin 2000.

➤ *Veronica austriaca* subsp. *vahlitii*

- Genouillé, Terrier de Mugon, pelouse du **Mesobromion**, quelques pieds disséminés. Juin 2000.

Le groupe *austriaca* est difficile, d'autant plus que certains ont pu le confondre avec *V. prostrata*. La véronique de Genouillé a des feuilles pennatifides (jamais pennatiséquées) dans les parties basse et moyenne de la tige, de plus en plus étroites et de moins en moins dentées vers le haut ; au haut de la tige les feuilles sont linéaires et entières ; pétioles à la base et sessiles ensuite, elles sont couvertes de poils sur les deux faces ; elles sont longues de 2 à 3 cm. La tige parfois un peu couchée à la base mesure de 30 à 50 cm et est densément pubescente, sépales et capsules sont couverts de poils. Certains caractères rapprochent ainsi, tels qu'ils sont donnés dans *FLORA EUROPAEA*, la véronique de Genouillé de *Veronica austriaca* subsp. *dentata* Watzl mais cette dernière a des feuilles plus longues : c'est un taxon centreuropéen présent chez nous seulement en Alsace.

Contribution de Dominique PATTIER

➤ *Cistus psilosepalus*

- Le Grand-Village (île d'Oléron). 8 pieds dans une clairière de la forêt domaniale de Saint-Trojan, au sud de la passe de Trioux (24 mai 1999). Ce ciste est bien connu en Oléron en forêt des Saumonards, mais, à ma connaissance, il n'a pas été signalé en forêt de Saint-Trojan. Cette petite population est remarquable car, éloignée de toute population de *Cistus salvifolius*, elle ne semble pas avoir subi les hybridations constatées ailleurs.

➤ *Scrophularia scorodonia*

- Boyardville (île d'Oléron). Quelques pieds dans une ancienne carrière de sable à la limite entre la forêt des Saumonards et le marais (3 octobre 1999). Cette scrofulaire semble apprécier les carrières de sable en sous-bois de pin : André TERRISSE me l'avait montrée dans l'île de Ré, à La Couarde, dans un milieu semblable.

➤ *Trifolium tomentosum*

- Boyardville (île d'Oléron). Assez commun le long des chemins de la frange est de la forêt des Saumonards (23 mai 1999).

Contribution de Jean TERRISSE

➤ *Drosera rotundifolia*

- Soubran, étang des Bénissons, 50-100 pieds (station signalée par P. JOURDE, vue J. TERRISSE (JT) le 14 juillet 1999).

➤ *Eriophorum angustifolium*

- Soubran, étang des Bénissons, 20-50 pieds (station signalée par P. JOURDE, vue JT le 14 juillet 1999).

➤ *Hypochoeris maculata*

- Surgères, Bois de la Petite Moute, 14 pieds fleuris dans l'ourlet calcicole bordant la D. 911 (23 juin 1999).

➤ *Ludwigia palustris*

- Soubran, étang des Bénissons, rare (station signalée par P. JOURDE, vue JT le 14 juillet 1999).

➤ *Myrica gale*

- Soubran, étang des Bénissons, abondant (station signalée par P. JOURDE, vue JT le 14 juillet 1999).

➤ *Ononis pusilla*

- Épargnes, coteau vers Moque-Souris, rare (10 juin 1999).

➤ *Ophrys fuciflora*

- Épargnes, coteau vers Moque-Souris, au moins 100 pieds en pleine floraison (10 juin 1999). Station découverte par Michel CAUPENNE le 8 juin 1999.

➤ *Osmunda regalis*

- Soubran, étang des Bénissons, rare (14 juillet 1999).

➤ *Pinguicula lusitanica*

- Soubran, étang des Bénissons, 50-100 pieds (station signalée par P. JOURDE, vue JT le 14 juillet 1999).

➤ *Scorzonera hispanica*

- Surgères, bois de la Petite Moute, 10 pieds fleuris, dans l'ourlet calcicole bordant la D. 911 (23 juin 1999).

➤ *Utricularia minor*

- Soubran, étang des Bénissons, abondante mais non fleurie (station signalée par P. JOURDE, vue JT le 14 juillet 1999).

Contribution de : Jean-Marc THIRION

➤ *Aster novae-angliae*

- Saint-Jean-d'Angle, talus en bordure de la route D. 18 : une vingtaine de pieds en septembre 1998 et septembre 1999. Cette espèce introduite d'Amérique du Nord en 1710 (P. FOURNIER) ne semble pas avoir été signalée en Poitou-Charentes.

➤ *Cardamine parviflora*

- Châtelailлон, marais d'Angoute : 150 pieds environ au sein de deux dépressions humides, en mai 2000.

➤ *Ceratophyllum submersum*

- Saint-Trojan (Oléron), mare dunaire de Gatseau. Juillet 2000.

➤ *Convolvulus lineatus*

- Saint-Denis-d'Oléron, falaise de Chassiron : plusieurs microstations (ensemble supérieur à 100 mètres carrés). Juin 2000.

Cette espèce protégée en Poitou-Charentes était "assez commune" à la fin du 19^{ème} siècle sur le littoral de Mortagne à Marsilly (J. LLOYD) ; elle s'est raréfiée mais se maintient à Chassiron.

➤ *Echium asperrimum*

- Saint-Denis-d'Oléron, falaise de Chassiron : 5 pieds, juin 2000. Cette vipérine "assez commune" dans la région maritime selon J. LLOYD semble avoir ici beaucoup régressé.

➤ *Epipactis phyllanthes*

- La Tremblade, forêt de la Coubre dans le "canton" de Nègrevaux, 6 pieds. Juillet 2000.

Orchidée protégée en Poitou-Charentes, cet *Epipactis* longtemps méconnu est présent çà et là mais n'est jamais abondant.

➤ *Hottonia palustris*

- Saint-Augustin, parcelle du Conservatoire des Espaces Naturels de Poitou-Charentes : moins de 10 pieds dans un fossé envasé. Fin mai 2000.

➤ *Iris spuria* subsp. *maritima*

- Châtelailon, marais d'Angoute : une centaine de pieds dispersés dans l'ensemble des parcelles. Début mai 2000.

➤ *Lavatera arborea*

- Saint-Denis (Oléron), falaise de Chassiron : plusieurs dizaines de pieds, juin 2000.

Espèce nitrophile non citée par J. LLOYD en Charente-Maritime (cet auteur ne mentionnant que *Lavatera cretica* à l'île de Ré et à La Rochelle), parfois cultivée, se répandant facilement et disparaissant de même (J. LLOYD) , elle est favorisée dans les zones ostréicoles et là où séjournent les oiseaux de mer.

➤ *Myrica gale*

- La Clotte, tourbière de la Guirande traversée par le ruisseau du Pas de Canon : plus de 30 pieds. Juin 2000.

➤ *Orchis coriophora* subsp. *fragrans*

- Annepont, les Combes, coteau sec : 2 pieds. Mai 2000.

➤ *Osmunda regalis*

- La Clotte, tourbière de la Guirande traversée par le ruisseau du Pas de Canon : plus de 50 pieds. Juin 2000.

➤ *Ranunculus ophioglossifolius*

- Chatelaillon, marais d'Angoute : plusieurs centaines de pieds sur l'ensemble des parcelles communales. Début mai 2000.

- Saint Augustin, parcelle du Conservatoire des Espaces Naturels de Poitou-Charentes : 1 pied. Début mai 2000.

➤ *Utricularia minor*

- La Clotte, tourbière de la Guirande traversée par le ruisseau du Pas de Canon : une station d'un mètre carré. Juin 2000.

19 - Département de la Corrèze

Contribution de : Luc BRUNERYE

➤ *Adoxa moschatellina*

- Monceaux-sur-Dordogne (25 mars et 28 avril 1999). Bois des bords de la Dordogne.
- Noailles (11 mai 1999). Taillis au bord de la Couze. Cette espèce n'a été rencontrée jusqu'ici en Corrèze que dans le Bassin de Brive et sur les alluvions du bassin de la Dordogne ; à rechercher ailleurs.

- *Amaranthus cruentus*
- Meyssac (24 octobre 1999). Terrain vague après travaux au bord de la route D 14, adventice abondante.
- *Anthemis altissima*
- Végennes (3 juin 1999). Friche entre Végennes et Sarny, très abondant. Nouveau pour le département.
- *Arabis glabra*
- Brivezac (28 avril 1999). La Champagne, talus du chemin vers la Dordogne, AC.
- *Asplenium foreziense*
- La Chapelle-Saint-Géraud (8 mai 1999). Muret de soutènement à Croisille, rare.
- *Bromus rigidus*
- Sérilhac (18 septembre 1999). Bord du chemin de Séruch à Lafarge, très local.
- *Campanula erinus*
- Végennes (3 juin 1999). Murs du bourg, abondant.
- *Centaureum pulchellum*
- Salon-la-Tour (30 juillet 1999). Carrière au bord de la route D 26, près du ruisseau de Lamongerie, très abondant sur le sable humide. Très rare en Corrèze en dehors du Bassin de Brive.
- *Cerastium pumilum* subsp. *glutinatum*
- Astaillac (28 avril 1999). Sables grossiers des alluvions de la Dordogne, entre Astaillac et La Plaine.
- *Chamaemelum nobile*
- Peyrissac (7 août 1999). Berme sableuse de la route D 3^{E4}. Local.
- *Coronilla varia*
- Eyburie (7 août 1999). Un seul pied, sur un talus près d'une habitation, au Pont du Verdier. Subspontané ? Adventice ?
- *Ceratocarpus claviculata* subsp. *claviculata*
- Le Chastang (24 juin 1999). Local dans une ancienne coupe, près de la Croix de Nespoulé. Espèce en expansion depuis son aire d'origine en haute Corrèze.
- *Corydalis solida* subsp. *solida*
- Monceaux-sur-Dordogne (25 mars 1999).
- Brivezac (28 avril 1999). Bois des bords de la Dordogne, assez commun.
- *Crassula tillaea*
- Astaillac (28 avril 1999). Sables des alluvions de la Dordogne, entre Astaillac et La Plaine.
- *Crataegus laevigata* subsp. *laevigata*
- Beaulieu-sur-Dordogne (26 septembre 1999). Chemin dans les bois entre Beaulieu et Lascombes, un seul individu.
- *Crepis paludosa*
- La Roche-Canillac (12 mai 1999). Gorges du Doustre, rare. Cette espèce semble très rare dans la vallée du Doustre.
- *Cynoglossum officinale*
- Meyssac (1 mai 1999). Un seul individu en bord de route entre Meyssac et Nardy.
- *Dactylorhiza incarnata* subsp. *incarnata*
- Pradines (26 mai 1999). Prairie humide en bord de ruisseau près Le Mazel, 3 individus. Première indication pour la haute Corrèze.
- *Daphne laureola* subsp. *laureola*
- Collonges-la-Rouge (27 février 1999). Bord de chemin creux au-dessus du Martret, plus de 10 individus.
- *Dipsacus pilosus*
- Queyssac-les-Vignes (27 mars 1999). Peupleraie marécageuse au bord du Palsou, le Moulin Bas, local.

- *Draba muralis*
 - Sainte-Féréole (30 avril 1999). Talus, vers le Moulin de Treillard.
 - Brivezac (2 mai 1999). Talus sableux de la route près du bourg.
- *Eragrostis ciliaris*
 - Meyssac (24 octobre 1999). Berme de la route D 14 vers Chauffour-sur-Vell. Peu abondant, local.
- *Erigeron karvinskianus*
 - Végennes (3 juin 1999). Naturalisé sur les murs du bourg.
- *Euphorbia angulata*
 - Albussac (2 avril, revu 17 juin 1999). Bord de la route D 87 près Chantarel, local sur un talus à *Brachypodium pinnatum* avec *Asphodelus albus*, *Senecio adonidifolius*, *Chamaespartium sagittale*, *Serratula tinctoria*, etc ... Deuxième station pour le département.
- *Euphorbia hyberna* subsp. *hyberna*
 - Lanteuil (13 avril 1999). Vallée du Roannet, localement abondant dans la hêtraie-charmaie à *Luzula sylvatica*. Altitude 300-320 m.
- *Galanthus nivalis*
 - La Chapelle-aux-Saints (9 mars 1999). Prairie derrière l'église, naturalisé.
- *Galium parisiense*
 - Végennes (3 juin 1999). La Lèbre, pelouse rudérale, abondant.
 - Le Pescher (16 juin 1999). Talus de route vers Le Breuil.
- *Gentiana pneumonanthe*
 - Viam (10 août 1999). Vallon tourbeux du ruisseau de Condeau, au sud-est de La Combeaujau, une dizaine d'individus près du ruisseau.
 - Tarnac (28 août 1999). Pacage tourbeux, vallée du Menoueix entre Champeaux et Les Maisons, moins de 10 individus.
- *Gentianella ciliata*
 - Puy d'Arnac (21 septembre 1999). Un seul individu, en fleur. Nouveau pour le département.
- *Halimium umbellatum*
 - Brive (26 octobre 1999). Lande sur talus, route de la vallée de Planchetorte à Chèvrecujols.
- *Heliotropium europaeum*
 - Meyssac (24 octobre 1999). Terrain vague après travaux, bord de la route D 14 vers Chauffour-sur-Vell.
- *Hyacinthoides non-scripta*
 - Monceaux-sur-Dordogne (28 avril 1999). Bois du bord de la Dordogne au nord-est de Saulières, rare, local, certainement subspontané.
- *Juncus anceps*
 - Saint-Martial-de-Gimel (2 août 1999). Sud-est du Chastanet, bord de la route D 61E, talus suintant récent après travaux, avec *Scirpus setaceus*, *Carex demissa*, *Rorippa pyrenaica*, etc ... Adventice ? N'a jamais été signalé en Corrèze.
- *Lamium hybridum*
 - Saint-Germain-les-Vergnes (18 mars 1999). Hameau des Vergnes, rare.
- *Lathyrus nissolia*
 - Le Pescher (16 juin 1999). Bord de la route au nord du bourg, quelques individus.
- *Lepidium heterophyllum*
 - Veix (1^{er} juillet 1999). Petit-Sérilhac, un seul individu.
- *Lycopodiella inundata*
 - Bugeat (24 mai 1999). Pacages tourbeux au bord de la Petite Vézère en aval du Pont de Chaleix, rive gauche. Deux stations d'environ 1 m².

- *Linum strictum* subsp. *strictum*
 - Végennes (3 juin 1999). Talus rocheux, route de La Lèbre à Végennes, abondant.
- *Linum trigynum*
 - Le Pescher (16 juin 1999). Talus rocailleux vers Le Breuil, abondant.
- *Lolium rigidum* subsp. *rigidum*
 - Neuville (14 juin 1999). Friche vers Le Marquisat, abondant.
- *Lysimachia nummularia*
 - Lagarde-Enval (17 juin 1999). La Croisette, fossé humide dans une châtaigneraie, très local. Très rare en Corrèze en dehors du Bassin de Brive.
- *Medicago rigidula*
 - Meyssac (11 avril 1999). Cruges, pelouse sèche rudérale.
- *Muscari neglectum*
 - Billhac (27 mars 1999). Coteau au sud-ouest de Cossignol : des centaines de pieds dans les prés et friches (probablement anciennes vignes).
 - Végennes (3 juin 1999). Bord de route au sud-ouest de Sarny, peu abondant, en fruits.
- *Narcissus poeticus* subsp. *poeticus*
 - Camps (5 mai 1999). Prairie à Randal, très abondant.
- *Narcissus pseudo-narcissus* subsp. *pseudo-narcissus*
 - La Chapelle-aux-Saints (9 mars 1999). Lisières des bois du bord de la Sourdoire, entre l'église et Sourdoire, assez commun.
- *Oenanthe pimpinelloides*
 - Lagarde-Enval (17 juin 1999). Prairie à La Croisette. Rare en Corrèze en dehors du Bassin de Brive.
- *Ophrys sphegodes* subsp. *litigiosa*
 - Meyssac (21 avril 1999). "Causse" vers Le Bousquillou, moins de 10 individus.
- *Paricum capillare*
 - Meyssac (24 octobre 1999). Terrain vague après travaux, bord de la route D 14 vers Chauffour-sur-Vell.
- *Phyteuma gallicum*
 - Bugeat (24 mai 1999). Bord de la Petite Vézère en aval du Pont de Chaleix, et bord de la Vézère dans le bois de Chaleix, toujours rare : quelques individus isolés.
- *Polygonum polystachyum*
 - Lestards (5 août 1999). Madegal, naturalisé dans le village.
- *Ranunculus arvensis*
 - Beaumont (23 mai 1999). Champ de seigle, Treillet, localement très abondant. Rare en Corrèze hors du Bassin de Brive.
- *Ranunculus hederaceus*
 - Dampniat (11 mars 1999). Fossé, vallée de la Roanne vers Sainte-Marie, rare.
- *Rapistrum rugosum* subsp. *orientale*
 - Végennes (3 juin 1999). Friche, vers le Moulin de Pouget, peu abondant.
- *Reynoutria sachalinensis*
 - Pradines (26 mai 1999). Naturalisé à Pradines-Vieille. Très rare en Corrèze contrairement à *Reynoutria japonica*.
- *Scilla bifolia*
 - La Chapelle-aux-Saints (9 mars 1999). Bord de pré, derrière l'église.
 - Saint-Bonnet-Avalouze (8 avril 1999). Charmante dans le ravin d'un petit ruisseau, près La Borie, en fruits.
- *Solanum nigrum* var. *chlorocarpum* Spenn.
 - Meyssac (24 octobre 1999). Terrain vague après travaux, bord de la route D 14 vers Chauffour-sur-Vell. Cette variété à fruits jaunes ne semble pas très rare dans le Bassin de Brive, je ne l'ai jamais observée ailleurs en Corrèze.

- *Spergula morisonii*
- Beaumont (23 mai 1999). Table rocheuse dominant la vallée de la Vimbelle, sud du bourg, rare.
- *Spiranthes spiralis*
- Serilhac (18 septembre 1999). Prairie rase (pacage) sur coteau exposé au sud, nord-est de Séruch, une vingtaine d'individus.
- *Stachys annua*
- Végennes (3 juin 1999). Friche vers le Moulin de Pouget, rare.
- *Tanacetum corymbosum*
- Turenne (10 septembre 1999). Pré-bois sur le causse au sud de Jugeals-Nazareth, rare.
- *Taraxacum erythrospermum*
- Meyssac (mars-avril 1999). Pelouses et chemins pierreux sur le causse, sud de Cruges.
- *Tuberaria guttata*
- Serilhac (18 septembre 1999). Lande herbeuse en haut de coteau, nord-est de Séruch, abondant.
- *Verbascum blattaria*
- Le Pescher (16 juin 1999). Berme de la route du Breuil au nord du bourg, deux individus.

24 - Département de la Dordogne

Contribution de Jean TERRISSE

- *Lysimachia nemorum*
- Bussière-Badil, vallée de la Tardoire à l'ouest de Tartou, plus de 500 pieds (en compagnie de *Poa chaixii*, *Doronicum pardalianches*, etc., déjà signalés ici) (23 juin 1999).

33 - Département de la Gironde

Contribution de : Christian LAHONDÈRE

- *Anthoxanthum aristatum* subsp. *aristatum*
- Biganos au nord du Port des Tuiles : pelouse du **Thero - Airion**, dans une clairière de la forêt de pin maritime.
Curieusement, commune en Gironde (J. LLOYD et A. F. JEANJEAN) et dans les Landes (J. LLOYD), assez commune (J. LLOYD), commune ou assez commune (H. des ABBAYES) en Vendée et en Bretagne, elle est absente ou rarissime en Charente-Maritime (J. LLOYD) où nous ne l'avons jamais observée. Il nous semble donc intéressant de signaler les localités voisines de notre département où l'on peut voir cette graminée de façon à mieux connaître sa distribution géographique et à rechercher les causes de son absence d'une partie du Centre-Ouest où le sable plus ou moins calcaire, ou siliceux, ne manque pas.
- *Armeria alliacea*
- Lège, sur les sables vaseux saumâtres de Claouey. Se distingue d'*Armeria maritima* par ses feuilles à 3-7 nervures. Quelques touffes en juin 2000.
- *Bromus hordeaceus* subsp. *thomini*
- Soulac, Pointe de la Négade : abondant le long d'un sentier dans l'**Artemisio - Ephedretum** près de sa limite avec le **Sileno - Ammophiletum**. Juin 2000.

► *Cutandia maritima*

- Montalivet, au nord de l'agglomération, au sein du **Sileno - Ammophiletum**, une douzaine de pieds desséchés. Juin 2000.

Cette espèce a déjà été signalée dans la même localité mais dans l'**Artemisio - Ephedretum** altéré à proximité du Centre Naturiste par J.-M. GÉHU en mai 1994 (Bulletin S.B.C.O., 1995, **26** : 141-142). Graminée d'origine méditerranéenne la plante a été observée également en juin 1994 (et revue depuis) au cours de l'herborisation des Naturalistes Parisiens sur la côte sud-vendéenne à l'Aiguillon-sur-Mer sur une plage artificielle très dégradée.

► *Erodium aethiopicum* (Lam.) Bruhm. et Thell.

- Biganos, au nord du Port des Tuiles, dans une pelouse du **Théro - Airion** en limite du **Pino - Quercetum**, juin 2000.

Les *Erodium* du groupe *cicutarium* ont souvent été confondus ; avec G.-G. GUITTONNEAU et M. GUINOCHET (Flore de France) ainsi qu'avec nos propres observations on peut distinguer sur le littoral sableux sud-atlantique français :

►► *Erodium aethiopicum* (Lam.) Bruhm. et Thell.

Les fruits ne présentent pas de pli infrafovéolaire (petite dépression située à la base du bec), la pubescence de la plante n'est pas glanduleuse, l'inflorescence est constituée de 2 ou 3 fleurs (très exceptionnellement 4 ou 5), les fleurs sont rouge violacé, les feuilles d'un vert franc, le rostre ou bec mesure moins de 35 mm ; c'est une espèce des clairières et coupe-feu du **Pino - Quercetum**.

►► *Erodium lebelii* Jord. (= *E. glutinosum* Dumort.)

Les fruits ne présentent pas de pli infrafovéolaire, la pubescence est glanduleuse et la plante agglomère les grains de sable, l'inflorescence est constituée de 2 ou 3 fleurs (rarement davantage), les fleurs sont roses, les feuilles d'un vert cendré, le rostre mesure moins de 25 mm ; c'est une plante des sites plus ou moins fréquentés de l'**Artemisio - Ephedretum**, du **Sileno - Helichrysetum** et peut-être de l'**Alyso - Helichrysetum** au voisinage de l'Adour.

►► *Erodium cicutarium* L'Hérit. (= *E. cicutarium* s.st.)

Les fruits présentent un pli infrafovéolaire, une pubescence non glanduleuse, l'inflorescence est constituée de 3 à 7 fleurs, les fleurs sont rouge violacé, les feuilles d'un vert franc, le rostre mesure de 25 à 35 mm ; c'est l'espèce la plus nitrophile, elle n'est pas strictement liée au littoral.

Pour J. LAMBINON *et al.* (Nouvelle Flore de Belgique...) qui ne mentionne pas *Erodium aethiopicum*, celle-ci se nomme *Erodium cicutarium* subsp. *dunense* Andreas et se distingue de la subsp. *cicutarium* par un pli infrafovéolaire moins distinct.

► *Limonium auriculae-ursifolium*

- Lège, la station de Claouey de ce très rare *Limonium* n'est pas en très bon état. Juin 2000.

► *Ornithopus perpusillus*

- Biganos, au nord du Port des Tuiles : quelques pieds dans une pelouse du **Théro - Airion** en limite du **Pino - Quercetum**. Juin 2000.

► *Ornithopus pinnatus*

- Biganos, même station, quelques pieds avec le précédent. Juin 2000.

► *Ornithopus sativus* subsp. *sativus* (= *O. roseus* Dufour)

- Biganos, même station, quelques pieds avec les deux précédents. Juin 2000.

► *Otanthus maritimus*

- Montalivet, au nord de l'agglomération, une belle colonie au sein du **Sileno - Ammophiletum**. Juin 2000.

Contribution de Dominique PATTIER

► *Melilotus messanensis* (= *Melilotus siculus*)

- Saint-Christoly-Médoc, au bord de la Gironde. Population décrite par H. BESANÇON vers 1971, revue par P. JAUZEIN en 1991 (*Le Monde des Plantes*, **442**) et retrouvée par hasard le 11 avril 1998. Elle est toujours constituée d'une centaine d'individus vigoureux, en début de floraison à la date de ma visite. Cette semi-halophile a été signalée en d'autres stations de la rive gauche de la Gironde (Port-de-Goulée, Port-de-By) ; à rechercher sur la rive droite.

Département du Lot

Contribution de : Jean-Jacques LACROIX

► *Adoxa moschatellina*

- Carennac, île Calypso, le 20 mars 1999. 31 T DK 07. Quelques pieds dans une station d'*Isopyrum* en sous-bois alluvionnaire.

► *Corydalis cava*

- Carennac, île Calypso, le 20 mars 1999. 31 T DK 07. Quelques pieds dans une station de *Adoxa* et *Isopyrum*.

► *Helleborus viridis*

- Rocamadour, le 15 mai 1999. 31 T CK 86. Un pied isolé en fleur sur la rive gauche de l'Alzou, sous la haie qui borde le ruisseau.

► *Isopyrum thalictroides*

- Carennac, île Calypso, le 20 mars 1999. 31 T DK 07. Station de 25 m² avec quelques pieds de *Corydalis* et *Adoxa*, sur sable limoneux en sous-bois d'une île de la Dordogne.

► *Kickxia spuria*

- Vayrac, Mezels, Les Teulières, le 29 août 1999. 31 T CK 97. Nombreux pieds dans un champ après culture. Plusieurs sujets présentent des anomalies rendant leurs fleurs identiques, dans leur forme, à celles de *Linaria vulgaris* : fleurs régulières en tube sans éperon.

► *Leuzea conifera*

- Rocamadour, Moulin de Tournefeuille, le 20 mai 1999. 31 T CK 99. Une vingtaine de pieds sur un banc rocheux calcaire de 50m², peu accessible, orienté sud, rive droite de l'Alzou.

► *Pistachia terebinthus*

- Gintrac, Taillefer. Août 1999. 31 T DK 07. Un pied isolé dans une anfractuosité rocheuse calcaire.

► *Ranunculus gramineus*

- Rocamadour, Cabouy, le 15 avril 1999. 31 T CK 86. Une dizaine de pieds sur le talus sud du chemin de Cabouy.

► *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata*

- Carennac, Brillayre, avril 1999. 31 T CK 97. Plusieurs stations denses, alternant avec des taillis de *Prunus spinosa*.

49 - Département du Maine-et-Loire

Contribution de Jean TERRISSE

► *Daphne laureola*

- Somloire, bois d'Anjou, quelques pieds disséminés dans la partie sud (21 juillet 1999).

- *Exaculum pusillum*
 - Somloire, bois d'Anjou, quelques pieds dans un **Radiolo - Cicendietum** sur la rive est de l'étang du Bois Rigaleau (21 juillet 1999) (en compagnie d'*Anagallis minima*, *Cicendia filiformis* et *Juncus tenageia*, déjà notés là en 1992).
- *Littorella lacustris*
 - Somloire, petit étang au sud du bois d'Anjou, plus d'un millier de pieds (21 juillet 1999).
- *Pilularia globulifera*
 - Somloire, petit étang au sud du bois d'Anjou, plus d'un millier de pieds (21 juillet 1999).
- *Potamogeton gramineus*
 - Somloire, petit étang au sud du bois d'Anjou, environ 200 pieds (21 juillet 1999).
Présentes également dans cet étang plusieurs espèces rares déjà notées en 1992 lors de la description de la Z.N.I.E.F.F. : *Juncus heterophyllus*, *Utricularia australis*, *Myriophyllum alterniflorum*.

64 - Département des Pyrénées-Atlantiques

Contribution de Emmanuel FOURNIER et Séverine HUBERT

- *Prunus lusitanica*
 - Bidarray. Quelques individus spontanés et presque déflorisés dans le vallon du Bastan, non loin de la frontière espagnole. 8 juin 1999.

79 - Département des Deux-Sèvres

Contributions de : Yves BARON (Y.B.), Antoine CHASTENET (A.C.),
Patrick GATIGNOL (P.G.), Alain METAIS (A.M.), Jean-Pierre RING (J.-P.R.),
SBCO-86 (découvertes collégiales lors des sorties)

- *Agrimonia procera*
 - Coutières. Le Bourg-Neuf. Quelques touffes le long de la rivière avec *Achillea ptarmica*. 15 août 1999. 1627E. (P.G.).
- *Carex strigosa*
 - La Mothe-Saint-Heray. Forêt de Lhermitain : Font-Querré. Quelques touffes disséminées le long du ruisseau. 5 mai 1999. (P.G.), (A.C.).
- *Catabrosa aquatica*
 - La Mothe-Saint-Heray. Forêt de Lhermitain : Font-Querré. Quelques pieds le long du ruisseau. 22 juin 1999. (P.G.).
- *Chrysosplenium oppositifolium*
 - La Mothe-Saint-Heray. Forêt de Lhermitain : Font-Querré. Très belle population tout le long du ruisseau. 6 mai 1999. (P.G.), (A.C.).
- *Deschampsia cespitosa* subsp. *convoluta* (Rouy) P. Fourn.
 - Clussais-La-Pommeraiie. Chevais. Quelques pieds très localisés. 12 juin 1999. (P.G.).
- *Deschampsia cespitosa*
 - Ménigoute. Etang de Bois Pouvreau. 2 mai 1999. (A.C.).
- *Deschampsia media*
 - Clussais-La-Pommeraiie. Chevais. Quelques pieds. 11 juin 1999. (P.G.).

- *Dryopteris dilatata*
 - La Mothe-Saint-Heray. Forêt de Lhermitain : Font-Querré. 7 mai 1999. 409-2152.1628E. (P.G.), (A.C.).
- *Epilobium montanum*
 - Saint-Coutant. Chemin des Chevrons, avec *Milium effusum*. 21 juin 1999. (Y.B.).
- *Leucanthernum vulgare* subsp. *praecox* Horv. var. *praecox* Horv.
 - Coutières. Ancienne carrière de granit au Bourg-Neuf près de La Pagerie. Avec *Orchis morio*, *O. laxiflora* et hybrides (*O. x alata*), *Moenchia erecta* et *Trifolium subterraneum*. 2 mai 1999. (A.C.).
- *Myosotis balbisiana*
 - Argenton-Château. Les abords du lac d'Hantibus. C'est à cette espèce que je rapporte les petits exemplaires à petites fleurs d'un jaune doré persistant. Ce taxon mentionné dans la Flore du Massif Armoricain est très rare et semble affectionner les pelouses des **Tuberarieteae**. 9 mai 1999. (P.G.).
- *Myosoton aquaticum*
 - Chantecorps. Étang des Chateliers. 20 juin 1999. (A.C.).
- *Scilla verna*
 - La Mothe-Saint-Heray. Forêt de Lhermitain. Très belle population au carrefour D5 / D10. 8 mai 1999. 409-2153.1628E. (P.G.), (A.C.).
- *Sison amomum*
 - Saint-Coutant. Chemin des Minettes. 21 juin 1999. (Y.B.).
 - Coutières. Le Bourg-Neuf. Grandes populations pour cette espèce assez peu citée. 16 août 1999. (P.G.).
- *Sisymbrella aspera*
 - Clussais-La-Pommeraiie. Chevais. Quelques pieds très localisés. 10 juin 1999. (P.G.).
- *Spergularia segetalis*
 - Le Breuil-sous-Argenton. Le Chiron de la Garde. Petite population de cette espèce devenue très rare, en compagnie d'*Isoetes histrix*, *Sedum villosum* et *Juncus capitatus*. 10 mai 1999. (P.G.).
- *Stachys alpina*
 - Saint-Coutant. Chemin des Champs-Rouges et chemin des Chevrons. 21 juin 1999. (Y.B.).

Contributions de Luc BIANCHINI (L.B.),
François-Jean ROUSSELOT (F.-J.R.) et Philippe AUBINEAU (P. A.)
avec des observations complémentaires de
Pierre DUPONT (P.D.), Jacques SAVIN (J.S.), René MOIMEAU (R.M.),
Marc CARRIERE (M.C.), Bernard CANTAUT (B.C.)
et Hubert BEAUJAUULT (H.B.)

- *Achillea ptarmica*
 - Commune de Montigny, à "La Pommeraiie". 23/09/1999, (L.B. et F.-J.R.). XS 88.
 - Commune du Pin, à l'étang du Nay. 12/09/1999, (L.B.). XS 79.
 - Commune de Saint-Maurice-la-Fougereuse, à l'étang de la Gripière. 18/07/1999, (L.B.). XT 81.
 - Commune de Saint-Sauveur, sur "Pont-Chouette". 22/07/1999, (L.B. et H.B.). XS 98.
Cette espèce ne semble pas rare en bocage.
- *Althaea officinalis*
 - Commune de Terves, à l'Audairie. 25/07/1999, (L.B.). XS 98.
Cette espèce est peu commune sur silice.
- *Berberis vulgaris*

- Commune de Breuil-Chaussée, au château de Blanchecoudre. 19/07/1999, (L.B.). XS 88.

Cette espèce semble plus ou moins naturalisée sur ce site.

➤ *Bromus willdenowii*

- Mentionnée (M.C.) sur la maille XS 87 en 1996 (communes de Moncoutant/Moutiers-sous-Chantemerle).

➤ *Butomus umbellatus*

- Commune d'Exoudun, à Brioul. 01/07/1996, (P.A.). XS 23.

Espèce qui devient rare en Deux-Sèvres (comme ailleurs). Mentionnée (M.C.) sur la maille XS 87 en 1996 (communes de Moncoutant/Moutiers-sous-Chantemerle).

➤ *Calamagrostis epigeos*

- Commune de Saint-Sauveur, au rond-point séparant la route de Poitiers et celle d'Airvault. 01/09/1999, (L.B.). YS 08/09.

➤ *Centaurea cyanus*

- Commune de Marigny, à la Blotière. 24/05/1997, (P.A.). XS 92.
- Commune de Saint-Sauveur, route de Terves. 01/05/1999, (L.B.). XS 98.

Loin de disparaître, cette messicole semble encore bien présente en bordure des champs cultivés ; d'autres observations ont été effectuées sur les communes de Saint-Clémentin, Voultegon, Sanzay et Saint-Aubin-du-Plain.

➤ *Convallaria maialis*

- Commune de Bressuire, partie désaffectée de la gare. 15/04/1999, (L.B.). XS 99.

➤ *Conium maculatum*

- Commune de Bressuire, à la Coulée Verte (bords du Dolo). 01/06/1999, (L.B.). XS 99.
- Commune de Sainte-Radégonde, en aval de la vallée du Pressoir. 01/04/1999, (L.B. et J.S.). YT 10.

➤ *Crataegus laevigata*

- Commune de Saint-Maurice-la-Fougereuse, à l'étang de la Grippière. 18/07/1999, (L.B.). XT 81.
- Commune de Moutiers-sous-Argenton, rive droite de l'Argenton en amont du pont de Grifférus. 27/07/1999, (L.B.). XT 90.
- Commune de Moutiers-sous-Argenton, au sud de l'étang de Juigny. 01/08/1999, (L.B.). YT 00.
- Commune de Noirterre, dans le bois au sud de l'étang communal. 01/07/1999, (L.B.). XS 99 : seule donnée sur le canton de Bressuire, où l'espèce semble rare.

➤ *Cucubalus baccifer*

- Commune de Missé, cirque de Missé au bord du Thouet, rive gauche. 23/08/1999, (L.B.). XT 90.
- Commune de Saint-Sauveur, prairie de Bellefontaine. 22/07/1999, (L.B.). XS 98.

➤ *Damasonium alisma*

- Commune du Breuil-sous-Argenton, vers "Le Fief aux Loups" en bordure d'un petit étang. 01/07/1999, (L.B.). XT 90.

Cette plante protégée au niveau national reste rarissime en Deux-Sèvres avec une demi-douzaine de stations connues au maximum.

➤ *Doronicum plantagineum*

- Commune de Moncoutant, route de Courlay (R.D. 150) entre "La Peltrie" et "La Guérinière". 15/04/1999, (L.B.). XS 87. Cette station connue depuis près de 15 ans (Bulletin S.B.C.O. 17 - 1986) et découverte par J.S. et R.M. ne cesse de s'étendre (sur environ 500 mètres) au fil des ans.
- Commune de Noirterre, au lieu-dit "Les Brandes de Jouteaux" sur environ 100 mètres de linéaire. 01/05/1999, (L.B.). XS 99.

- *Eleocharis acicularis*
 - Mentionnée (M.C.) sur la maille XS 87 en 1996 (communes de Moncoutant/Moutiers-sous-Chantemerle).
- *Elodea nuttallii*
 - Mentionnée (M.C.) sur la maille XS 87 en 1996 (communes de Moncoutant/Moutiers-sous-Chantemerle) : nouvelle espèce pour le département des Deux-Sèvres.
- *Euphorbia hyberna*
 - Commune de Saint-Maurice-la-Fougereuse, bois près de l'étang de la Gripière. 18/07/1999, (L.B.). XT 81.
- *Fraxinus angustifolia* subsp. *oxycarpa*
 - Commune de Missé, cirque de Missé, rive gauche du Thouet. 23/08/1999, (L.B.). XT 90.
- *Fritillaria meleagris*
 - Commune de Saint-Clémentin, lieu-dit "La Roche aux Moines", rive gauche de l'Argenton, micro-station d'un pied seulement. 05/04/1999, (L.B.). XT 90.
- *Galanthus nivalis*
 - Mentionnée (M.C.) sur la maille XS 87 en 1996 (communes de Moncoutant/Moutiers-sous-Chantemerle).
- *Gaudinia fragilis*
 - Mentionnée (M.C.) sur la maille XS 87 en 1996 (communes de Moncoutant/Moutiers-sous-Chantemerle).
- *Genista anglica*
 - Commune de Saint-Maurice-la-Fougereuse, bordures de l'étang de la Gripière. 18/07/1999, (L.B.). XT 81.
 - Commune de Noirterre, bordure d'un bois situé au sud-ouest de "Les Ramonnières". 10/04/1999, (L.B.). XS 99.
- *Helianthus x laetiflorus*
 - Commune de Bressuire, face à l'Hôpital. 01/11/1999, (L.B.). XS 99.
 - Commune d'Argenton-Château, aux feux dans le centre. 15/09/1999, (L.B.). XT 90.
 - Commune de Faye-l'Abbesse, à la sortie du bourg, route de Bressuire. 20/11/1999, (L.B.). YS 08/09.

Cette échappée des jardins semble avoir quelque propension à se développer par-ci par-là.
- *Hieracium lactucella*
 - Commune de La Forêt-sur-Sèvre, lieu-dit "Pellouaille". 15/11/1999, (F.-J.R.). XS 88.
 - Il s'agit d'une des seules données en Deux-Sèvres pour cette espèce plus que méconnue.
- *Inula helenium*
 - Commune de Boismé, au lieu-dit "Les Bouchetières" au bord de la R.D.139. 25/07/1999, (L.B.). XS 98.
 - Commune de La Chapelle-Largeau, au lieu-dit "Les Belles Roches". 01/11/1999 (L.B.). XT 60 d'après des indications de Pierre DUPONT.
- *Lobelia urens*
 - Commune de Montigny, étang de la Pommeraie. 24/08/1999, (L.B. et F.-J.R.). XS 88.
 - Commune de Montravers, au bois du Vieux Deffend. 03/10/1999, (L.B.). XS 79.
- *Melica ciliata*
 - Commune d'Argenton-Château, dans le bourg. 18/07/1999, (L.B.). XT 90.
- *Micropyrum tenellum*
 - Commune de Bressuire, quartier de Valette, en bordure de la voie rapide sur les coteaux siliceux. 01/06/1999, (L.B.). XS 98.
 - Commune de Mauzé-Thouarsais, vallée du Pressoir rive gauche en aval du pont. 26/07/1999, (L.B.). YT 00.

► *Oenanthe aquatica*

- Commune de Bouillé-Loretz, dans les fossés du bourg près de l'étang communal. Juin 1999, (L.B.). YT 01.

► *Oenanthe crocata*

Une prospection spécifique menée pour cette espèce en juin 1999 a permis de la rencontrer dans 45 communes du bocage sur les arrondissements de Bressuire et de Parthenay.

► *Paspalum dilatatum*

- Commune de Niort, près du centre équestre route d'Aiffres. 01/07/1998, (L.B.). XS 93.
- Commune de Bressuire, Saint-Porchaire, en bordure de la réserve d'eau des pompiers route de Thouars (R.N.149). 01/10/1999, (L.B.). XS 99.
- Commune d'Amailoux, en bordure de la R.N.149. 01/09/1999, (P.D. et L.B.). XS 98.

Cette espèce en expansion rapide n'avait pas été notée auparavant en Deux-Sèvres.

► *Peucedanum gallicum*

- Commune de Montigny, "La Pommeraie". 01/09/1999, (L.B. et F.-J.R.). XS 88.
- Commune de Noirterre, vers "Les Ramonnières". 05/10/1999, (L.B. et F.-J.R.). XS 99.

► *Asplenium scolopendrium*

- Commune de Terves, étang de Puy-Blain. 01/11/1999, (H.B.). XS 88.
- Commune de Terves, vers "La Bollardière". 05/11/1999, (L.B.). XS 88.
- Commune de Saint-Sauveur, Pont-Chouette. 30/07/1999, (L.B. et H.B.). XS 98.

► *Phytolacca americana*

- Commune de Pas-de-Jeu, dans une zone de dépôts près du bois de Lairé le 14/08/1999, (L.B.). YT 20.

► *Polystichum aculeatum*

- Commune de Terves, vers "La Bollardière" à l'endroit même où un sentier botanique a été récemment aménagé par l'école publique (L.B.). XS 88.

Cette fougère est assez rare en Deux-Sèvres avec quelques mentions en Gâtine seulement.

► *Polystichum spinulosum*

- Commune de Moutiers-sous-Argenton, au pont de Grifférus, rive droite, en amont de ce pont. 27/09/1999, (L.B.). XT 90.

► *Potentilla montana*

- Commune de Saint-Sauveur, en bordure des étangs de Pont-Chouette. 30/07/1999, (L.B.). XS 98.

► *Ranunculus auricomus*

- Mentionnée (M.C.) sur la maille XS 87 en 1996 (communes de Moncoutant/Moutiers-sous-Chantemerle).

► *Salix caprea*

- Commune de Montravers, bois du Vieux Deffend, le 03/10/1999, (L.B.). XS 79.
- Commune de Borcq-sur-Airvault, au lieu-dit "Les Plantons" en octobre 1999, (L.B.). YT 29.

Cette espèce est assez rare en bocage, à la différence de *Salix atrocinerea* qui est l'espèce dominante partout.

► *Scandix pecten-venertis*

- Commune de Noirterre, coteaux de Badart vers le pont romain. Mars 1999, (L.B.). XS 99.

► *Sorbus domestica*

- Commune de Pas-de-Jeu, au bois de Lairé. 14/08/1999, (L.B.). YT 20.
- Commune de Chambrotet, bois de Pallain. Octobre 1999, (L.B.). XS 99.

- *Spiraea salicifolia*
 - Commune de Bressuire, à la sortie de Saint-Porchaire vers le centre équestre au bord de la R.D. n° 938 ter. 09/07/1999, (L.B.). XS 99.
- *Tulipa sylvestris* subsp. *australis*
 - Commune de Massais, le site de la Salette a été détruit suite à la construction d'une route (donnée Bernard CANTAUT). XT 90.
 - Commune de Mauzé-Thouarsais. Mai 1999, (L.B.). YT 00.
- *Urtica urens*
 - Commune de Clessé, anciens moulins de Saint-Benoît. 23/07/1999, (L.B.). XS 98.
- *Veronica montana*
 - Commune de Breuil-Chaussée au château de Blanchecoudre. 19/07/1999, (L.B.). XS 88.
- *Viburnum opulus*
 - Commune de Montigny à "La Pommeraie". 23/09/1999, (L.B. et F.-J.R.). XS 98.
- *Wolffia arrhiza*
 - Commune de Clazay, station de lagunage. 02/08/1999, (L.B.). XS 88.
 - Commune de Noirlieu, station de lagunage. 02/08/1999, (L.B.). XS 99.

Contribution de Jean TERRISSE

- *Allium roseum*
 - Petit-Breuil-Deyrançon, 3 pieds fleuris en lisière sud du bois du Grand Breuil (18 mai 1999).
- *Avenula pratensis*
 - Assais, coteau dominant la vallée du Gâteau, RR dans une pelouse calcicole (9 juin 1999).
- *Campanula persicifolia*
 - Assais, lisière nord du bois des Places, le long de la D. 29, 3 pieds fleuris (9 juin 1999).
- *Carduncellus mitissimus*
 - Petit-Breuil-Deyrançon, commun dans les clairières du bois du Grand Breuil (18 mai 1999).
- *Carex depauperata*
 - Xaintray, bois de Pichenin, une vingtaine de touffes en 2 stations au fond de la vallée (7 juin 1999).
- *Carex laevigata*
 - Moutiers-sous-Chantemerle, forêt de Chantemerle, quelques pieds dans un layon (21 juillet 1999) ;
 - Saint-Aubin-de-Bobigné, étang de la forêt de Boissière (21 juillet 1999).
- *Euphorbia esula*
 - Petit-Breuil-Deyrançon, au moins 200 pieds dans les ourlets de la partie sud du bois du Grand Breuil (18 mai 1999).
- *Galium debile*
 - Séligné, communal des Bouasses, abondant (9 juin 1999) ;
 - La Peyratte, étang de Coigné, abondant (8 juin 1999).
- *Chamaespartium sagittale*
 - Assais, micro-pelouse vers les Clouzelières (9 juin 1999).
- *Gratiola officinalis*
 - Séligné, communal des Bouasses, au moins 150 individus en mélange avec *Ranunculus ophioglossifolius* (9 juin 1999).

- *Juncus compressus*
 - Bougon, chaumes de Gandomé, quelques taches (18 mai 1999).
- *Lathyrus pannonicus*
 - Bougon, chaumes de Gandomé, abondant (18 mai 1999).
- *Legousia speculum-veneris*
 - Le Chillou, moisson au sud du bois des Aix, quelques pieds (9 juin 1999).
- *Littorella lacustris*
 - Saint-Aubin-de Bobigné, étang de la forêt de Boissière (21 juillet 1999). Etangs très riches décrits en Z.N.I.E.F.F. en 1992 - présence de *Pilularia globulifera*, *Utricularia australis*, *Anagallis minima*, *Exaculum pusillum*, etc. - situés dans une forêt désormais ceinturée d'une clôture de 2 mètres de hauteur.
- *Lysimachia nemorum*
 - Moutiers-sous-Chantemerle, forêt de Chantemerle, vue en 2 stations totalisant au moins 200 pieds (21 juillet 1999).
- *Orchis laxiflora*
 - Séligné, communal des Bouasses, quelques pieds dans une prairie méso-hygrophile (9 juin 1999).
- *Orobanche teucriti*
 - Assais, lisière sud du bois de Saint-Loup au-dessus de la D. 29, quelques pieds (9 juin 1999).
- *Pimpinella major*
 - Moutiers-sous-Chantemerle, forêt de Chantemerle, une centaine de pieds dans un ourlet calcifuge hémi-sciaphile longeant la route menant à Chantemerle. Cette espèce euro-sibérienne est très rare en Poitou-Charentes où c'est la première fois que nous la voyons (21 juillet 1999).
- *Ranunculus ophioglossifolius*
 - Séligné, communal des Bouasses, probablement plus d'un millier de pieds fleuris dans les dépressions longuement inondables du communal (9 juin 1999).
- *Sedum rubens*
 - Assais, lisière nord du bois des Places, le long de la D. 29, au moins 250 pieds (9 juin 1999).
- *Stellaria uliginosa*
 - Moutiers-sous-Chantemerle, forêt de Chantemerle, quelques pieds dans un zone suintante (21 juillet 1999).
- *Trifolium squamosum*
 - Séligné, communal des Bouasses, çà et là dans une prairie méso-hygrophile (9 juin 1999).
- *Utricularia australis*
 - La Peyratte, étang de Coigné, plus d'un millier de pieds (8 juin 1999) (également vus : *Littorella lacustris*, *Potamogeton gramineus*, *Myriophyllum alterniflorum*, déjà signalés ici).
- *Veronica anagalloides*
 - Séligné, communal des Bouasses, une station dans un fossé coupant le communal (9 juin 1999). (Autres espèces remarquables vues ici en 1992 : *Juncus anceps* et *Deschampsia media*).

84 - Département du Vaucluse

Contribution de Jean-Pierre JACOB

- *Carex remota*
 - Avignon, Islon de la Barthelasse. 7 mai 1999.

Une population d'une dizaine de touffes découverte en préparant une sortie de la Société de Botanique du Vaucluse sur la partie nord de cet Islon. Ce site a fait l'objet d'un dossier de demande d'arrêté préfectoral de protection de biotope monté en novembre 1997 par l'association *RIVES d'Avignon*, avec l'aide de la D.I.R.E.N. Provence - Alpes - Côte-d'Azur, et concernant un site fluvial (vasière, roselière, ripisylve) propriété de la Compagnie Nationale du Rhône.

Ce *Carex* est protégé dans le département du Vaucluse. C'est la première espèce végétale protégée découverte sur ce site qui abrite plus de 83 espèces animales faisant l'objet d'une protection.

A noter que *Carex remota* est présent également à moins de 100 mètres du Pont d'Avignon (B. GIRERD - Mise à jour 1997, page 8). Avant ces stations des berges du Rhône, il était signalé dans le Luberon dans les gorges de l'Aigue-Brun et dans la Combe de Lourmarin (B. GIRERD, 1991 - *Flore du département de Vaucluse*, page 91).

85 - Département de la Vendée

Contribution de : Jean-Marc THIRION

- *Ceratophyllum submersum*
- Olonne-sur-Mer, forêt d'Olonne : dans une mare dunaire, à l'extrémité du chemin des Grands Chevaux. Mai 2000.
- *Ophioglossum vulgatum*
- Brem-sur-Mer, le Havre de la Gachère : dépression à *Salix repens* subsp. *arenaria*, plus de 10 pieds. Mai 2000.

86 - Département de la Vienne

Contributions de : Yves BARON (Y.B.), Antoine CHASTENET (A.C.), Patrick GATIGNOL (P.G.), Alain METAIS (A.M.), Jean-Pierre RING (J.-P.R.), SBCO-86 (découvertes collégiales lors des sorties)

- *Acer monspessulanum*
- Château Larcher. Camp Alaric. Sur toute la corniche. 8 avril 1999. (A.C.).
- Quinçay. Château Gaillard. Sur toute la corniche. 9 avril 1999. (A.C.).
- *Ajuga genevensis*
- Château-Larcher. Les Chaumes. Une plaque. 15 mai 1999. (Y.B.).
- *Ammi majus*
- Vouneuil-sur-Vienne. Moulin de Chitré. 22 juin 1999. (A.C.).
- Brux. 19 septembre 1999. (Y.B.).
- *Anthemis arvensis*
- Château-Larcher. Plateau de Thorus. 25 mai 1999. (P.G.).
- *Anthericum ramosum*
- Bonnes. Les Pierres percées, avec *Fumana procumbens*, *Linum tenuifolium*. 29 octobre 1999. (Y.B.).
- *Armeria alliacea*
- Orches. Les Varennes d'Orches. Quelques pieds repérés par F. BOTTÉ. 27 mars 1999. 1725E. (P.G.).
- *Asplenium trichomanes* subsp. *pachyrachis*
- Château-Larcher. Camp Alaric. Quelques pieds sur une falaise. 24 février 1999. 292-5147. 1727E. (P.G.).

➤ *Callitriche hamulata*

- Champagné-Saint-Hilaire. Le Pâtural des Chiens. Dans un fossé avec *Ranunculus trichophyllus* et *Ranunculus peltatus*. 25 avril 1999. 446-2149. 1728E. (P.G.).

➤ *Campanula persicifolia*

- Chiré-en-Montreuil. Champdorin. 15 juin 1999. (Y.B.).

➤ *Capsella rubella*

- Montreuil-Bonnin. 5 avril 1999. (A.C.).

➤ *Carex brizoides*

- Lathus. La Barlotière et le Moulin Moreau. 1^{er} avril 1999. 1928E. (P.G.).

➤ *Cephalanthera rubra*

- Valdivienne. Le Pas de Saint-Martin, avec *Aceras anthropophorum*, *Peucedanum cervaria*. 25 mai 1999. (Y.B.).

- Bonnes. Les Perlots, avec *Ophrys apifera* (dont un individu hypochrome), *Limodorum abortivum*. 27 mai 1999. (Y.B.).

- Jardres. Bois-Semé. 27 mai 1999. (Y.B.).

➤ *Corydalis solida*

- Lathus. La Barlotière et le Moulin Moreau. 3 avril 1999. 1928E. (P.G.).

- Château-Larcher. Camp Alaric. Nombreux pieds bien fleuris. 23 février 1999. 292-5146. 1727E. (J.-P.R.).

- Availles-Limouzine. Route de Millac. 27 avril 1999. (Y.B.).

➤ *Cucubalus baccifer*

- Leigné-les-Bois. Les Marchais. 14 juillet 1999. (A.M.).

➤ *Cystopteris fragilis*

- Lussac-les-Châteaux. Vallon de Chantegros. 1^{ère} station de la Vienne (signalé à Vouneuil-sur-Vienne et Lathus par SOUCHÉ, mais jamais signalé depuis), avec *Dryopteris affinis* subsp. *borreri*, *D. affinis* subsp. *affinis* et *D. dilatata*. 8 mai 1999. Francois BOTTÉ, (A.C.) et SBCO-86.

➤ *Daphne laureola*

- Savigny-Lévescaut. Entrée ouest du bourg. 21 janvier 1999. (Y.B.).

- Persac. Vallon boisé entre Villars et Bagneux. 19 avril 1999. (Y.B.).

- Marnay. La Jarrige. 3 mai 1999. (Y.B.).

- Poitiers. Vallée de la Boivre, près des remparts. 8 juin 1999. (Y.B.).

- Bignoux. D.6, vers la Liennerie. 21 janvier 2000. (Y.B.).

➤ *Digitalis lutea*

- Chiré-en-Montreuil. Champdorin. 15 juin 1999. (Y.B.).

- Quinçay. Pré Bernard près de Beauvoir. De nombreux pieds avec *Lonicera caprifolium*. 17 avril 1999. (A.C.).

➤ *Epilobium montanum*

- Persac. Bois de Ludé. 24 mai 1999. (Y.B.).

- Montreuil-Bonnin. Le Parc. 27 juin 1999. (Y.B.).

➤ *Epipactis microphylla*

- Salles-en-Toulon (Valdivienne). Entre le Charrault et Mallée. 25 mai 1999. (Y.B.).

➤ *Epipactis muellertii*

- Bonnes. Saint-Pierre-d'en-Haut : 1 pied près du pied de *Ruta graveolens* signalé par A. BARBIER en 1976. 14 juin 1999. (Y.B.).

➤ *Euphorbia platyphyllus*

- Brux. La Touche. Espèce non revue depuis fort longtemps en compagnie de *Leonurus marrubiastrum* et *Inula britannica* découvert par J. TERRISSE le long de la Bouleure. 1^{ère} station récente signalée dans la Vienne. 2 septembre 1999. (P.G.), (Y.B.) et (A.C.).

► *Fumaria muralis*

- Availles-Limouzine. Moulin de Vareilles. 1^{ère} station récente dans la Vienne pour ce taxon à préciser dont deux formes sont signalées par SOUCHE dans le sud de la Vienne. 27 avril 1999. (Y.B.).

► *Chamaespartium sagittale*

- Lavoux. Taillis-Joseph, avec *Aceras anthropophorum*, *Anacamptis pyramidalis*, *Cephalanthera longifolia*, *Limodorum abortivum*. 22 mai 1999. SBCO-86.

► *Geranium sylvaticum*

- Brigueil-le-Chantre. Prairie près de l'Asse, au sud du bourg, abondant (connu 3 km en amont sur la rive gauche au niveau d'Eports, cf. Bull SBCO 14, et 28). 30 avril 1999. (Y.B.).
- Thollet. Terme de la route du Bouchaud, dans un vallon, abondant. Nouvelle station. 30 avril 1999. (Y.B.).

► *Helianthemum salicifolium*

- Moulinet. Avec *Coronilla minima* et *Avenula pubescens*. 13 mai 1999. (A.C.).
- Les Braudinières à Chiré-en-Montreuil. 25 avril 1999. (A.C.).

► *Hesperis matronalis*

- Quinçay. Marais de l'Auxance en aval de Masseuil. 24 mai 1999. (Y.B.).

► *Iberis amara*

- Lavoux. Anciennes carrières. 22 mai 1999. (Y.B.).

► *Laserpittium latifolium*

- Quinçay. Forêt de Saint-Hilaire, bord de la D6. 24 avril 1999. (Y.B.).

► *Lathyrus niger*

- Latillé. Bois de la Cour. Avec : *Digitalis lutea*, *Euphorbia dulcis*, *Isopyrum thalictroides*, *Luzula pilosa*, *Peucedanum cervaria*, *Peucedanum gallicum* et *Phyteuma spicatum*. 18 avril 1999. (A.C.).

► *Lathyrus tuberosus*

- Chasseneuil. Près du Futuroscope. 27 mai 1999. (A.C.)

► *Luzula pilosa*

- Latillé. Bois de la Cour. Avec : *Digitalis lutea*, *Euphorbia dulcis*, *Isopyrum thalictroides*, *Lathyrus niger*, *Peucedanum cervaria*, *Peucedanum gallicum*, *Phyteuma spicatum*. 18 avril 1999. (A.C.).

► *Mentha pulegium*

- Fontaine-le-Comte. Les Chaumes. Avec *Lythrum hyssopifolia*. 3 août 1999. (Y.B.).
- Chaunay. Les Mares. 1^{er} septembre 1999. (Y.B.).

► *Nymphoides peltata*

- Coulombiers. Étang à la Turpauderie. Nouveauté pour la Vienne. Abondant, mais de spontanéité douteuse (proximité de la ferme, *Chamaecerasus* sur la berge). 26 septembre 1999. (Y.B.).

► *Oenanthe aquatica*

- Pleumartin. Mare Languillé. 11 juillet 1999. (A.M.).
- Leigné-les-Bois. Mare les Trente Boisselées. 14 juillet 1999. (A.M.).

► *Oenanthe lachenalii*

- Gouex. Etang de Fontmorin. Nombreux pieds disséminés dans la queue de l'étang. 26 août 1999. (P.G.) et (A.M.).

► *Potamogeton lucens*

- Leigné-les-Bois. Mare les Trente Boisselées. 14 juillet 1999. (A.M.).

► *Potamogeton trichoides*

- Usson-du-Poitou. Etang de Beauregard. En compagnie de *Potamogeton gramineus*, *P. crispus*, *P. lucens* et de *Najas marina*. 27 août 1999. (P.G.), (A.M.).

- *Primula elatior*
 - Lathus. La Barlotière et le Moulin Moreau. 2 avril 1999. 1928E. (P.G.).
- × *Primula tommasinii*
 - Montamisé. Forêt de Moulière. 6 avril 1999. (A.C.).
 - Latillé. Brin. (2 sortes d'hybrides). 24 mars 1999. (A.C.).
- *Ranunculus lingua*
 - Vouneuil-sous-Biard. Bord de la Boivre, 2 stations retrouvées (environ 20 pieds qui avaient été signalés en juillet 1984, seule station actuellement connue dans le département). 23 juin 1999. (A.M.).
- *Ranunculus ophioglossifolius*
 - Pleumartin. Mare aux Soins, 10 pieds de cette espèce nouvelle pour le département, avec *Alisma lanceolatum*, *Eleocharis palustris*, *Oenanthe aquatica* et *Oenanthe fistulosa*. 27 août 1999. (A.M.).
- *Ranunculus paludosus*
 - Chiré-en-Montreuil. Les Braudinières près de Cillais. 7 avril 1999. (A.C.).
 - Quinçay. Château Gaillard. Sur toute la corniche. 9 avril 1999. (A.C.).
- *Rorippa silvestris*
 - Brux. Le Roty, lit de la Bouleur, tapissante. 2^{ème} station récente signalée dans la Vienne. 19 septembre 1999. (Y.B.).
- *Scirpus lacustris* subsp. *lacustris*
 - Pleumartin. Mare Languillé. 11 juillet 1999. (A.M.).
 - Leigné-les-Bois. Mares les Marchais et Trente-Boisselées. 14 juillet 1999. (A.M.).
 - Chauvigny. Mare en forêt de Mareuil. 23 juillet 1999. (A.M.).
- *Scleranthus perennis*
 - Brigueuil-le-Chantre. Gué d'Epports. 30 avril 1999. (Y.B.).
- *Sedum rubens*
 - Civaux. Au pied du coteau du Peu. 15 mai 1999. (Y.B.).
 - Biard. La Cassette, vieux mur le long de la montée au bourg. 8 juin 1999. (Y.B.).
 - Vouneuil-sur-Vienne. Le Bas Villiers et prieuré de Savigny. 26 septembre 1999. (Y.B.).
 - Coulombiers. Berme près des Hayes. 26 septembre 1999. (Y.B.).
- *Senecio inaequidens*
 - Vouneuil-sur-Vienne. Moulin de Chitré. Avec : *Carduus crispus*, *Erigeron karvinskianus* (signalé en 1997) et *Panicum capillare*. 12 mai 1999. (A.C.).
- *Serapias lingua*
 - Persac. Pont de Cliel, parking. 8 pieds. 24 mai 1999. (Y.B.).
- *Setaria pumila* (= *glauca*)
 - Chapelle-Moulière. Forêt de Moulière. 20 août 1999. (A.C.).
- *Sison amomum*
 - Montreuil-Bonnin. Le Pinier du Parc. 27 juin 1999. (Y.B.).
 - Iteuil. Aigne. 7 août 1999. (Y.B.).
 - Brux. La Bouleur, à la Touche. 18 septembre 1999. (Y.B.).
 - Roches-Prémaries. Route de Nouaillé. 18 septembre 1999. (Y.B.).
 - Roches-Prémaries. Rabiou, avec *Stachys annua*. 22 août 1999. (Y.B.).
 - Lhonnaizé. Étang des Mornes. 28 août 1999. SBCO-86.
 - Iteuil. Chêne-Brault, près du Chêne (pédonculé) à Gui. 19 novembre 1999. (Y.B.).
- *Stachys alpina*
 - Montreuil-Bonnin. Bois du Parc, près du Moulin du Roi. 27 juin 1999. (Y.B.).
 - Bonnes. Bois Rullon. 14 juin 1999. (Y.B.).
 - Z.N.I.E.F.F. de Montreuil-Bonnin. Avec : *Primula* × *tommasinii*, *Dentaria bulbifera* (plusieurs centaines), *Galium odoratum* (des gros tapis) mais *Veronica montana* n'a pas été vue. 16 mai 1999. (A.C.).

- *Stachys arvensis*
 - Brux. Champ de tournesol à la Touche. 3^{ème} mention pour la Vienne. 1^{er} septembre 1999. (Y.B.).
- *Stachys palustris*
 - Biard. Bord de la Boivre, la Casette (2 pieds). 23 juillet 1999. (A.M.).
- *Teucrium scordium*
 - Brux. Lit de la Bouleur, à la Touche. 1^{er} septembre 1999. (Y.B.).
- *Thalictrum flavum*
 - Vivonne. Étang Danlot. 13 juin 1999. (A.M.).
- *Ulmus glabra*
 - Persac. Pont de Cliel. 24 mai 1999. (Y.B.).
- *Utricularia australis*
 - Chaunay. Les Mares. 1^{er} septembre 1999. (Y.B.).
- *Valeriana walrothii* Kreyer
 - Roiffé. Lisière du Bois Guerin. Cette espèce se différencie de *Valeriana officinalis* par ses feuilles caulinaires moyennes courtement pétiolées divisées en nombreux segments étroits et peu dentés et son écologie différente (lisières thermophiles). A rechercher. 17 juin 1999. (P.G.).
- *Veronica prostrata*
 - Marnay. La Jarrige. 3 mai 1999. (Y.B.).
- *Viola alba* subsp. *dehnhardtii*
 - Château-Larcher. Camp Alaric. Haut de la corniche (Détermination : Marc ESPEUT). 25 février 1999. 292-5148. 1727E. (P.G.).
- *Viola alba* subsp. *alba*
 - Lussac-Les-Châteaux. Lisière de la forêt de Lussac. Plusieurs pieds disséminés le long de la lisière. 2 mars 1999. 322-5144.1828E. (P.G.).

Contribution de Dominique PATTIER

- *Duchesnea indica*
 - Saint-Sauvant. Plante naturalisée dans la forêt domaniale, près du carrefour des Anglais (30 mai 1999).
- *Salvia sclarea*
 - Neuville-du-Poitou. Des dizaines de pieds sur les talus de la D. 18, au nord d'Étables (1^{er} juillet 1999).

Contribution de Jean TERRISSE

- *Achillea ptarmica*
 - Saint-Martin-l'Ars, étang de Saint-Liguaire, rare (également : *Pulicaria vulgaris* déjà connue ici), étang très riche décrit en Z.N.I.E.F.F. en 1986, désormais ceinturé d'une clôture de 2 mètres de hauteur destinée à protéger des aménagements à fins cynégétiques !
- *Galium boreale*
 - Chaunay, très abondant dans 3 prairies méso-hygrophiles de fauche bordant la Bouleur au sud-est des Bertons (plusieurs milliers de pieds fleuris le 27 juillet 1999).
- *Inula britannica*
 - Brux, vue en 2 points des rives de la Bouleur entre la Touche et Brux, totalisant environ 450 pieds (en pleine floraison le 27 juillet 1999) ;
 - Chaunay : vue en 1 point des rives de la Bouleur sous les Bertons, au moins 100 pieds (27 juillet 1999).

► *Leonurus marrubiastrum*

- Brux, rives de la Bouleur (à sec !), entre Brux et Chaunay, au nord de la Touche, probablement plus d'un millier de pieds, la plante occupe typiquement la partie haute des berges en compagnie d'*Althaea officinalis* (très abondante ici), mais aussi, de manière plus surprenante, des sortes de "terrasses alluviales" (la Bouleur connaît-elle des crues en hiver ?) colonisées par des friches inondables à *Althaea officinalis*, *Urtica dioica*, *Arctium* sp., *Epilobium* gr. *tetragonum*, etc ; dans cette seconde situation, les pieds de *Leonurus* peuvent être éloignés de plus de 100 m du lit mineur de la Bouleur. Rappelons que l'espèce était signalée « entre Brux et Chaunay » au XIX^{ème} siècle dans la flore de SOUCHÉ (27 juillet 1999).

► *Marsilea quadrifolia*

- Asnières-sur-Blour, l'espèce est toujours présente à l'étang des Écluseaux où vue en une unique mais importante station de 150 m² à proximité du hameau des Écluseaux, au pied de la bonde nord ; toujours présente également à l'étang du Moulin d'Asnières où vue en 2 points totalisant une centaine d'individus, notamment à l'extrémité nord de l'étang où aboutit le ruisseau du Flambeau ; vainement recherchée en revanche à l'étang de Villedon malgré une prospection attentive d'une grande partie de sa rive sud (26 août 1999).

► *Myriophyllum alterniflorum*

- Le Vigeant, abondant dans l'étang de la Mondie (également : *Najas marina*, *Littorella lacustris*, *Gratiola officinalis*, *Potamogeton gramineus*, déjà vues là en 1988) (25 août 1999).

Erratum : Luc BIANCHINI a relevé une erreur dans les "Contributions à l'inventaire de la flore" du bulletin n° 30, page 227, au sujet de la station de *Potamogeton berchtoldii* : Curçay-sur-Dive est une commune du département de la Vienne (et non des Deux-Sèvres).