

**Corrections  
et compléments syntaxonomiques  
pour des publications antérieures  
(*Helianthemetalia* ;  
*Corynephoretalia* ; *Bidentetea*)**

Jean-Claude FELZINES \*

Dans 3 articles précédemment publiés en collaboration avec J.-E. LOISEAU des omissions ont été faites dans la désignation des types de quelques syntaxons. L'article 19 du Code International de Nomenclature Phytosociologique (CINP) (WEBER *et al.*, *J. Vegetation Science*, 2000, **11** : 739-768) indique que le choix du lectotype doit être accompagné d'une référence précise à la publication valide de l'élément choisi. La référence est précise quand elle localise la publication (nom de la revue, titre de l'ouvrage, etc., le volume et, depuis le 1.1.2002, la page ( cf. art. 2 b, note 3). Dans le cas où la publication du nom des syntaxons concernés serait avérée invalide selon l'art. 3o par une stricte application de l'art. 2b, note 3, les corrections suivantes sont destinées à rendre leur publication valide *hoc loco*. Cependant, il est demandé que la mise en conformité avec les règles du Code, susceptible d'entraîner l'actualisation de la date de cette publication, ne modifie pas la citation des auteurs malgré le décès de J.-E. LOISEAU en 2008.

**I - [*Helianthemetalia*]** Felzines J.-C. et Loiseau J.-E., 2005 - Groupements thérophytiques printaniers acidiphiles médio-ligériens. Contribution à la structuration de l'alliance *Thero-Airion* et de l'ordre des *Helianthemetalia guttati* (classe des *Tuberarietea*). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, N.S., **35** [2004] : 3-54.

**1 - Corrections p. 20-21**

**Ordre**

- *Helianthemetalia guttati*

Remplacer *Helianthemetalia guttati* (Br.-Bl. in Br.-Bl., Molin. et H. Wagner 1940) Felzines et Loiseau *hoc loco* par *Helianthemetalia guttati* Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Molin. et H. Wagner 1940.

---

\* J.-Cl. F. : Lallé, F - 19120 TUDEILS.

Remplacer Typus par Lectotypus et compléter *Helianthemion guttati* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molin. et H. Wagner 1940 par (Prodrome des groupements végétaux, fasc. 7 : 32).

### Alliances

#### - *Thero-Airion*

Remplacer Typus par Lectotypus et compléter *Filagini - Vulpietum* Oberd. 1938 par [désigné par RIVAS-MARTINEZ, 1978 : *Coll. phytosociol.* **VI**, p. 62].

#### - *Arabidopsion thalianae*

Ajouter : Lectotypus : *Myosotido strictae - Arabidopsietum thalianae* Passarge (1962) 1977 (*Feddes Repertorium*, **88** (7-8) : 517).

#### - *Ventention dubiae*

Remplacer Typus : *Ventenato dubiae - Xeranthemetum foetidae* (Borza 1950) Paun 1964 par Holotypus : *Ventenato dubiae - Xeranthemetum cylindracei* Borza 1950 corr. Sanda, Popescu et Peicea 1988 (SANDA, POPESCU et PEICEA, 1988, *Rev. Roumaine Biol.*, sér. *Biol. vég.*, **33** : 16).

### Sous-alliances

#### - *Micropyrenion tenelli*

Remplacer Typus par Holotypus et compléter *Narduretum lachenalii* Korneck 1975 par (*Beitr. naturk. Forsch. Südw.-Dtl.*, **34** : 161).

#### - *Vulpienion bromoidis*

Remplacer *Vulpienion bromoidis* Felzines et Loiseau *nom. nov.* (= *Airienion caryophylleo - praecocis* Rivas Mart. 1978, *nom. inval. et illeg.*, art. 3a et b, 29). Typus : *Vulpio bromoidis - Trifolietum subterranei* Wattez et al. 1978 par *Airenion* ["*Airienion*"] *caryophylleo - praecocis* Rivas-Martinez 1978 (= *Thero-Airenion* Tüxen 1951, *nom. nud.*). [Même type que l'alliance : *Filagini - Vulpietum* Oberd. 1938 (art. 19 b)].

Remplacer *Vulpienion bromoidis* par *Airenion caryophylleo - praecocis* dans les pages 1 (résumé), 19, 31 (tableau C) et 33.

## 2 - Additions p. 22-25 : Bibliographie

BRAUN-BLANQUET, J., MOLINIER, R. et WAGNER, H., 1940 - Prodrome des groupements végétaux. Cercle de végétation méditerranéen. Classe *Cisto - Lavanduletea* Braun-Blanq. 1940. *Comité international du Prodrome Phytosociologique*, Montpellier, **7** : 1-53.  
SANDA, V., POPESCU, A. et PEICEA, I., 1988 - *Rev. Roumaine Biol.*, sér. *Biol. vég.*, **33** : 11-19.

**II - [Bidentetea]** Felzines J.-C. et Loiseau J.-E., 2006 - Les groupements fluviatiles des *Bidentetea* de la Loire moyenne, du Bas-Allier et de la Dordogne moyenne. Modifications apportées à la synsystème de la classe des *Bidentetea*. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 36 [2005] : 159-204.

### 1 - Corrections p. 172 et 174

Remplacer *Polygono hydropiperis - Bidentetum* (Lohmeyer in Tüxen 1950) Passarge 1955 par *Polygono hydropiperis - Bidentetum tripartitae* Tüxen 1950 ex Passarge 1955.

### 2 - Corrections p. 175 et 176

#### - *Bidentition tripartitae*

Remplacer (*typus* : *Bidenti - Ranunculetum scelerati* Miljan in Tüxen 1979) par (*lectotypus* : *Polygono hydropiperis - Bidentetum tripartitae* Tüxen 1950 ex Passarge 1955 (*Feddes Repertorium*, **135** : 228 (tab. XV)).

Remplacer *Polygono hydropiperis - Bidentetum* (Lohmeyer in Tüxen 1950) Passarge 1955 par *Polygono hydropiperis - Bidentetum tripartitae* Tüxen 1950 ex Passarge 1955.

#### - *Chenopodietalia rubri*

Remplacer (*typus* : *Chenopodion rubri* (Tüxen ex Poli et J. Tüxen 1960) Kopecky 1969) par (*holotypus* : *Chenopodion rubri* (Tüxen 1960) Hilbig et Jage 1972 (*Hercynia N.F.*, **9** : 399)).

#### - *Chenopodion rubri*

Remplacer *Chenopodion rubri* (Tüxen ex Poli et J. Tüxen 1960) Kopecky 1969 par *Chenopodion rubri* (Tüxen 1960) Hilbig et Jage 1972.

Ajouter : (*lectotypus* [désigné par WISSKIRCHEN, 1995] : *Polygono brittingeri - Chenopodietum rubri* Lohmeyer 1950 (*Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F.*, **2** : 12)).

#### - *Spergulo arvensis - Corrigiolenion litoralis*

Remplacer (*typus* : *Chenopodio polyspermi - Corrigioletum litoralis* Hülbusch et Tüxen ex Tüxen 1979) par (*holotypus* : *Chenopodio polyspermi - Corrigioletum litoralis* Hülbusch et Tüxen ex Wisskirchen 1995 (*Dissertationes Botanicae*, **236** : 190)).

#### - *Chenopodienion rubri*

Remplacer (*typus* : *Polygono brittingeri - Chenopodietum rubri* Lohmeyer 1950) par (*holotypus* : *Polygono brittingeri - Chenopodietum rubri* Lohmeyer 1950 (*Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F.*, **2** : 12) [identique à celui de l'alliance]).

- *Eragrostienion pilosae*

Remplacer (*typus*: *Echinochloa muricatae*-*Amaranthetum pseudogracilis* Wisskirchen 1995) par (*holotypus*: *Echinochloa muricatae* - *Amaranthetum pseudogracilis* Wisskirchen 1995 (*Dissertationes Botanicae*, **236**: 152).

- *Xanthion italici*

Remplacer (*typus*: *Polygono* - *Xanthietum italici* Pirola et Rosetti 1974) par (*holotypus*: *Polygono* - *Xanthietum italici* Pirola et Rosetti 1974 (*Not. Fitosoc.*, **8**: 18 (tab. 1).

### 3 - Additions p. 177 - 181 : Références bibliographiques

HILBIG, W. et JAGE, H., 1972 - Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teils der DDR. V : Die annualen Uferfluren (*Bidentetea tripartitae*). *Hercynia N.F.* (Leipzig), **9**: 392-408.

LOHMEYER, W., 1950 - Das *Polygoneto brittingeri* - *Chenopodietum rubri* und das *Xanthieto riparii* - *Chenopodietum rubri*, zwei flussbegleitende *Bidention*-Gesellschaften. *Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., N.F.*, **2**: 12-20.

PIROLA, A. et ROSSETTI, A., 1974 - *Polygono* - *Xanthietum italici* ass. nova, vegetazione di greto del corso medio del Reno (Bologna). *Not. Fitosoc.*, **8**: 15-27.

**4 - Correction p. 204 dernière ligne** : remplacer Rosetti par Rossetti

**III - [Corynephorretalia]** Loiseau J.-E. et Felzines J.-C., 2007 - Les groupements des pelouses à *Corynephorus canescens* des vallées de l'Allier et du cours moyen de la Loire (Auvergne, Bourgogne, Centre ; France). Nouvelle composition des *Corynephorretalia canescentis*. *J. Bot. Soc. Bot. France*, **39**: 57-77.

### Correction p. 71

**Alliance** : *Miboro minimae* - *Corynephorion canescentis*

Compléter Holotypus : *Astrocarpo purpurascens* - *Corynephorretum canescentis* Br.-Blanq. 1967 par (*Anales de Edafologia y Agrobiolog.*, **26** (1-4) : 79 et tab. VI p. 84).