

Contributions à l'inventaire de la flore

Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, les trouvailles intéressantes qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, avant le 31 mars, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants :

- le nom de la plante ;
- le lieu exact avec indication de la commune en premier lieu, puis du lieudit (en fournissant, si possible, les coordonnées U.T.M.) et la date de la découverte ;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station ;
- les contributions seront classées par département (en suivant l'ordre des numéros minéralogiques) et à l'intérieur de chaque département par ordre alphabétique des genres.

On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le bulletin précédent.

Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce - qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de

doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du "Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination confirmée par ...".

De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :

- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier ;
- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop communes ;
- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

15 - Département du Cantal

Contribution de Paméla LABATUT

► *Collomia grandiflora*

- Dienne, entre les villages de Drils et Buge. 27.07.2009.

17 - Département de la Charente-Maritime

Contribution de Paméla LABATUT

► *Ophrys apifera*

- Saint-Georges-de-Didonne, chemin du littoral près de la pointe de Suzac. Plusieurs pieds parmi de belles touffes de *Dorycnium pentaphyllum*. 23.05.2009.

Contribution de Christian YOU

► *Achillea ptarmica*

- Bussac-Forêt, piste de la Lagune (D 256), au sud de Bussac-Forêt avec *Sanguisorba officinalis*, *Galium boreale*, *Carum verticillatum*, *Pimpinella saxifraga*, *Oenanthe pimpinelloides*. 13.07.2009.

► *Anemone nemorosa* L. var. *grandiflora* Rouy & Foucaud [1893]

- Saint-Genis-de-Saintonge, à l'est du château de Plassac, la Loge, bois de charmes le long de la D 253, des milliers de pieds. Cette variété diffère de l'espèce type par sa robustesse, 25-35 cm, des feuilles plus largement lobées à segments larges obtusément crénelés. Les fleurs sont grandes, 4-7 cm, souvent teintées de bleu pâle, à 7-12 pétales avec parfois, en mélange, des pièces pétaliformes s'ajoutant. Pédoncule pubescent ainsi que les carpelles. 2.04.2009.

► *Centaurea jacea* var. *decipiens*

- Bussac-Forêt, espèce signalée par l'un d'entre nous [Patrick GATIGNOL], au cours de la Mini-Session Apiacées de septembre 2009, parmi l'impressionnante station de *Peucedanum officinale* du Terrier de la Pilette. Cette variété tardive semble assez commune dans ces landes. 9.09.2009.

► *Euphorbia falcata* var. *acuminata* Lmk

- Pons, Versailles, à la limite est de la forêt de Pons et des bois des Ragideaux, moissons après Bondonnat, le long de la route. Diffère de l'espèce *E. falcata* par sa poussée tardive, d'aspect buissonnant en "pin parasol", à bractées imbriquées, terminées par une longue pointe cartilagineuse saillante. Cette variété est aussi très commune sur les coteaux, dans les moissons calcaires du bord de Gironde aux environs de Mortagne-sur-Gironde. On observe, dès le mois de mai, *E. falcata* dans les vignes calcaires à l'est de Pons, à tige dressée, à feuilles éparses et bractées lâches, simple ou peu rameuse. 17.09.2009.

► *Fraxinus pennsylvanica*

- Taillebourg, chemin de halage du port, 2 beaux arbres, plantés ? À rechercher ailleurs. (Voir la contribution de Richard BOEUF, Tome 34, p. 169 du Bulletin de la SBCO [2003], descriptif et clé des frênes. 7.08.2009.

► *Lathraea squamaria*

- Juicq, avec Yves PEYTOUREAU et J.-C. QUERRÉ, val de la Rutelière à l'ouest d'Étray et dans la coudraie à proximité de Château-Gaillard, des milliers de pieds recensés. On doit attribuer cette découverte d'un grand intérêt à J.-C. QUERRÉ, à proximité de son fameux "Iris des Fontaines" fleurissant l'hiver.
- Saint-Porchaire, Château de la Roche-Courbon (ancienne station), quelques pieds se maintiennent devant les grottes du Bouil Bleu avec *Cardamine impatiens*, *Adiantum capillus-veneris*.
- Romegoux, Freussin, bois de la Métairie (ancienne station), se maintient bien. 24.03.2009.

► *Peucedanum gallicum*

- Bussac-Forêt, à l'entrée de la piste au carrefour de Piégut et de la D 145E8. Station découverte par A. BOURASSEAU et Émile CONTRÉ le 9.09.1970 et retrouvée lors des repérages Apiacées [C. YOU & Y. PEYTOUREAU]. Au cours de la Mini-Session Apiacées du 9 septembre 2009, J.-P. REDURON signale, en notre compagnie, plusieurs stations au Terrier de la Pilette et tout le long de la D 256, de Bussac-Forêt à l'Eau Perdue, (détermination depuis la voiture), ce qui présage de la découverte d'autres stations au sein de ces landes. 9.09.2009.

► *Polystichum aculeatum*

- Saintes, talus de la voie ferrée parallèle à l'espace protégé du marais de La Palu, 1 pied avec, le long du chemin longeant le talus, *Asplenium scolopendrium* (= *Phyllitis scolopendrium*), *Asplenium adiantum-nigrum*, *Cardamine impatiens*, *Erysimum cheiranthoides*, *Ulmus plotii*. 23 juin 2009.
- Saint-Sauvant, Pidou, bois relictuel entouré de grillage, en montant à la cote 71, avec *Polystichum setiferum* et *Polystichum × bicknellii* au milieu des parents, *Asplenium scolopendrium*. 30 décembre 2009.

► *Salix caprea*

- Saint-Léger, près de Pons, sentier forestier au-dessus de la grotte de la Roche-Madame, un seul pied. 23 septembre 2009.

► *Sison amomum*

- Saint-Léger, les Racauds, impasse des Lavandières, plusieurs pieds de plus de 2 mètres de haut, (*amomum* = amome, terme désignant des plantes

aromatiques), odeur de cire d'abeille pour le fruit, de pétrole, de muscade, de mangue pour les feuilles. (Tome 5, p. 2369, Ombellifères de France de J.-P. REDURON).

► *Sison segetum* (= *Petroselinum segetum*)

- Pons, le Coteau, quelques pieds dans mon jardin potager.

Espèce monocarpique, annuelle ou bisannuelle ; des rosettes hivernales se forment en décembre dans mes cultures. 9 septembre 2009.

► *Solidago canadensis*

- Pons, les Chartiers, près du petit étang entouré de grillage, à l'entrée de la Chaussée de Château-Renaud, D 234 E5. 30 août 2009.

► *Solidago gigantea*

- Pons, rue Thiers, jardin d'un particulier. 20 septembre 2009.

► *Solidago graminifolia*

- Corignac, (ancienne station retrouvée par J.-C. MELET) au cours de la Mini-Session Apiacées de septembre 2009, pare-feu le long de la voie ferrée entre les Brandes et la Font Ardilouse, plus de cent pieds. (Tome 5 du bulletin de la SBCO [1974], compte rendu de la Session Extraordinaire de la SBCO du 4 au 9 juillet 1974 à Montendre).

Une autre station (aujourd'hui disparue ?) se situait dans le fossé entre lande et voie ferrée sur la piste parallèle à la D 256, au sud de Bussac-Forêt à proximité du Pas des Charrettes, ruisseau se jetant dans la Saye.

► *Taraxacum anglicum* (nouvelle espèce)

- Berneuil, chez Boizeau, quelques pieds le long d'un sentier forestier dégagé. 14.04.2009.

- Corignac, les Brandes, les Ardillasses, autour des trous d'eau, pelouses marneuses à calcaire maestrichtien. 22.03.2009.

- Pons, Soute, marais à l'est des Pipelards, de beaux exemplaires typiques. 17.04.2009.

- Saintes, berges herbeuses le long du canal, prairie de la Palu. 13.04.2009.

► *Xanthoselinum alsaticum* subsp. *alsaticum* (= *Peucedanum alsaticum*)

- Salignac-sur-Charente, fossé et bord de la D 732, le Renfermis à proximité d'une aire de parking, avant le Pérat et le passage à niveau. Belle station.

33 - Département de la Gironde

Contribution de Paméla LABATUT

► *Allium triquetrum*

- Mérignac, dans le bois de Burck près du ruisseau du Peugue. 09.04.2009. 80 pieds environ recouvrant une vingtaine de m². Cet ail n'est pas encore signalé en Gironde.

► *Tulipa raddii*

- Saint-Seurin-de-Cursac, magnifique station dans vignoble.

37 - Département de l'Indre-et-Loire

Contribution d'Étienne HÉRAULT

Observations réalisées en 2009

- *Campanula persicifolia*
- Abilly, Le Puy Chenier (03.06.2009).
- Paulmy, La Maillère (03.06.2009).
- *Carex halleriana*
- Esvres, Pont Girault (19.05.2009).
- Paulmy, la Maillère (03.06.2009).
- *Cephalanthera longifolia*
- Esvres, la Championnière (19.06.2009).
- Nouzilly, le Moulin de Berton (29.06.2009).
- *Cephalanthera damasonium*
- Esvres, la Championnière (19.06.2009).
- *Epipactis microphylla*
- Esvres, la Guillotière (15.07.2009).
- *Erica ciliaris*
- Abilly, la Taille des Monpas (03.06.2009).
- *Koeleria vallesiana*
- Paulmy, la Maillère (03.06.2009).
- *Lathyrus niger*
- Esvres, pont Girault (19.05.2009).
- Barrou, bois de Cours (16.07.2009).
- *Monotropa hypopitys*
- Nouzilly, bois de la Valencerie (05.06.2009).
- *Oreoselinum nigrum*
- Truyes, prairie de la Vacherie (21.07.2009).
- *Orobanche minor*
- Courcay, la Gagnerie (08.07.2009).
- *Phyteuma spicatum*
- Abilly, le Puy Chenier (03.06.2009).
- *Polystichum aculeatum*
- Crotelle, la Basse Besnardière (09.07.2009).
- *Samolus valerandi*
- Joué-les-Tours, étang du Ponceux (15.07.2009).
- Nouzilly, étang de la Roche (10.07.2009).
- *Silybum marianum*
- Esvres, la Boutetterie (02.07.2009).
- *Tuberaria guttata*
- Abilly, le Puy Chenier (03.06.2009).

Observation réalisées en 2010

- *Nigella arvensis*
 - Saint-Quentin-sur-Indrois, le Grand Ormeau (07.08.2010).
- *Adonis annua*
 - Saint-Quentin-sur-Indrois, le Grand Ormeau (07.08.2010).
- *Carthamus lanatus*
 - Chédigny, plusieurs parcelles autour du lieu-dit Fontenay (30.06.2010).
- *Teucrium scordium*
 - Azay-le-Rideau, île à l'aval du château (29.08.2010).

40 - Département des Landes

Contribution de Pierre DUPONT

- *Alyssum loiseleurii*
 - Hossegor, un beau peuplement correspondant à sa limite nord actuelle se maintient, au voisinage de la limite de Seignosse, sur une parcelle non construite qu'il conviendrait de préserver sur l'arrière-dune à l'extrémité de l'avenue des Tamaris. 21.05.2010. XP 23.
 - Deux petites stations qui existaient au-delà à Seignosse en 1977 en bordure de la route de Vieux-Boucau et avenue du Penon ne paraissent pas s'être maintenues.
- *Ambrosia coronopifolia*
 - Azur, vers Malakoff, au niveau du bassin dessableur du Peyroux. 20.06.2007. XP 34.
 - Antérieurement observé à Hossegor, lotissement de Super-Hossegor, mais non publié. 21.08.1964. XP 23. Signalé pour la première fois dans le département à Capbreton par J. VIVANT en 1970.
- *Calystegia sepium*

Une forme à fleurs roses, mais qui ne possède pas tous les caractères de la subsp. *roseata* existe en quelques points, la plupart légèrement salés, au voisinage du littoral.

 - Moliets, dans la réserve naturelle, au long de l'estuaire du courant d'Huchet, avec François FAURE et Paul LESCLAUX. 03.09.2007. XP 25.
 - Lit-et-Mixe et Saint-Julien-en-Born, abondant sur les deux rives du courant de Contis. 04.09.2007. XP 38.
 - Léon, quelques individus en bordure du petit étang du Paludot. 05.09.2007. XP 35.
 - Saint-Paul-en-Born, fond de l'étang d'Aureilhan. 25.08.2010. XP 49.
- *Digitalis purpurea*
 - Taller et Laluque, sur plusieurs centaines de mètres de part et d'autre de la petite route en limite des deux communes au sud de la D 42 et assez profondément au bord de quelques chemins perpendiculaires. 23.06.2007. XP 55. Probablement d'origine horticole, avec pas mal d'individus albinos et intermédiaires.
- *Eleocharis ovata*
 - Lit-et-Mixe, abondant en bordure de petits plans d'eau creusés dans la plaine

de Pigeon aux niveaux découverts en raison de la sécheresse, en compagnie de *Pycnus flavescens* et de *Polygonum minus*. 04.09.2010. XP 35. N'avait pas été noté dans les Landes, en dehors d'une indication de PERRIS près de Mont-de-Marsan, au milieu du 19^e siècle.

► *Galium murale*

- Vielle-Saint-Girons, pelouses rudéralisées en arrière de la zone de surf et en arrière de Saint-Girons-Plage. 29.04.2007 et 03.05.2007. XP 36. En extension rapide en Gironde et plus au Nord, ne semble pas avoir été indiqué jusqu'ici dans les Landes.

► *Hypericum mutilum*

- Saint-Paul-en-Born, pelouses inondables en bordure du fond de l'étang d'Aureilhan. 25.08.2010. XP 49. Découverte par J. VIVANT vers 1950 en bordure de l'Adour, puis observée à l'étang de Léon par J. DEXHEIMER et F. FAURE, étend donc son aire vers le Nord.

► *Linaria spartea*

- Castets, en bordure de la route de Taller, pelouse sablonneuse sèche plantée de quelques jeunes arbres épars, plus d'une centaine d'individus. 16.05.2008. XP 56. Autrefois répandue dans les terrains cultivés et les friches sablonneuses, cette belle linaria est extrêmement raréfiée.

► *Lindernia dubia*

- Moliets, abondant dans la réserve naturelle sur les vases en bordure de l'estuaire du courant d'Huchet, avec François FAURE et Paul LESCLAUX. 03.09.2007. XP 25.

► *Lotus angustissimus* subsp. *angustissimus*

- Linxe, abondant chemin sablonneux allant vers Saint-Michel-Escalus, sous la ligne électrique à haute tension. 20.06.2007. XP 46. Quoique protégée en région Aquitaine, cette plante n'est probablement pas très rare dans les Landes.

► *Mycelis muralis*

- Azur, bord de chemin à Malakoff. 04.05.2007. XP 34. Rarement indiqué dans le département.

► *Myosotis lamottiana*

- Ce myosotis, d'abord décrit en Auvergne, a été ensuite rencontré dans les montagnes pyrénéo-cantabriques, descendant souvent à basse altitude en Espagne atlantique. C'est Christiane RICARD qui l'a identifié en premier dans les Landes. Il est assez répandu dans les lieux humides du Marensin à Azur, Moliets, Léon, Vielle-Saint-Girons, Lit-et-Mixe, Uza et sans doute ailleurs. Il importera de déterminer où se situe sa limite nord.

► *Rhynchospora fusca*

- Linxe, dépression inondée en hiver, à surface récemment rajeunie, à l'ouest du chemin sablonneux allant vers Saint-Michel-Escalus, sous la ligne électrique à haute tension, avec *Drosera intermedia*, *Drosera rotundifolia*, *Schoenus nigricans*, *Eleocharis multicaulis*, *Eriophorum angustifolium*. 20.06.2007. XP 46. Tout près de là se trouve une vaste zone tourbeuse avec *Narthecium ossifragum*, *Rhynchospora alba*, malheureusement en voie de fermeture par une végétation dense.

► *Sibthorpia europaea*

- Saint-Paul-en-Born, sur plus d'une cinquantaine de mètres, en bordure

du chemin au sud de la passerelle sur l'Escource au voisinage de l'étang d'Aureilhan. 25.08.2010. XP 49.

- Noté antérieurement, mais non retrouvé récemment, entre la route de Moliets à Messanges et l'étang de Laprade. 30.03.1966. XP 35.

➤ *Sisyrinchium rosulatum* Bicknell

- Messanges, abondant pelouses sablonneuses humides au nord de l'étang de Moisan. 20.06.2007. XP 25.
- Vielle-Saint-Girons, pelouses inondables en bordure de l'étang de Léon. 22.06.2007. XP 36. Station déjà connue de F. FAURE.

Plante originaire des États-Unis, du Texas à la Virginie, naturalisée en diverses régions du monde, mais pour l'instant uniquement dans les Landes en Europe. Déjà notée en divers points à Biscarosse, Parentis, Gastes (D. MASSON, 2000), elle s'étend par conséquent vers le Sud.

➤ *Veronica cymbalaria*

- Léon, en bordure d'un chemin au voisinage de l'étang. 22.05.2010. XP 36. Véronique méditerranéenne que nous avons notée en 1966 à l'Herbe, en bordure du Bassin d'Arcachon et qui s'est étendue vers le Nord jusqu'en Loire-Atlantique. Elle a été notée pour la première fois dans les Landes en 2004 par G. SÉGUY à Tarnos.

85 - Département de la Vendée

Contribution de Julien MARY et René GUÉRY

➤ *Arctotheca calendula*

- Noirmoutier, dune plus ou moins rudéralisée à l'est du Fort Larron (entre le fort et la mer), une belle touffe (04.06.2008), non revue (05.05.2009).
- Noirmoutier, sommet de la petite falaise de grès à Sabalites dominant la plage des Sableaux, 200 m. environ, au sud de la Pointe Saint-Pierre, 3 petits pieds (05.05.2009).

➤ *Cutandia maritima*

- Noirmoutier, dune plus ou moins rudéralisée à l'est du Fort Larron (05.05.2009). La petite population observée depuis une dizaine d'années est toujours présente.

➤ *Parapholis incurva*

- Noirmoutier, dune plus ou moins rudéralisée à l'est du Fort Larron (05.05.2009) dans une zone piétinée, au bord d'un chemin. Observé depuis une dizaine d'années.

➤ *Paronychia argentea* subsp *argentea*

- Noirmoutier, dune plus ou moins rudéralisée à l'est du Fort Larron, une petite tache (04.06.2008 et 05.05.2009).
- Noirmoutier, plusieurs pieds dans un secteur plus rudéralisé un peu au nord, en bordure sud du Bois de la Chaise (05.05.2009).

➤ *Rumex bucephalophorus*

- Noirmoutier, dune plus ou moins rudéralisée à l'est du Fort Larron, un beau pied (05.05.2009).