

# Liste des taxons observés le samedi 29 mars 2025

Etat imprimé le 3 avril 2025 par Benoît BOCK

Nomenclature: Base de Données Nomenclaturales de la Flore de France (B.BOCK & al.)

Sortie organisée par Jacques Boyer après l'AG

samedi 29 mars 2025

France - 49 : Beaulieu sur Layon - Dans les vignes

avec : SBCO



## Bryophytes

- **Pseudoscleropodium purum** (Hedw.) M.Fleisch. [Brachytheciaceae]

Scléropode pur

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=-1541>

Très commune pleurocarpe robuste, jaune-vert, avec des pousses d'aspect robuste et gras, plus ou moins régulièrement pennées pouvant atteindre 10 cm ou plus de longueur, et des branches relativement courtes et disposées perpendiculairement à l'axe principal. Les feuilles de 2 mm de longueur sont dressées, faiblement comprimées et se chevauchent, à peine un peu plus longues que larges et profondément concaves caractérisées par une petite pointe recourbée à leur extrémité (loupe !). Les capsules sont rares.

## Pteridophytes

- **Asplenium ceterach** L. subsp. **ceterach** [Aspleniaceae]

Asplénie céterac commune

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=7340>

## Angiospermes Monocotylédones

- **Allium vineale** L. [Amaryllidaceae]

Ail des vignes

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=6256>

Plante caractérisée par de petites ombelles (2 à 3 cm de diamètre) avec une inflorescence remplacée par des bulbes rapidement foliacées parfois accompagnées de quelques fleurs verdâtres ou violacées, par des spathes larges à pointes plus courtes que l'inflor. et par des caïeux fauve foncé longuement pédunculés à pointe très rigide et souvent appliqués le long de la tige.

- **Alopecurus pratensis** L. subsp. **pratensis** [Poaceae]

Vulpin des prés commun

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=6621>

## ■ **Anisantha sterilis** (L.) Nevski [Poaceae]

Droue stérile

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=6720>

Nullement stérile ! Elle est qualifiée ainsi du fait qu'elle croît dans des zones de cultures à la place du blé ou de l'orge sans produire de grains utiles à l'Homme.

## ■ **Anthoxanthum odoratum** L. [Poaceae]

Flouve commune

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=8622>

## ■ **Arum italicum** Mill. [Araceae]

Arum d'Italie

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=8677>

Feuilles généralement veinées apparaissant dès l'automne et spadices normalement jaunes.

## ■ **Arum maculatum** L. [Araceae]

Arum tacheté

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=5843>

Feuilles souvent tachées de noir et spadices normalement violacés, en forme de massue, porté sur un pédoncule. Baies toxiques, Pl. vésicante, détérisive et révulsive. Floraison protogynie. La massue est capable de thermogénèse (pic en soirée du jour de l'ouverture de la spathe) favorisant la dispersion des odeurs attirant les insectes pollinisateurs, dont le diptère Psychoda phalaenoides.

## ■ **Brachypodium rupestre** (Host) Roem. & Schult. subsp. **rupestre** [Poaceae]

Brachypode commun

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=43302>

## ■ **Dactylis glomerata** L. subsp. **glomerata** [Poaceae]

Dactyle commun

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=9674>

Graminée à la fois les plus fréquentes dans la nature et les plus utilisées comme plante fourragère

## ■ **Iris foetidissima** L. [Iridaceae]

Iris fétide

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=6097>

## ■ **Juncus inflexus** L. [Juncaceae]

Jonc glauque

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=6146>

Grand jonc (jusqu'à 1 m) vivace cespiteux à tiges très glauques et gaines brillantes d'un pourpre-noir, à inflorescences lâches composées de fleurs à tépales longuement acuminés. Feuilles cloisonnées.

## ■ **Lolium arundinaceum** (Schreb.) Darbysh. subsp. **arundinaceum** [Poaceae]

Grande-Fétuque commune

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=10049>

## ■ **Luzula campestris** (L.) DC. [Juncaceae]

Luzule champêtre au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=6170>

## ■ **Mibora minima** (L.) Desv. [Poaceae]

Mibore naine

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=7000>

## ■ **Muscaris botryoides** (L.) Mill. R [Asparagaceae]

Muscaris raisin

Autrefois rattaché Hyacinthus, le muscaris a des fleurs ressemblant à une grappe de raisins

<https://www.google.fr/search?q=Muscaris+botryoides+&hl=fr&utm=2#vhid=n12c>

**■ *Orchis mascula* (L.) L. subsp. *mascula* [Orchidaceae]**

Orchis mâle commun

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=13034>**■ *Ornithogalum divergens* Boreau [Asparagaceae]**

Ornithogale divergent

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=6360>**■ *Poa annua* L. subsp. *annua* [Poaceae]**

Paturin annuel au sens large

<https://www.google.fr/search?q=Poa+annua+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>**■ *Poa trivialis* L. [Poaceae]**

Paturin commun au sens large

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=7097>**■ *Tulipa sylvestris* L. subsp. *sylvestris* N [Liliaceae]**

Tulipe sauvage de Linné

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=6401>

## Angiospermes Dicotylédones

**■ *Acanthus mollis* L. [Acanthaceae]**

Acanthe molle

Du grec akantha (épine) par allusion aux épines des feuilles dans plusieurs espèces de ce genre

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=29922>**■ *Achillea millefolium* L. subsp. *millefolium* [Asteraceae]**

Achillée millefeuille

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=364>

Composée vivace, odorante, rampante (pouvant former des colonies très denses et étendues), à fleurs blanches ou rosées et à feuilles longues, étroites et finement divisées.

Plante médicinale astringente permettant de stopper les hémorragies. En infusion elle réduit les spasmes digestifs et utérins, et est aussi anti-inflammatoire. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes - thuyone (alpha et bêta), camphre, eucalyptol à surveiller

**■ *Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande**

[Brassicaceae]

Alliaire officinale

Genre : du fait que son frosissement dégage une odeur d'ail ; petiolata : ses feuilles sont longuement pétiolées

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=1468>

Grande plante (jusqu'à 1 m de haut), à légère odeur d'ail, à feuilles longuement pétiolées, cordiformes et dentées et à fleurs blanches.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

**■ *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [Apiaceae]**

Cerfeuil des prés au sens large

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=8626>

Vivace (ou rarement bisannuelle) glabre, à feuilles de forme variable, profondément, mais diversement divisées, à pétioles entiers (ou légèrement échancrés), à fruits allongés (8 mm) lisses et noir brillant à maturité et à tiges creuses facilement compressibles.

Les tiges et les jeunes fruits sont comestibles crues ou cuites

**■ *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. [Brassicaceae]**

Fausse-Arabette de Thal

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=1484>**■ *Artemisia vulgaris* L. [Asteraceae]**

Armoise commune

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=459>

Grande composée en touffe dépassant facilement 1 m de haut, reconnaissable à ses feuilles dont les folioles sont profondément dentées, blanchâtres dessous à son odeur faible et désagréable, à ses inflorescences rameuses très amples et à ses souches non ou très brièvement stolonifères.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, fleur, tige - thuyones, eucalyptol, camphre à surveiller - L'huile essentielle de cette plante est interdite.

**■ *Aubrieta deltoidea* (L.) DC. [Brassicaceae]**

Aubriète d'Orient

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=1507>**■ *Barbarea vulgaris* W.T.Aiton [Brassicaceae]**

Barbarée commune au sens large

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=1514>**■ *Bellis perennis* L. [Asteraceae]**

Pâquerette vivace

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=493>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - inflorescences

**■ *Cardamine hirsuta* L. [Brassicaceae]**

Cardamine hirsute

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=1592>

Plante intégralement comestible crue

**■ *Cardamine pratensis* L. [Brassicaceae]**

Cardamine des prés

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=1597>**■ *Carduus pycnocephalus* L. [Asteraceae]**

Chardon à troquets au sens large

<https://www.google.fr/search?q=Carduus+pycnocephalus>**■ *Cerastium glomeratum* Thuill. [Caryophyllaceae]**

Céraiste aggloméré

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=2024>

Annuelle à fleurs groupées dont les pédoncules ne dépassent pas 1,2 fois le calice. Pédoncules fructifères droits ou arqués jusqu'à 45° mais non coudés davantage sous le calice. Sépales à poils dépassant leur apex. Filet des étamines glabres. Attention aux confusions avec C. fontanum qui est vivace et à sépales non dépassés par des poils.

**■ *Chelidonium majus* L. subsp. *majus* f. *majus***

[Papaveraceae]

Chélidoine Grande de Linné

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=9311>**■ *Cirsium vulgare* (Savi) Ten. [Asteraceae]**

Cirse commun

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=691>

Les jeunes pousses sont comestibles plutôt cuites

**■ *Conopodium majus* (Gouan) Loret subsp. *majus***

[Apiaceae]

Conopode Grand

<https://www.google.fr/search?q=Conopodium+majus+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>**■ *Crataegus monogyna* Jacq. var. *monogyna* [Rosaceae]**

aubépine monogyne commune

Mono = unique, gyn = femme - les fleurs n'ont qu'un seul ovaire (donc 1 seul style et les fruits une seule graine)

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=9590>**■ *Crepis sancta* (L.) Bornm. [Asteraceae]**

Crépis saint

<https://www.google.fr/search?q=Crepis+sancta+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>**■ *Crepis vesicaria* L. [Asteraceae]**

Crépis à vésicules au sens large

<https://www.google.fr/search?q=Crepis+vesicaria+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>**■ *Cruciata laevipes* Opiz [Rubiaceae]**

Croisette commune

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=5034>**■ *Cymbalaria muralis* G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. [Plantaginaceae]**

Cymbalaire des murs

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=30073>**■ *Daucus carota* L. subsp. *carota* var. *carota* [Apiaceae]**

Carotte commune

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=37131>**■ *Dipsacus fullonum* L. [Caprifoliaceae]**

Cardère commune

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=2584>**■ *Draba muralis* L. [Brassicaceae]**

Drave des murailles

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=1645>**■ *Draba verna* L. [Brassicaceae]**

Drave printanière

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=1653>**■ *Epilobium hirsutum* L. [Onagraceae]**

Épilobe hirsute

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=3891>

Vivace dressée, à tiges souterraines traçantes et feuilles hérisssées de poils longs visibles de loin à l'oeil nu dans la partie médiane (mais glabres à la base). Feuilles à limbes lancéolés, dentés, sessiles et embrassant la moitié de la tige (donc adjacents 2 à 2). Grandes fleurs à pétales pourprés de 1,5 - 2 cm et à style portant 4 stigmates étalés en croix.

**■ *Erigeron karvinskianus* DC. [Asteraceae]**

Vergette des murailles

dédié à Wilhelm Friedrich Karwinsky von Karwin

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=780>**■ *Erigeron sumatrensis* Retz. [Asteraceae]**

Vergette de Sumatra

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=702>**■ *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [Geraniaceae]**

Érodium commun

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=9954>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

**■ *Euphorbia lathyris* L. [Euphorbiaceae]**

Euphorbe épurée

LATHYRIS = nom grec de l'Épurée

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=2717>

Bisannuelle dressée pouvant atteindre 1 m de haut à tige creuse, avec des feuilles d'un vert bleuâtre foncé glauque, sans dents et sans poils, à une seule nervure claire, disposées par paires régulièrement en croix (opposées décussées), rarement verticillées par 3 ou encore très rarement alternes au sommet, pouvant atteindre 12 cm de long. Ombelles assez grandes à 2 à 5 rayons. Bractées aiguës de 3 à 10 cm de long. Glandes de l'involucré jaune en croissant, à cornes courtes spatulées-obtuses. Capsule très grosse (1 cm.), ovoïde-trigone, glabre, à coques arrondies et lisses.

**■ *Ficaria verna* Huds. [Ranunculaceae]**

Ficaire fausse-renoncule

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=4516>

Vivace basse (10 à 20 cm) à feuilles presque rondes, vert foncé, brillantes, parfois marquées de noir, longuement pétiolées et à remarquables fleurs à au moins 8 pétales d'un jaune vif brillant. Forme des colonies dans les zones fraîches. Racines tubérisées blanchâtres.

Pl. antihémorroïdale, vénéneuse

**■ *Filipendula vulgaris* Moench [Rosaceae]**

Reine-des-prés Petite

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=4742>

Plante 30 à 60 cm en général, à feuilles comportant plus de 10 paires de petites folioles (1 cm) dentelées et à fleurs blanches à 6 pétales en corymbes allongés. Tubercules de goût agréables comestibles et astringents

**■ *Galium album* Mill. [Rubiaceae]**

Gaillet blanc

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=5058>**■ *Galium aparine* L. subsp. *aparine* [Rubiaceae]**

Gaillet gratteron

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=10168>**■ *Geranium lucidum* L. [Geraniaceae]**

Géranium luisant

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=3425>

Annuelle glabre à feuilles peu découpées, de forme arrondie, d'un vert brillant caractéristique. Fleurs rose vif dont les calices présentent 5 angles saillants.

**■ *Geum urbanum* L. [Rosaceae]**

Benoîte commune

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=4758>

La racine séchée à longtemps été utilisée pour ses propriétés, en remplacement du clou de girofle dont elle a d'ailleurs l'odeur.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

**■ *Glechoma hederacea* L. [Lamiaceae]**

Gléchome lierre-terrestre

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=3549>

Les limbes de jeunes feuilles sont les parties les plus aromatiques de cette plante comestible et médicinale.

**■ *Hedera helix* L. subsp. *helix* f. *helix* [Araliaceae]**

Lierre commun grimpant

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=10318>**■ *Helosciadium nodiflorum* (L.) W.D.J.Koch [Apiaceae]**

Hélosciadie nodiflore

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=8634>

Comestible riche en vitamine E, mais la présence d'acide oxalique génère une légère toxicité notamment pour les personnes sensibles aux calculs rénaux.

**■ *Hypochaeris radicata* L. [Asteraceae]**

Porcelle commune

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=967>

Vivace à latex à feuilles exclusivement en rosette basale presque entières, à face inférieure non entièrement glabre. Tiges ramifiées dès le milieu, munies de nombreuses feuilles avortées. Capitule à paillettes. Fleurs à ligules jaunes supérieures à 8 mm de long, dépassant l'involucré d'au moins 4 mm. Bractées involucrales disposées sur 3 à 4 rangs, nettement croissantes de l'extérieur vers l'intérieur. Akènes avec bec et pappus de 2 rangs de soies plumeuses. (Confusions possibles avec *H. glabra*)

**■ *Jacobaea vulgaris* Gaertn. subsp. *vulgaris* [Asteraceae]**

Sèneçon jacobée

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=14453>**■ *Lamium purpureum* L. [Lamiaceae]**

Lamier pourpre

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=3568>

Plante médicinale : diurétique, hémostatique et propriétés toniques, rafraîchissantes ou vulnéraires. Les jeunes feuilles et les fleurs sont comestibles

**■ *Lapsana communis* L. subsp. *communis* [Asteraceae]**

Lapsane commune

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=12391>

Excellent salade sauvage

**■ *Lathyrus pratensis* L. [Fabaceae]**

Gesse des prés

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=2964>**■ *Leucanthemum vulgare* Lam. [Asteraceae]**

Marguerite Grande au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=1047>**■ *Melissa officinalis* L. subsp. *officinalis* [Lamiaceae]**

Mélisse citronnée

<https://www.google.fr/search?q=Melissa+officinalis+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>**■ *Mercurialis annua* L. [Euphorbiaceae]**

Mercuriale annuelle

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=2751>**■ *Myosotis ramosissima* Rochel [Boraginaceae]**

Myosotis très rameux

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=1416>**■ *Oenanthe crocata* L. [Apiaceae]**

Œnanthe safranée

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=224>**■ *Picris hieracioides* L. [Asteraceae]**

Picris fausse-épervière

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=1102>**■ *Plantago coronopus* L. subsp. *coronopus* [Plantaginaceae]**

Plantain corne-de-cerf de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=13294>**■ *Plantago lanceolata* L. var. *lanceolata* [Plantaginaceae]**

Plantain lancéolé de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=13301>**■ *Potentilla reptans* L. [Rosaceae]**

Potentille rampante

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=4818>

Plante stolonifère, couchée et radicante, velue à feuilles composées-palmées presque toutes à 5 folioles (rarement 7) à folioles obovales allongées, vertes dessous. Fleurs isolées aux noeuds sur de très longs pédicelles à 5 pétales jaune vif de 6-12 mm, dépassant nettement le calice. Réceptacle bombé, non charnu, portant de nombreux akènes (plus de 60).

Pl. astringente, vulnéraire et tonique

**■ *Poterium sanguisorba* L. subsp. *sanguisorba* [Rosaceae]**

Pimprenelle Petite commune

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=14282>**■ *Primula veris* L. var. *veris* [Primulaceae]**

Primevère officinale de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=13518>**■ *Prunus spinosa* L. [Rosaceae]**

Prunellier commun

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=4847>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, feuille, fleur

**■ *Pulmonaria longifolia* (Bastard) Boreau subsp. *longifolia* [Boraginaceae]**

Pulmonaire à feuilles très allongées

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=13579>**■ *Quercus petraea* (Matt.) Liebl. [Fagaceae]**

Chêne sessile au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=3291>**■ *Rabelera holostea* (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp []**

Grande-Stellaire holostée

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=14627>**■ *Ranunculus bulbosus* L. [Ranunculaceae]**

Renoncule bulbeuse

<https://www.google.fr/search?q=Ranunculus+bulbosus+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

Vivace de 20 à 40 cm de haut, à tiges généralement renflées en bulbes à la base (sauf infratrons), à feuilles velues, divisées en 3 lobes et à fleurs d'un jaune d'or dont les sépales velus sont fortement rabattus sur les pédoncules sillonnés. Peut-être confondue avec *R. sardous* dont elle se distingue par des akènes à faces lisses non tuberculées.

**■ *Ranunculus parviflorus* L. subsp. *parviflorus* [Ranunculaceae]**

Renoncule à petites fleurs

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=42914>**■ *Ranunculus repens* L. [Ranunculaceae]**

Renoncule rampante

<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=4561>

Vivace peu élevée mais à tiges très longuement rampantes (jusqu'à 2 m) s'enracinant aux noeuds, à feuilles divisées en segments dont le central est pétiolulé et à fleurs jaune d'or.

## ■ ***Raphanus sativus*** L. [Brassicaceae]

Radis cultivé

<https://www.google.fr/search?q=Raphanus+sativus+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>  
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - racine

## ■ ***Rubia peregrina*** L. subsp. ***peregrina*** [Rubiaceae]

Garance voyageuse

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=13967>

## ■ ***Rumex acetosa*** L. subsp. ***acetosa*** [Polygonaceae]

Oseille Grande de Linné

<https://www.google.fr/search?q=Rumex+acetosa+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

## ■ ***Rumex crispus*** L. [Polygonaceae]

Oseille crêpue

<https://www.google.fr/search?q=Rumex+crispus+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>  
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties - anthraquinones à surveiller

## ■ ***Rumex obtusifolius*** L. [Polygonaceae]

Oseille parelle

RUMEX = plante à feuille pointue ; OBTU = obtus ; FOLIA = feuille  
<https://www.google.fr/search?q=Rumex+obtusifolius+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

## ■ ***Saxifraga granulata*** L. [Saxifragaceae]

Saxifrage granulée

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=30340>

## ■ ***Saxifraga tridactylites*** L. [Saxifragaceae]

Saxifrage à trois doigts

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=5290>

## ■ ***Scrophularia auriculata*** L. subsp. ***auriculata***

[Scrophulariaceae]

Scrofulaire auriculée

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=36758>

## ■ ***Sedum sp.*** [Crassulaceae]

Sédum au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=36150>

## ■ ***Senecio vulgaris*** L. subsp. ***vulgaris*** [Asteraceae]

Sénéçon commun

SENEC = plante à poils blancs ; VULGAR = commun  
<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=14458>

Plante annuelle très commune de taille variant de 10 à 50 cm, à feuilles épaisses, irrégulièrement découpées et à capitules de fleurs jaunes sans ligules, en groupes penchés avant la floraison.

## ■ ***Sison amomum*** L. [Apiaceae]

Sison aromatique

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=298>

## ■ ***Sison segetum*** L. [Apiaceae]

Sison des moissons

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=242>

## ■ ***Sonchus oleraceus*** L. [Asteraceae]

Laiteron maraîcher

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=1232>

## ■ ***Stellaria media*** (L.) Vill. [Caryophyllaceae]

Stellaire intermédiaire

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=30388>

Petite plante annuelle à 5 pétales blancs bifides (donc paraissant 10). Possède la particularité d'avoir une ligne de poils sur les entrenœuds changeant de côté d'une paire de feuilles à l'autre.

Les jeunes pousses, récoltées toute l'année, se consomment en salade, leur saveur douce rappelle celle des noisettes. Le mouron des oiseaux peut être ajouté à une salade composée printanière avec le lamier tacheté, le plantain, le laitron... On peut aussi les cuire en potage avec d'autres légumes. Attention à ne pas confondre avec *Lysimachia arvensis* aussi appelé mouron, mais toxique.

## ■ ***Tanacetum vulgare*** L. [Asteraceae]

Tanaisie commune

TANACET = nom latin de la tanaisie ; VULGAR = commun  
<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=1251>

Odeur arômatique, saveur amère, médicinale, toxique à hautes doses, répandue par les invasions barbares. Tonique du système digestif, (dyspepsie, apéritif donc antianorexie), antihelminthique (vermifuge contre les ascaris et les oxyures), antianémique, diruétique, antispasmodique, contre la nervosité, dysménorrhée, leucorrhée, antiseptique cutanée anti-inflammatoire (entorses, contusions, goutte en traitement externe).

## ■ ***Taraxacum sp.*** [Asteraceae]

Pissenlit

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=36245>

## ■ ***Torilis arvensis*** (Huds.) Link [Apiaceae]

Torilis des champs au sens très large

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=14807>

Annuelle de taille très variable, à ombelles terminales longuement pédonculées et dépourvues d'involucre (parfois 1 ou 2 bractées) et à fruits sans côtes, couverts d'aiguillons terminés par une couronne de crochets (forte loupe !). Tige à partie inférieure glabre.

## ■ ***Trifolium pratense*** L. subsp. ***pratense*** [Fabaceae]

Trèfle violet

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=3182>

## ■ ***Valerianella eriocarpa*** Desv. [Caprifoliaceae]

Mâche laineuse

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=5698>

## ■ ***Valerianella locusta*** (L.) Laterr. [Caprifoliaceae]

Mâche commune

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=5700>

## ■ ***Verbascum thapsus*** L. [Scrophulariaceae]

Molène bouillon-blanc au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=14887>

Plante pouvant atteindre 2 m de haut, velue cotonneuse, à inflorescences simples et denses et à feuilles longuement décurrentes. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fleur, feuille

## ■ ***Veronica arvensis*** L. [Plantaginaceae]

Véronique des champs

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=5496>

## ■ ***Veronica persica*** Poir. [Plantaginaceae]

Véronique de Perse

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=5522>

## Oiseaux

### ■ ***Burhinus oedicnemus*** [Burhinidae]

OEdicnème criard

<https://www.google.fr/search?q=Burhinus+oedicnemus+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

### ■ ***Emberiza cirlus*** [Emberizidae]

Bruant zizi

<https://www.google.fr/search?q=Emberiza+cirlus+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

## Insectes - Lépidoptères

### ■ ***Gonepteryx rhamni*** Linnaeus []

Le Citron

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=14001659>

Les plantes hôtes de la chenille sont des Rhamnus, dont le Nerprun purgatif sur calcaire et l'Alaterne en région méditerranéenne, et des Frangula, dont la Bourdaine sur terrain acide.

## France - 49 : Beaulieu sur Layon - Pont Barré

avec : SBCO



## Bryophytes

### ■ ***Homalothecium sericeum*** (Hedw.) Schimp.

[Brachytheciaceae]

<https://www.google.fr/search?q=Homalothecium+sericeum>

### ■ ***Lunularia cruciata*** (L.) Dumort. ex Lindb.

[Lunulariaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=-975>

Hépatique possédant de grands thalles verts, ramifiés de manière dichotomique à surface brillante, légèrement striée et parsemée de petits pores aérien, avec des coupes à gemme en forme de croissant contenant des gemmes (reproduction asexuée) en forme de disque. Cette caractéristique morphologique unique n'est pas présente chez les autres hépatiques thalloïdes.

### ■ ***Thamnobryum alopecurum*** (Hedw.) Nieuwl. ex Gangl.

[Neckeraceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTAXMax.php?NumTaxon=-1695>



## Ptéridophytes

- ***Asplenium obovatum*** subsp. ***billotii*** (F.W.Schultz)  
Kerguélen [Aspleniaceae]  
Asplénie de Billot  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=7349>
- ***Asplenium trichomanes*** subsp. ***quadrivalens*** D.E.Mey.  
[Aspleniaceae]  
Asplénie rouge commune  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=7361>
- ***Polystichum setiferum*** (Forssk.) T.Moore ex Woyn.  
[Dryopteridaceae]  
Polystic à soies  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=7396>



## Angiospermes Monocotylédones

- ***Aira caryophyllea*** L. [Poaceae]  
Aira caryophylle  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=8564>
- ***Carex flacca*** Schreb. subsp. ***flacca*** [Cyperaceae]  
Carex glauque commun  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=9014>  
Rhizomateuse hétérostachyée de 30 à 60 cm de haut, à feuilles de 3 à 4 mm de large de couleur typiquement glauque et à épillets femelles brunâtres composés d'utrilles arrondis et dépourvus de bec.
- ***Fritillaria meleagris*** L. [Liliaceae]  
Fritillaire pintade  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=6305>
- ***Gagea bohemica*** (Zauschn.) Schult. & Schult.f. N  
[Liliaceae]  
Gagée de Bohême  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=10135>
- ***Micropyrum tenellum*** (L.) Link f. ***tenellum*** [Poaceae]  
Micropyre délicat mutique  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=12688>
- ***Poa bulbosa*** subsp. ***bulbosa*** var. ***vivipara*** Koeler  
[Poaceae]  
Paturin bulbeux vivipare  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=13332>
- ***Prospero autumnale*** (L.) Speta [Asparagaceae]  
Scille-d'automne commune  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=6371>
- ***Ruscus aculeatus*** L. [Asparagaceae]  
Fragon petit-houx  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=6367>  
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - rhizome, parties aériennes



## Angiospermes Dicotylédones

- ***Acer platanoides*** L. subsp. ***platanoides*** [Sapindaceae]  
Érable plane  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=10>  
Feuilles ressemblant à celles des platanes, mais d'un vert brillant sur les 2 faces avec des lobes et des sinus très aigus. Samares disposées à angle très ouvert. Floraison et bouquets dressés, à fleur jaune d'or avant les feuilles.  
Vit jusqu'à 500 ans
- ***Anethum foeniculum*** L. subsp. ***foeniculum*** var. ***foeniculum*** [Apiaceae]  
Fenouil sauvage  
<https://www.google.fr/search?q=Anethum+foeniculum+&hl=fr&utm=2#vhid=n12c>
- ***Aphanes australis*** Rydb. [Rosaceae]  
Perce-pierre inattendu  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=4702>
- ***Arctium minus*** (Hill) Bernh. [Asteraceae]  
Bardane Petite  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=417>  
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - racine, graine, feuille immature, tige
- ***Arenaria serpyllifolia*** L. var. ***serpyllifolia*** [Caryophyllaceae]  
Arénaire à feuilles de serpolet de Linné  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=1994>
- ***Calepina irregularis*** (Asso) Thell. [Brassicaceae]  
Calépine irrégulière  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=1574>
- ***Corylus avellana*** L. var. ***avellana*** f. ***avellana*** [Betulaceae]  
Noisetier commun sauvage  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=44317>
- ***Cytisus scoparius*** (L.) Link subsp. ***scoparius*** f. ***scoparius*** [Fabaceae]  
Cytise à balais de Linné  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=9667>
- ***Daphne laureola*** L. [Thymelaeaceae]  
Daphné lauréole  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=5604>  
Pl. toxique, purgatives, tinctoriales (baies), ornementales
- ***Dianthus sp.*** [Caryophyllaceae]  
Œillet  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=32716>
- ***Eupatorium cannabinum*** L. subsp. ***cannabinum*** [Asteraceae]  
Eupatoire chanvrine  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=9976>
- ***Euphorbia amygdaloides*** L. subsp. ***amygdaloides*** [Euphorbiaceae]  
Euphorbe des bois  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=2682>
- ***Filago sp.*** [Asteraceae]  
Filagine  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=35391>
- ***Fraxinus excelsior*** L. subsp. ***excelsior*** var. ***excelsior*** [Oleaceae]  
Frêne élevé de Linné  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=30618>  
Diurétique, hypotensive, antirhumatismal, antilithiasique.
- ***Fumaria officinalis*** L. [Papaveraceae]  
Fumeterre officinale  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=3314>  
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes
- ***Galatella linosyris*** (L.) Rchb.f. var. ***linosyris*** R [Asteraceae]  
Galatelle linosyris commune  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=469>
- ***Helianthemum nummularium*** (L.) Mill. [Cistaceae]  
Hélianthème nummulaire  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=2430>
- ***Hippocratea comosa*** L. [Fabaceae]  
Hippocrate à toupet  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=2929>
- ***Hypericum perforatum*** L. [Hypericaceae]  
Millepertuis commun  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=3494>
- ***Lactuca virosa*** L. [Asteraceae]  
Laitue vireuse  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=996>  
Le latex au goût amer et à odeur forte possède des propriétés comparables à celui des opiacés. Il a été utilisé comme opium dans médecine traditionnelle et jusqu'au début du 20e siècle dans les pharmacopées de plusieurs pays pour son activité analgésique entre autres.
- ***Lamium album*** L. [Lamiaceae]  
Lamier blanc  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=3557>  
Plante médicinale : diurétique, hémostatique et propriétés toniques, rafraîchissantes ou vulnéraires. Les jeunes feuilles et les fleurs sont comestibles. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - corolle mondée, sommité fleuri, feuille
- ***Lamium maculatum*** (L.) L. [Lamiaceae]  
Lamier tacheté  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=3567>
- ***Lathraea clandestina*** L. [Orobanchaceae]  
Lathrée clandestine  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=3964>  
Parasite du xylème
- ***Laurus nobilis*** L. [Lauraceae]  
Laurier noble  
<http://www.photoflora.fr/FiTMax.php?NumTaxon=3750>  
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, fruit - méthyleugénol, eucalyptol à surveiller

## ■ ***Lysimachia nummularia*** L. [Primulaceae]

Lysimaque nummulaire

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=4349>

## ■ ***Populus nigra*** L. [Salicaceae]

Peuplier noir

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=5128>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - écorce, bourgeon de feuille

## ■ ***Prunus cerasifera*** Ehrh. [Rosaceae]

Prunier myrobalan

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=4832>

Arbuste de 3 à 5 m de haut, c'est le premier Prunus à fleurir au printemps. Fleurs de près de 2 cm non groupées. Jeunes rameaux glabres, vert rougeâtre, non pruineux. Bois de 2 à 3 ans recouvert de lambeaux peu adhérents blanchâtres retirables à l'ongle. Petit arbre à fruit ressemblant à une mirabelle de couleur variable selon la variété, comestible mais un peu aigre, aigre et fade.

Premier prunier à fleurir au printemps dès la mi-février. Utilisé comme porte-greffe pour différents types de pruniers tels que la Reine-claudie, la quetsche ou la mirabelle car il se multiplie bien par semis, il drageonne peu, se développe même dans les terres pauvres. Les fruits sont excellents pour faire de la confiture.

## ■ ***Ranunculus acris*** L. [Ranunculaceae]

Renoncule acré

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=4490>

Classique bouton d'or des prairies, grande plante (jusqu'à 1 m de haut) vivace, à feuilles profondément mais diversement divisées (le lobe central n'est jamais pétiolé) et à nombreuses fleurs d'un jaune d'or. (En cas de doute dans la détermination, surtout en montagne, bien observer les réceptacles glabres et les akènes à becs peu courbés).

## ■ ***Rubus ulmifolius*** Schott [Rosaceae]

Ronce rustique

RUB = ronce ; ULM = orme ; FOLI = feuille

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=4969>

Espèce sexuée.

## ■ ***Senecio inaequidens*** DC. [Asteraceae]

Sénéçon du Cap

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=1176>

Les laines de moutons importées d'Afrique du Sud en Europe contenaient des graines de Sénéçon du Cap. L'espèce a ainsi été introduite accidentellement en Allemagne en 1889, en Belgique en 1922, en Ecosse en 1928, en France (Calais et Mazamet, dans le Tarn) en 1935 et en Italie en 1947. A partir de ces foyers, le Sénéçon du Cap a commencé à se propager en Europe dans les années 70.

Toxique pour les animaux par la présence d'alcaloïdes. Diffuse dans le sol des substances toxiques pour ses voisines.

## ■ ***Sesamoïdes purpurascens*** (L.) G.López [Resedaceae]

Astérocapse pourpré au sens large

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=4611>

## ■ ***Stachys recta*** L. [Lamiaceae]

Épiaire droite

<https://www.google.fr/search?q=Stachys+recta+&hl=fr&utm=2#vhid=n12c>

## ■ ***Symphytum officinale*** L. subsp. ***officinale***

[Boraginaceae]

Consoûde Grande officinale

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=1459>

## ■ ***Teesdalia coronopifolia*** (J.P.Bergeret) Thell. **R**

[Brassicaceae]

Téesdalie corne-de-cerf

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=1816>

Annuelle à tige quasi glabre à 1 ou 2 petites feuilles caduques, luisante d'un beau vert, de 3 à 15 cm de haut. Fleur à pétales blancs ne dépassant pas le calice, à 4 étamines. Sicilie à style nul (< 0,1 mm).

## ■ ***Teucrium scorodonia*** L. [Lamiaceae]

Germandrée scorodoine

TEUCRI = sorte de germandrée ; SCOROD = ail

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=30402>

## ■ ***Umbilicus rupestris*** (Salisb.) Dandy [Crassulaceae]

Ombilic des rochers

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=2545>

## ■ ***Viola riviniana*** Rchb. [Violaceae]

Violette de Rivinus

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=14920>



## Insectes - Lépidoptères

### ■ ***Aglais io*** Linnaeus []

Le Paon-du-jour

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=14001833>

### ■ ***Anthocharis cardamines*** Linnaeus []

L'Aurore

<http://www.photoflora.fr/FTaxMax.php?NumTaxon=14001647>