Liste des taxons observés le mercredi 2 avril 2025

Etat imprimé le 4 avril 2025 par Benoît BOCK

Nomenclature: Base de Données Nomenclaturales de la Flore de France (B.BOCK & al.)

L'objectif de cette sortie était la visite de la station d'Isopyrum thalictroides au rond du coupe-gorge. Ce sont 12 participants qui sont venus découvrir ou revoir cette espèce protégée régionalement, mais localement abondante. La floraison était à son optimale. Elle était accompagnée d'Adoxa et de Primula elatior, elles aussi en pleine fleur. Un tour dans le bourg de Hauterive a permis de voir quelques espèces rudérales. Les mares forestières sont pleines et certaines abritent des pontes de grenouilles (probablement la grenouille rousse). Un triton palmé est photographié dans une flaque dans une ornière d'un chemin forestier.

mercredi 2 avril 2025

France - 28 : Saint Maixme Hauterive - Forêt domaniale de Chateauneuf (sauf rudérales autour du bourg d'Hauteville)

avec : FEMENIA Marie-Isabelle, FEMENIA Pascal, GALAND Christian, MORICE Patrick, BOIN Michel, RUSSO KOPANSKA Alexandra, GOJARD Laurent, QUITARD Fanny, ROSENBERGER Mireille, PETIT Alain, BUISSON Daniel & BOCK Benoît



Lichens - Champignons

- ***Ascodichaena rugosa*** Butin [Ascodichaenaceae]

DI = 2 ; CHAEN = s'entr'ouvrir, RUGOS = rugueux
https://www.google.fr/search?q=Ascodichaena+rugosa+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c
Forme des plaques noires sur les troncs des hêtres

- ***Stereum insignitum*** Quél. [Stereaceae]

Stérée remarquable
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2212510

- ***Trametes gibbosa*** (Pers. : Fr.) Fr. [Polyporaceae]

Tramète bossue
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2212374
Polypore à chapeau blanc quasiment toujours colonisé par des microalgues vertes.

Bryophytes

- ***Calypogeia fissa*** (L.) Raddi [Calypogeiaceae]

Calypogéie terrestre
https://www.google.fr/search?q=Calypogeia+fissa+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c

- ***Campylopus introflexus*** (Hedw.) Brid. [Dicranaceae]

Campylope réfléchi
CAMPYL- = recourbé ; OP- = aspect ; INTRO = à l'intérieur ; FLEX = fléchir
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-326
Souvent abondante sous forme des taches vert foncé ou presque noires lorsqu'elles sont sèches. Les tiges peuvent atteindre 5 cm de long, mais sont généralement beaucoup plus courtes. Les feuilles de 2,5 à 6,5 mm de long, sont dressées et droites lorsqu'elles sont humides, et plus apprimées avec la pointe velue souvent réfléchie lorsqu'elles sont sèches. Les feuilles sont relativement larges à la base ou juste au-dessus, avec une largeur de costa variable de 30 à 70 % de la largeur de la feuille et excurrente en une pointe velue dentée et incolore. Les plantes fertiles sont fréquentes avec capsules maintenues sur une soie fortement courbée vers le bas, et les tiges ont des nœuds gonflés au niveau des inflorescences et des sections minces
Espèce originaire de l'hémisphère austral, invasive en Europe. Facilement reconnaissable.

- ***Dicranella heteromalla*** (Hedw.) Schimp. [Dicranaceae]

DICRAN- = fourche ; MALL- = touffe de laine, touffe de cheveux
https://www.google.fr/search?q=Dicranella+heteromalla
En petites plaques denses, jaune-vert à vert moyen, atteignant 3 cm de d'épaisseur, mais souvent plus petits. Les feuilles ressemblant à celles d'un Dicranum scoparium, sont plus ou moins courbées, de 3 à 3,5 mm de long, apparaissent denses et extrêmement fines. Leur base est ovoïde et se rétrécit en une pointe longue, fine et canalisée qui est dentée, surtout près de la pointe. Le nervure fait environ 30 % de la largeur de la base de la feuille, occupe la majeure partie de la pointe et est souvent excurrente. Les capsules sont fréquentes, horizontales ou inclinées, de forme elliptique et non renflées à la base.

- ***Dicranum scoparium*** Hedw. [Dicranaceae]

Dicrane en balais
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-496
Acrocarpe extrêmement commune de taille moyenne à grande (jusqu'à 10 cm), poussant en gros coussinets jaune-vert à vert foncé. Les feuilles mesurent 4–7,5 mm de long, sont étroitement en forme de fer de lance et se rétrécissent en une longue pointe fine composée en grande partie d'une forte nervure. Elles sont très souvent courbées (comme les poils d'un vieux balai), fortement dentés près de la pointe, mais peuvent aussi être droites et ne s'altèrent pratiquement pas une fois sèches. Le dessous de la nervure présente des lignes de cellules en relief qui sont à peine visibles à la loupe. Celles-ci sont également dentées, ce qui donne l'impression que le bout de la feuille est denté sur tout le pourtour. La capsule

- ***Diplophyllum albicans*** (L.) Dumort. [Scapaniaceae]

diplo- = pli, double ; phyll- = feuille ; albic- = tirant sur le blanc
https://www.google.fr/search?q=Diplophyllum+albicans
Seule hépatique à feuilles à posséder une fausse nervure centrale blanchâtre à brillante. Sinon l'espèce est très variable.

- ***Frullania dilatata*** (L.) Dumort. [Jubulaceae]

Frullanie dilatée
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-685
La présence de lactones sesquiterpéniques peut la rendre très allergisante.

- ***Funaria hygrometrica*** Hedw. [Funariaceae]

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-703

- ***Hylocomiadelphus triquetrus*** (Hedw.) Ochyra & Stebel []

Mousse des jardiniers
https://www.google.fr/search?q=Hylocomiadelphus+triquetrus
Grande mousse touffue qui forme des pousses de 5 à 20 cm de long, avec des tiges rouges irrégulièrement ramifiées. . Les feuilles, qui peuvent mesurer jusqu'à 6 mm de long, sont droites et ont un aspect pâle et pailleté, donnant à la pousse un aspet plutôt désordonné. La feuille a une double costa (= nervure), qui s'étend à peu près à mi-longeur du limbe, et les bords sont légèrement dentés. Les capsules sont rares à occasionnelles.

- ***Hypnum jutlandicum*** Holmen & E.Warncke [Plagiotheciaceae]

https://www.google.fr/search?q=Hypnum+jutlandicum+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c

■ ***Leucobryum glaucum*** (Hedw.) Angstr. [Leucobryaceae]

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-932

Acrocarpe en coussins ou en buttes très denses, vert glauque, gonflés, devenant blanc sale si secs, et mesurant parfois plus de 50 cm.. Les feuilles de 6 à 9 mm de long, dressées, droites, apprimées et se chevauchant lorsqu'elles sont sèches, sont parfois légèrement tournées dans une direction chez les plantes plus grandes, La partie inférieure et plus large de la feuille est aussi longue ou plus longue que la partie supérieure étroite et tubulaire. Les capsules, arquées à 90° ne sont pas très rares.

Vendue en jardinerie

Pleuridium sp. [Ditrichaceae]

https://www.google.fr/search?q=Pleuridium+sp.+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c

■ ***Thuidium tamariscinum*** (Hedw.) Schimp. [Thuidiaceae]

TAMARIC = tamaris

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-1707

Pleurocarpe à pousses brillantes, vert jaunâtre, de forme plane triangulaire, ramifiées de manière tripennée, de 5 à 25 cm de long et forment des tapis lâches. Tiges vertes à feutre de minuscules filaments ramifiés et de feuilles très larges, en forme de cœur, opaques, à costas longitudinales atteint presque l'extrémité de la feuille, et à extrémité aiguë, d'environ 1,25 mm de long. Les feuilles des branches sont plus étroites et plus courtes (jusqu'à 0,5 mm). Les capsules, grandes et courbées et portées par une longue soie (2 à 4 cm) rouge pourpre, sont rares et se forment en automne et en hiver.

Probablement la mousse la plus facile à reconnnaître

Ptéridophytes

■ ***Dryopteris dilatata*** (Hoffm.) A.Gray [Dryopteridaceae]

Fougère-mâle dilatée

Allusion à la largeur des feuilles et des pennes inférieures, plus grande que dans les espèces du groupe de la Fougère mâle.

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7377

■ ***Pteridium aquilinum*** (L.) Kuhn subsp. ***aquilinum*** [Pteridaceae]

Fougère-aigle d'Europe

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7369

Grande espèce vivace (> 1m) poussant en colonie. Frondes triangulaires développées à partir d'un long rhizome traçant profondément enterré. Se flétrissent en hiver. Quasiment toujours stérile en France. Sores marginaux, recouverts par le bord replié du limbe, celui-ci prolongé en une fausse indusie membraneuse toujours présente.

Utilisée comme litière pour les animaux dans certaines régions (Pays Basque)

Gymnospermes

■ ***Abies grandis*** (Douglas ex D.Don) Lindl. [Pinaceae]

Sapin de Vancouver

https://www.google.fr/search?q=Abies+grandis+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c

Rameaux jeunes glabres ou à pubescence grise, à section presque plane. Aiguilles disposées en peigne à dents inégales (20-55 x 2,5 mm) à forte odeur de citronnelle. Cônes se désarticulant sur l'arbre.

Surtout utilisé pour l'enrésinement de taillis à l'étage collinéen

■ ***Pinus sylvestris*** L. [Pinaceae]

Pin sylvestre

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7288

Conifère à petits cônes, tronc orange dans le haut et aiguilles courtes et glauques

Les vertus expectorantes, antiseptiques et calmantes des bourgeons sont utilisées en phytothérapie pour traiter les maladies des voies respiratoires telles que rhume, sinusite, laryngite, catarrhes bronchiques, grippe, affections pulmonaires chroniques.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - cône, aiguille, bourgeon, écorce, jeune pousse

Angiospermes Monocotylédones

■ ***Arum maculatum*** L. [Araceae]

Arum tacheté

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5843

Feuilles souvent tachées de noir et spadices normalement violacés, en forme de massue, porté sur un pédoncule.

Baies toxiques, Pl. vésicante, détersive et révolutive. Floraison protogyne. La massue est capable de thermogenèse (pic en soirée du jour de l'ouverture de la spathe) favorisant la dispersion des odeurs attirant les insectes pollinisateurs, dont le diptère Psychoda phalaenoides.

■ ***Brachypodium sylvaticum*** (Huds.) P.Beauv. [Poaceae]

Brachypode des bois

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6674

■ ***Carex pendula*** Huds. [Cyperaceae]

Carex pleureur

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5958

■ ***Carex pilulifera*** L. subsp. ***pilulifera*** [Cyperaceae]

Carex à pilules

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5960

■ ***Carex sylvatica*** Huds. subsp. ***sylvatica*** [Cyperaceae]

Carex des bois commun

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5979

Cespiteuse hétérostachyée. Utricules brunâtres, longs de 4-5,5 mm, distinctement nervés, progressivement rétrécis en un bec long, étroit et bifide ; épis ♀ longuement pédonculés à pédoncule scabre, au moins l'épi inf. pendant ; feuilles larges de 3-6 (9) mm, vert clair.

■ ***Dactylis glomerata*** L. subsp. ***glomerata*** [Poaceae]

Dactyle commun

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9674

Graminée à la fois les plus fréquentes dans la nature et les plus utilisées comme plante fourragère

■ ***Deschampsia cespitosa*** (L.) P.Beauv. subsp. ***cespitosa*** var. ***cespitosa*** [Poaceae]

Deschampsie des montagnes

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=43324

■ ***Glyceria sp.*** [Poaceae]

Glycérie

https://www.google.fr/search?q=Glyceria+sp.+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c

■ ***Hyacinthoides non-scripta*** (L.) Chouard ex Rothm. [Asparagaceae]

Endymion jacinthe-des-bois

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6326

■ ***Juncus bufonius*** L. [Juncaceae]

Jonc des crapauds

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6134

■ ***Juncus effusus*** L. [Juncaceae]

Jonc épars

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6139

Grand jonc à tiges vertes et lisses et à gaines brunes mais non brillantes, à inflorescences irrégulièrement ramifiées assez denses, en position latérale, comportant de nombreuses fleurs petites (1 mm).

■ ***Juncus tenuis*** Willd. subsp. ***tenuis*** [Juncaceae]

Jonc ténu de Willdenow

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12328

■ ***Luzula campestris*** (L.) DC. subsp. ***campestris*** [Juncaceae]

Luzule champêtre

https://www.google.fr/search?q=Luzula+campestris+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c

■ ***Luzula forsteri*** (Sm.) DC. [Juncaceae]

Luzule de Forster

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6172

Vivace de 20 à 40 cm de haut, à feuilles étroites (< 5 mm) à fleurs brunes, petites (5 mm), solitaires, disposées en panicules lâches à rameaux dressés étalés mais non refractés.

■ ***Poa annua*** L. subsp. ***annua*** [Poaceae]

Paturin annuel au sens large

https://www.google.fr/search?q=Poa+annua+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c

Angiospermes Dicotylédones

■ ***Acer campestre*** L. [Sapindaceae]

Érable champêtre

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8522

Arbuste en général peu élevé (moins de 5 m, sauf exception), à feuilles de taille moyenne (10 cm max.), à 5 lobes arrondis et profonds et à samares aux ailes disposées en ligne droite.

Vit jusqu'à 200 ans. Parfois, comme les ormes, les rameaux surdéveloppent une couche de liège. Peut être utilisé comme un bois d'œuvre et comme arbre d'ornement. Mais le faible largeur du tronc rend son bois rare.

■ ***Adoxa moschatellina*** L. [Viburnaceae]

Moscatelle des bois

Du grec ado,ros (sans gloire), allusion probable au fait que le feuillage est terne et les fleurs peu visibles

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1951

Petite plante de sous-bois rhizomateuse à feuilles biternées à lobes obtus, munie d'une inflorescence terminale en glomérule de 4 à 6 fleurs à 5 pétales verts sauf la terminale à 4 pétales. Baie gloubleuse. Végétativement les bourgeons sur le rhizome ont une forme caractérisique en croc de chien, blanc.

Baie comestible

■ ***Ajuga reptans*** L. [Lamiaceae]

Bugle rampante

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3519

Vivace herbacée munie de très longs stolons, feuilles glabres et luisantes, à fleurs, sans casque, d'un bleu intense groupées en grappes courtes au sommet des tiges.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes en floraison

■ ***Alliaria petiolata*** (M.Bieb.) Cavara & Grande [Brassicaceae]

Alliaire officinale

Genre : du fait que son frossement dégage une odeur d'ail ; petiiolata : ses feuilles sont longuement pétiolées

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1468

Grande plante (jusqu'à 1 m de haut), à légère odeur d'ail, à feuilles longuement pétiolées, cordiformes et dentées et à fleurs blanches.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ ***Anemone nemorosa*** L. [Ranunculaceae]

Anémone sylvie

Du grec anemos (vent), allusion au fait que plusieurs espèces aiment les expositions ventées

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4411

Rhizomateuse de sous-bois à fleurs à 6 pétales blancs, anthères jaunes

■ ***Betula pendula*** Roth [Betulaceae]

Bouleau verruqueux au sens large

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1325

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, ecorce, bourgeon, sève - salicylate de méthyle à surveiller - L'étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'emploi aux personnes souffrant d'allergie aux dérivés salicylés

■ ***Calluna vulgaris*** (L.) Hull [Ericaceae]

Callune commune

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2651

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - tige en floraison

■ ***Carpinus betulus*** L. [Betulaceae]

Charme commun

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1328

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, bourgeon de feuille

■ ***Cirsium vulgare*** (Savi) Ten. [Asteraceae]

Cirse commun

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=691

Les jeunes pousses sont comestibles plutôt cuites

■ ***Crataegus laevigata*** (Poir.) DC. [Rosaceae]

Aubépine lisse

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4719

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, feuille, bourgeon de feuille, sommité fleurie - flavonoïdes, proanthocyanidols à surveiller

■ ***Cytisus scoparius*** (L.) Link subsp. ***scoparius*** f. ***scoparius*** [Fabaceae]

Cytise à balais de Linné

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9667

■ ***Digitalis purpurea*** L. subsp. ***purpurea*** [Plantaginaceae]

Digitale pourpre

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30976

Plante extrêmement toxique (10 g de feuilles sèches et 40 g de feuilles fraîches sont mortels pour l'homme) dont on extrait la digitaline ou digitoxine qui sont des glycosides cardiotoniques utilisés dans le traitement de la tachycardie et de l'arythmie cardiaque.

■ ***Epilobium hirsutum*** L. [Onagraceae]

Épilobe hirsute

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3891

Vivace dressée, à tiges souterraines traçantes, à feuilles inférieures opposées. Tige et feuilles hérissées de poils longs visibles de loin à l'oeil nu dans la partie médiane (mais glabres à la base). Feuilles à limbes lancéolés, dentés, sessiles et embrassant la moitié de la tige (donc adjacents 2 à 2). Grandes fleurs à pétales pourprés de 1,5 -2 cm et à style portant 4 stigmates étalés en croix.

■ ***Euphorbia amygdaloides*** L. subsp. ***amygdaloides*** [Euphorbiaceae]

Euphorbe des bois

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2682

■ ***Fagus sylvatica*** L. var. ***sylvatica*** f. ***sylvatica*** [Fagaceae]

Hêtre commun des forêts

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10040

■ ***Ficaria verna*** Huds. [Ranunculaceae]

Ficaire fausse-renoncule

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4516

Vivace basse (10 à 20 cm) à feuilles presque rondes, vert foncé, brillantes, parfois marquées de noir, longuement pétiolées et à remarquables fleurs à au moins 8 pétales d'un jaune vif brillant. Forme des colonies dans les zones fraîches. Racines tubérisées blanchâtres.

Pl. antihémorroïdale, vénéneuse

■ ***Fragaria vesca*** L. [Rosaceae]

Fraisier des bois

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4745

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, fruit

■ ***Galium aparine*** L. subsp. ***aparine*** [Rubiaceae]

Gaillet gratteron

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10168

■ ***Geranium pyrenaicum*** Burm.f. [Geraniaceae]

Géranium des Pyrénées au sens large

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30144

■ ***Geranium robertianum*** L. [Geraniaceae]

Géranium herbe-à-Robert

Au Moyen-Age, la plante aurait été nommée Herba-Ruperti, en l'honneur de St-Robert, 1er évêque de Salzbourg (VIII° siècle; fête le 27 mars), qui en aurait enseigné les propriétés thérapeutiques, mais aussi peut-être du latin ruber, rouge

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3435

Plante annuelle à limbe foliaire à contour triangulaire-pentagonal, peu luisant, à 3-6 segments bipennés, pétiolulés ou subsessiles. Fleur à pétales dépassant 1 cm, plus longs que les sépales, d'un rose plus ou moins clair et à anthères de couleur orangée de plus de 0,4 mm.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ ***Geum urbanum*** L. [Rosaceae]

Benoîte commune

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4758

La racine séchée a longtemps été utilisée pour ses propriétés, en remplacement du clou de girofle dont elle a d'ailleurs l'odeur.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

■ ***Glechoma hederacea*** L. [Lamiaceae]

Gléchome lierre-terrestre

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3549

Les limbes de jeunes feuilles sont les parties les plus aromatiques de cette plante comestible et médicinale.

■ ***Hedera helix*** L. subsp. ***helix*** f. ***helix*** [Araliaceae]

Lierre commun grimpant

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10318

■ ***Hypericum perforatum*** L. [Hypericaceae]

Millepertuis commun

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3494

■ ***Ilex aquifolium*** L. [Aquifoliaceae]

Houx d'Europe

de folium, feuille et acus, aiguille

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=326

■ ***Isopyrum thalictroides*** L. **R** [Ranunculaceae]

Isopyre faux-pigamon

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4461

Plante rhizomateuse formant des colonies de plusieurs mètres carrés, dressée, glabre et glauque, non ramifiée à feuilles inférieures longuement pétiolées, 2 fois divisées : souvent 9 segments lobés. Les feuilles caulinaires munies de stipules, sont presque sessiles à 3 divisions divergentes longuement pétiolulées. Les fleurs, longuement pédicellées (2-3 cm), possèdent 5 tépales blancs étalés de 7-10 mm et 5 nectaires tubuleux de 1-2 mm. Les 1 à 3 carpelles (souvent 2) donnent à maturité des follicules d'environ 1 cm.

■ ***Lamium galeobdolon*** subsp. ***montanum*** (Pers.) Hayek [Lamiaceae]

Lamier jaune des montagnes

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3564

■ ***Lonicera periclymenum*** L. subsp. ***periclymenum*** [Caprifoliaceae]

Chèvrefeuille des bois

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30219

Liane de 1 à 2 m, à feuilles caduques, elliptiques à lancéolées, atténuées et non soudées à la base, glabres, glauques dessous, les inf. brièvement pétiolées, les sup. sessiles, longues de 4-10 cm. Fleurs d'un blanc jaunâtre, odorantes, verticillées en têtes terminales longuement pédonculées.

■ ***Melampyrum pratense*** L. [Orobanchaceae]

Mélampyre des prés

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5387

Hémiparasite

■ ***Picris hieracioides*** L. [Asteraceae]

Picris fausse-épervière

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1102

■ ***Potentilla sterilis*** (L.) Garcke [Rosaceae]

Potentille stérile

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4822

■ ***Primula elatior*** (L.) Hill subsp. ***elatior*** [Primulaceae]

Primevère élevée

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13511

■ ***Prunella vulgaris*** L. [Lamiaceae]

Brunelle commune

https://www.google.fr/search?q=Prunella+vulgaris+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

■ ***Prunus avium*** (L.) L. [Rosaceae]

Cerisier des oiseaux

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4827

Arbre normalement sans drageon. Les feuilles possèdent deux nectaires extrafloraux sur leur pétiole.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, pédoncule

- ***Quercus petraea*** (Matt.) Liebl. [Fagaceae]
  Chêne sessile au sens large
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3291
- ***Rabelera holostea*** (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp []
  Grande-Stellaire holostée
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14627
- ***Ranunculus auricomus*** L. [Ranunculaceae]
  Renoncule tête-d'or
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4499
- ***Rumex acetosella*** L. [Polygonaceae]
  Oseille Petite
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4251
  Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, racine
- ***Saxifraga granulata*** L. [Saxifragaceae]
  Saxifrage granulée
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30340
- ***Stachys sylvatica*** L. [Lamiaceae]
  Épiaire des bois
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3697
  Pl. fétide
- ***Veronica officinalis*** L. [Plantaginaceae]
  Véronique officinale
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5517
  Elle a des propriétés astringentes, eupeptiques et cicatrisantes. La présence d'aucuboside, un anti-inflammatoire, contribue à soigner l'arthrose. La véronique combat aussi l'artériosclérose et a un effet antioxydant qui aide à combattre le diabète ; elle protège le foie, pour lequel elle est citée en conjonction avec d'autres plantes (pissenlit, chicorée, aspérule) par l'herboriste renommée Maria Treben qui la cite également pour l'excès de cholestérol, les blessures enflammées à cicatrisation difficile, l'eczéma chronique (avec l'ortie), les vieilles bronchites, la jaunisse, les affections de la rate, les troubles intestinaux, la nervosité issue de surmenage intellectuel et les vertiges. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes
- ***Veronica sublobata*** M.A.Fisch. [Plantaginaceae]
  Véronique presque lobée
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5512
  V. hederifolia est un alllohexaploïde, issu du croisement de V. sublobata (tétraploïde) et de V. triloba (diploïde), ce qui lui vaut une morphologie intermédiaire, variable, plus proche du 1er (2/3 du génome) que du 2e (1/3). De ce fait, il faut être extrêmement prudent dans les déterminations de V. sublobata qui possède de petites corolles, mais aussi un style fructifère et moins de 0,5 mm (en encore certaines populations de V. hederifolia possède un style court).
- ***Vinca minor*** L. [Apocynaceae]
  Pervenche Petite
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=325
  Myrmécochorie. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes - alcaloïdes indoliques (vincamine, eburnamenine) à surveiller - L'absence de vincamine doit être prouvée par des rapports d'analyse.
- ***Viola reichenbachiana*** Jord. ex Boreau [Violaceae]
  Violette des bois
  Reichenbach: botaniste allemand (1793-1879)
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5756
  Reichenbach: botaniste allemand (1793-1879) ; myrmécochorie
- ***Viola riviniana*** Rchb. [Violaceae]
  Violette de Rivinus
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14920

Amphibiens

- ***Lissotriton helveticus*** (Razoumowsky) [Salamandridae]
  Triton palmé
  https://www.google.fr/search?q=Lissotriton+helveticus+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c
- ***Rana sp.*** [Ranidae]
  Grenouille
  https://www.google.fr/search?q=Rana+sp.+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c

Insectes - Lépidoptères

- ***Aglais io*** Linnaeus []
  Le Paon-du-jour
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14001833

France - 28 : Saint Maixme Hauterive - Bourg d'Hauterive

avec : FEMENIA Marie-Isabelle, FEMENIA Pascal, GALAND Christian, MORICE Patrick, BOIN Michel, RUSSO KOPANSKA Alexandra, GOJARD Laurent, QUITARD Fanny, ROSENBERGER Mireille, PETIT Alain, BUISSON Daniel & BOCK Benoît



Lichens - Champignons

- ***Evernia prunastri*** (L.) Ach. [Parmeliaceae]
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2006582
  Utilisé en médecine traditionnelle, comme agent fermentant, pour teinter la laine en violet (toge romaine), par les embaumeurs de momies, comme bourre pour les pierres à fusil, pour blanchir les perruques et les protéger des mites, en biosurveillance de la qualité de l'air, en parfumerie pour apporter une note boisée aux parfums pour homme, mais serait aussi allergène.
- ***Hypogymnia physodes*** (L.) Nyl. [Parmeliaceae]
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2001482
- ***Physcia adscendens*** (Fr.) H. Olivier [Physciaceae]
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2002762
  Lichen facilement identifiable par ses petits lobes cucullés munis de cils ; les thalles souvent confluents peuvent couvrir des surfaces importantes.
- ***Ramalina farinacea*** (L.) Ach. [Ramalinaceae]
  https://www.google.fr/search?q=Ramalina+farinacea+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c

Bryophytes

- ***Rhytidiadelphus squarrosus*** (Hedw.) Warnst. [Hylocomiaceae]
  Hypne squarreux
  https://www.google.fr/search?q=Rhytidiadelphus+squarrosus
  Les pousses de cette mousse extrêmement commune mesurent entre 10 et 15 cm de long et se distinguent par la façon dont la partie effilée des feuilles de 2 à 2,5 mm de long se replie vers l'arrière à angle droit par rapport à la base de sorte qu'ils s'étalent et s'éloignent de la tige dans toutes les directions, donnant aux pousses une apparence d'étoile. La base large des feuilles enveloppe complètement la tige rouge de sorte qu'elle n'est visible qu'à travers les feuilles. La feuille a des bords légèrement dentés et une costa double courte. Les capsules sont généralement rares.

Angiospermes Dicotylédones

- ***Anthriscus sylvestris*** (L.) Hoffm. [Apiaceae]
  Cerfeuil des prés au sens large
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8626
  Vivace (ou rarement bisannuelle) glabre, à feuilles de forme variable, profondément, mais diversement divisées, à pétales entiers (ou légèrement échancrés), à fruits allongés (8 mm) lisses et noir brillant à maturité et à tiges creuses facilement compressibles.
  Les tiges et les jeunes fruits sont comestibles crues ou cuites
- ***Aubrieta deltoidea*** (L.) DC. [Brassicaceae]
  Aubriète d'Orient
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1507
- ***Bellis perennis*** L. [Asteraceae]
  Pâquerette vivace
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=493
  Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - inflorescences
- ***Cardamine hirsuta*** L. [Brassicaceae]
  Cardamine hirsute
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1592
  Plante intégralement comestible crue
- ***Chelidonium majus*** L. subsp. ***majus*** f. ***majus*** [Papaveraceae]
  Chélidoine Grande de Linné
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9311

■ ***Cymbalaria muralis*** G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. [Plantaginaceae]

Cymbalaire des murs
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30073

■ ***Draba verna*** L. [Brassicaceae]

Drave printanière
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1653

■ ***Geranium purpureum*** Vill. [Geraniaceae]

Géranium pourpre
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3437
Plante annuelle à limbe foliaire à contour triangulaire-pentagonal, peu luisant, à 3-6 segments bipennés, pétiolulés ou subsessiles. Fleurs à petites fleurs d'un rouge vif à pétales de moins de 10 mm dépassant peu les sépales et à anthères jaunes de moins de 0,4 mm.

■ ***Heracleum sphondylium*** L. [Apiaceae]

Berce sphondyle
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=187

■ ***Lactuca virosa*** L. [Asteraceae]

Laitue vireuse
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=996
Le latex au goût amer et à odeur forte possède des propriétés comparables à celui des opiacés. Il a été utilisé comme opium dans médecine traditionnelle et jusqu'au début du 20e siècle dans les pharmacopées de plusieurs pays pour son activité analgésique entre autres.

■ ***Lamium album*** L. [Lamiaceae]

Lamier blanc
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3557
Plante médicinale : diurétique, hémostatique et propriétés toniques, rafraîchissantes ou vulnéraires. Les jeunes feuilles et les fleurs sont comestibles.
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - corolle mondée, sommité fleurie, feuille

■ ***Plantago lanceolata*** L. var. ***lanceolata*** [Plantaginaceae]

Plantain lancéolé de Linné
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13301

■ ***Prunus spinosa*** L. [Rosaceae]

Prunellier commun
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4847
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, feuille, fleur

■ ***Ranunculus repens*** L. [Ranunculaceae]

Renoncule rampante
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4561
Vivace peu élevée mais à tiges très longuement rampantes (jusqu'à 2 m) s'enracinant aux noeuds, à feuilles divisées en segments dont le central est pétiolulé et à fleurs jaune d'or.

■ ***Sambucus nigra*** L. [Viburnaceae]

Sureau noir
SAMBUC = nom latin du sureau, ; NIGR = noir
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1968
C'est le vrai sureau, arbuste ou petit arbre avec de grands corymbes de fleurs blanches très odorantes à anthères jaunes fleurissant en fin de printemps, des feuilles à 5 folioles et des rameaux ligneux à moelle aérée.
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires. Les fleurs et les fruits cuits sont comestibles. Crus les fruits sont laxatifs. Plante médicinale.

■ ***Veronica persica*** Poir. [Plantaginaceae]

Véronique de Perse
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5522

■ ***Viola odorata*** L. [Violaceae]

Violette odorante au sens large
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5746
Plante médicinale et comestible (fleurs et feuilles).