

ESPÈCES INTÉRESSANTES  
DU DÉPARTEMENT  
DE LA CORRÈZE - III -

par Luc BRUNERYE  
et Robert MAISONNEUVE

R. MAISONNEUVE publie dans le bulletin de 1977, pp.113-123, une liste de 96 espèces jugées intéressantes qu'il a rencontrées sur le terrain corrézien durant les 5 années précédentes.

En 1978, pp. 288 à 316, paraît un premier complément, avec la collaboration de E. CONTRE. Notre éminent confrère a dépouillé les notes si précises qu'il a accumulées pendant ces dernières années, et il apporte ainsi une contribution inestimable à la connaissance de notre département. Ce travail considérable servira de base aux publications ultérieures.

Cette année, ce second complément sera plus bref ; il tiendra partiellement compte des espèces intéressantes vues au cours de la sixième session extraordinaire de la S.B.C.O. qui, vous le savez, s'est déroulée en Corrèze. Luc BRUNERYE, dont vous connaissez les publications si documentées, y apportera ses observations personnelles sur les espèces rares ou inédites.

Le numérotage continue : nous partirons donc de 190 pour les nouveautés, et nous affecterons de "l'exposant" 3 les numéros des espèces déjà citées.

Il nous semble qu'un quadrillage U.T.M. plus serré est souhaitable à l'échelle d'un département. En ajoutant (entre parenthèses) un troisième chiffre (1,2,3 ou 4), nous plaçons des carrés de 5 km. de côté. Par exemple, DL 24(2) désigne le petit carré sud-ouest du carré habituel DL 24.

Enfin, nous profitons de ce deuxième complément pour corriger quelques erreurs et imprécisions.

LYCOPODIACEES

- 01<sup>3</sup>.- *Lycopodiella inundata* (L.) Holub. Circumbor.  
(nous abandonnons le nom de genre *Lepidotis* Beauv. qui serait illégitime).  
- Pérols-sur-Vézère, Alt. 870 m., DL 24(2), tourbière au sud-ouest de la Saulière. La station est particulièrement riche ; la tourbière est entaillée par le ruisseau de Barsanges, déjà important, et alimenté par un réseau de ruisselets et de cuvettes très favorables.  
Vu par R. & Cl. M. sous la conduite de Mme COUFFY, le 4.X.1979.

PHANEROGAMES1.- Classe des DICOTYLEDONESSALICACEES.

- 108<sup>3</sup>.- *Salix pentandra* L. Eurasiat. (Boréo-alpin)  
 - Bonnefond, route de Péret-Bel-Air, bord de ruisseau au S.E. de la Naucodie. Alt. 880m, DL 23(1). L.B. 12.VIII.76.

ULMACEES.

- 109<sup>3</sup>.- *Ulmus glabra* Hudson (U.montana With.) Europ.-O.asiat., tendance montagnarde.  
 - Lestards, gorges de la Vézère, R. Alt. 550m, DL 14(1) L.B., 11.VIII.76.  
 - La-Roche-Canillac, r.d. du Doustre, au nord du bourg, après l'ancienne carrière. Alt. 350m, DL 10(3) L.B. et R.M. 6.VII.79.  
 - Lanteuil, vallée de la Loire, bord de la D. 150. Et entre Prugne et le Vialard. Alt. 200m, CK 99 (1). L.B., 9.VII.79.  
 - Sarroux, bois du château de Pierrefitte. Alt. 670m, DL 52(3). Sess.extr. S.B.C.O., 17.VII.79.  
 - St.-Cernin-de-Larche, chemin conduisant au fond du cirque de la Roche. Alt. 130m., CK 79(4). Sess. extr. S.B.C.O 20.VII.79.

SANTALACEES

- + 190- *Thesium alpinum* L. Orophyte eurasiatique.  
 - Affieux, chemin du Peuch à la Pierre des Druides, T.R. Alt. 600m, DL 03(3), L.B., 22.VII.71.  
 - St.-Rémy, Ft. de Bellechassagne, bords de la Liège entre Mirambel et le Madiolet. Alt. 690m, DL 45(2). L.B., 12.VIII.72.  
 - Sornac, bord de la Diège sous Pons, R. Alt. 670m, DL 35(3). L.B. et R.LU-GAGNE, 18.VIII.76.

CARYOPHYLLACEES

- 191 .- *Stellaria memorum* L. Europ.  
 - St.- Pantaléon-de-Lapleau, bords du Vianon, pont de la route de Lamazière-Basse à Lapleau. Alt. 360m. DL 31(3). L.B. et R.M., 11.VIII.75.  
 St.-Martial-Entraygues : r.d. du Doustre au sud de la Plantade. Alt. 250m., DK 19(3). L.B. et R.M. 6.VII.79.  
 - Bort-les-Orgues, bord de la Rhue en aval du Saut de la Saule. Alt. 440m, DL 62(1). Sess. extr. S.B.C.O., 17.VII.79.
- 16<sup>3</sup> .- *Lychnis viscaria* L. ssp. *viscaria*.  
 - Bort-les-Orgues, les Aubazines, talus au nord de la N. 679, face à un grand mur. Alt. 600m, DL 52(3) R.M. 20.VI.79.

FUMARIACEES

- 22<sup>3</sup> .- *Corydalis claviculata* (L.) DC. ssp. *claviculata* Eu-Atl.  
 - Treignac, éboulis au Rocher des Folles. Alt. 450m, DL 04(4). L.B. 10.VII.69  
 - Viam, ruines du hameau de Monceaux. Alt. 670m, DL 14(3). L.B. 7.VIII.71.  
 - Toy-Viam, talus de la route de Tarnac, au nord de la Genetouse. Alt. 750m, DL 15(3). L.B., 19.VII.71.  
 - Chaumeil, talus du chemin près de la Corrèze, sous le Vialaneix. Alt. 540m, DL 13(4). R.M. 10.IX.78.  
 - Grandsaigne, talus à Chazalnoël, Alt. 600m, DL 13(3) R.M. 25.VI.79.

- Grandsaigne, chaos rocheux sur le chemin de la pisciculture.  
Alt. 590m, DL 13(3). J.M. HOUMEAU et R.M. 23.VII.79.
- Ambrugeat, talus de la D.76, 1 km au sud de Lafond. Alt. 700m, DL 24(4).  
R. et Cl.M., 28.VI.79.
- Meymac, talus de la D. 36, près Eymanoux. Alt. 650m, DL 34(2) R.M. 3.VII.  
79.
- Chirac-Belleuve, petite lande marécageuse à *Peucedanum palustre* (voir  
n° 144), près la cote 617, DL 43(3). Sess. extr. S.B.C.O, 21.VII.79.

CRUCIFERES

- 23<sup>3</sup> .- *Myagrum perfoliatum* L. Sud-eur. et S.O. as.  
- Chasteaux, champ à Crochet. Alt. 160m, CK 89 (2), R.M.10.VI.79.  
- St.-Cernin-de-Larche, champ au cirque de La Roche. Alt. 130m., CK 74(4).  
Sess. extr. S.B.C.O., 20.VII.79.
- 192 .- *Neslia paniculata* (L.) Desv. (*Vogelia pan.* (L.) Hornm.).  
Stepp. or. devenu paléo-temp. N.  
- Chasteaux : voir 23<sup>3</sup>.
- 193 .- *Lunaria rediviva* L. Orophyte eurosib.  
- St.-Etienne-aux-Clos, gorges du Chavanon, ravin d'un ruisseau affluent  
2 km. en aval de l'ancienne gare. Alt. 600m., DL 54(3). L.B., 6.VIII.77.  
- Monestier-Port-Dieu, gorges du Dognon en amont de la route de Bort. Alt.  
550m, DL 63(1). L.B., 11.VIII.75.  
Etait signalée à Bort, bords de la Dordogne, par RUPIN, d'après LAMOTTE.
- +194.- *Lepidium neglectum* Thell. Nord-américaine,, adventice et naturalisée.  
- Sérandon, point de vue de Gratte-Bruyère. Alt. 450m, DL 41(4). L.B. et  
R.M., 11.VIII.75.

CRASSULACEES

- 119<sup>3</sup>.- *Sedum dasyphyllum* L. Subméridit.  
- Noailles, murs au Mourajoux. Alt. 260m, CK 89(1) R.M. 10.VI.79.  
- Turenne, chemin conduisant de la D.8 à la ferme de Briat. Alt. 290m,  
C.K. 89(4). L.B., 9.VII.79.
- 195 .- *Crassula tillaea* Lester-Garland (*Tillaea muscosa* L.) Sud et Ouest Europ.  
- Argentat, très abondant entre les pavés du vieux port.  
Alt. 170m, DK (19(4). L.B., 29.V.77. Signalé par RUPIN dans la vallée de  
Planchetorte, au sud de Brive.

SAXIFRAGACEES.

- 196 .- *Chrysosplenium alternifolium* L. Circumbor.  
- St.-Etienne-aux-Clos, gorges du Chavanon, avec *Lunaria rediviva* (voir  
n° 193).  
Signalé par RUPIN dans la région d'Ussel, et à Treignac d'après LAMY DE LA  
CHAPELLE. Non retrouvé dans cette dernière localité malgré des recherches  
attentives (mais la plante est discrète).

ROSACEES.

- 197 .- *Potentilla argenta* L. Circumbor.

- Noailles, au Mourajoux, pré sec. Alt. 270m, CK 89(1) R.M. 10.VI.79.
- Sarroux, talus à Puy-de-Bort, Alt. 790m, DL 52(3). R.M. 20.VI.79
- Sérandon, sur le pont de Vernéjoux. Alt. 340m, DL 52(2).R.M. 20.VI.79
- St.-Etienne-aux-Clos, terre-plein de l'ancienne gare de Savennes. Alt. 600m, DL 54(3) et DL 55(4). Sess. extr. S.B.C.O. 21.VII.79.

Nous signalons cette espèce, sans doute assez répandue, car nous ne l'avions pas observée avant cette année.

- +198.- *Potentilla heptaphylla* L. (*P. opaca* L., *P. rubens* (Crantz) Zimm. non Vill.) Centre-europ.
- Chenailers-Mascheix, serpentine de Bettu. Alt. 420m, DK 08(3). R.M. et L.B., 2.VIII.74.
  - Brivezac, serpentine de Toutou. Alt. 420m, DK 08(3). R.M. et L.B., 2.VIII.74.
  - Reygade, rochers de serpentine au S.E. de la ferme du Bousquet. Alt. 480m, DK 18(1). R.M. et L.B. 6.VIII.75.
  - Mercoeur, rochers, pelouses et bois sur serpentine, à l'est du hameau de Cauzenille. Alt. 400m, DL 18(4). R.M. et L.B. 6.VIII.75.
  - Le Lonzac, rochers de serpentine du Plantadis. Alt. 400m, CL 93 (3). L.B. 23.VIII.77.
  - Le Lonzac, rochers d'éclogite au S.E. du bourg, dans la tranchée de l'ancien chemin de fer. Alt. 420m, DL 03(2). L.B. 21.VIII.77.
  - Sornac, bord de la Diège sous Pons. Alt. 650m, DL 35(3). L.B. et R. LUGAGNE, 18.VIII.76.
- 199 .- *Potentilla X aurimenta* Gremlé (= *heptaphylla* L.X *tabernaemontani* Ascherson).
- Naves, talus de la D. 23 près Vimbeille (scierie). Alt. 290m, DL 02 (2). R.M., mai 75.
- Localité signalée par M. CHASSAGNE (à Tulle), d'après l'herbier de POMMERET.
- +200.- *Alchemilla inconcinna* Buser Montagnarde, S. europ.
- Mestes, talus de la N. 679, r.d. de la Diège au "Pont Rouge". Alt. 580m, DL 43(3). Sess. extr. S.B.C.O., 17.VII.79.

#### PAPILIONACEES

- 201 .- *Chamaespartium sagittale* (L.) P. Gibbs (*Genistella sagittalis* (L.) Gams). Submédit.- subatl.
- Monestier-Port-Dieu, près le pont sur le Dognon. Alt. 600m, DL 63(1). R.M. 20.VI.74.
  - Saint-Julien-près-Bort, bord du D 127, près la Vedrenne. Alt. 750 m. DL 52(3). R.M. 20.VI.79.
  - Pérols-sur Vézère, pacage à l'ouest du chemin de la Saulière, peu après le pont de la voie ferrée. Alt. 850m, DL 24(2).
- Indiqué par Madame GOUFFY. Vu de nombreux pieds, (dont certains portent encore des gousses), sous sa conduite, le 4.X.1979 par R. et Cl.M.
- 123<sup>3</sup>.- *Cytisus purgans* (L.) Boiss. (*Genista purgans* (L.) DC.) O. médit., suboroph.
- Bort-les-Orgues, rochers escarpés au nord du saut de la Saule. Alt. 500m, DL 62(1). Sess. extr. S.B.C.O 17.VII.79.
- 29<sup>3</sup> .- *Vicia orobus* DC. in Lam. et DC Atl.
- St.- Rémy, forêt de Bellechassagne, bords de la Liège entre Mirambel et le Madiolet. Alt. 690m, DL 45(2). L.B. 12.VIII.72.
  - St. Etienne-aux-Clos, à l'ouest du D 27e, à la source du petit affluent du Chavanon qui, sur un cours de 1,2 km., dégringole sous la route, et,

après une cascade passe sous l'ancienne voie ferrée (cf n° 193). Une prairie à fond humide donnant sur une mare, présente sur la partie est, en pente, une colonie, fort dense et étendue, de ce *Vicia*.  
Alt. 725m. DL 54(3). R.M. 13.VIII.79.

- 202 .- *Coronilla scorpioides* (L.) Koch Eurymédit.  
- Chasteaux, champ à Crochet (cf. 23<sup>3</sup>).

#### THYMELEACEES

- +203.- *Daphne mezereum* L. Eurosib.  
- St.-Etienne-aux-Clos et Merlines, bois clairs entre le Chavanon et la voie ferrée. Pieds relativement nombreux, disséminés.  
Alt. 600m, DL 54(3) et 55(4). Sess. extr. S.B.C.O. 21.VII.79, et R. et CL.M. 13.VIII.79.

Rectificatif : L'un de nous (R.M.) avait à priori, étourdiment, qualifié de *D. laureola* les quelques pieds vus en 1977 !

#### LINACEES

- 204 .- *Radiola linoides* Roth Paléotempérée  
- Le Lonzac, serpentine du Plantadis. Alt. 400m, CL 93(3). très abondant le 21.VIII.77. L.B.  
- Chenailers-Mascheix, serpentine de Bettu. Alt. 420m, DK 08(3). rare le 26.VIII.77. L.B.

Espèce peu visible et d'abondance très variable suivant les conditions climatiques annuelles. Signalée par RUPIN à Brive, Juillac, Cornil, Darazac et aux champs de Brach.

#### HYPERICACEES

- 37<sup>3</sup> .- *Hypericum linarifolium* Vahl. Subatl.  
- Veix, talus et murets entre Pomier et Lacombe. Alt. 620m, DL 04(4). L.B. Juillet 64.  
- Chaumeil, entre le Suc-au-May et le puy de Chauzeix. Alt. 880m, DL 13(1). L.B. 25.VIII.77.

#### CISTACEES

- +205.- *Helianthemum salicifolium* (L.) Miller  
- Turenne, pré-bois à chênes pubescents de part et d'autre de la D. 19, aux abords de la commune de Nespouls. Alt. 320 m, CK 88(1). L.B. 9.VII.79.

#### OENOTHERACEES

- 39<sup>3</sup> .- *Circaea X intermedia* Ehrh. Médio-et N. eur-caucas.  
- Monestier-Port-Dieu, gorges du Dognon en amont de la route de Bort. Alt. 550m. env., DL 63(1) L.B. et R.M., 11.VIII.75.  
- Darnets, gorges de la Luzège au pont de la Violette. Alt. 500m, DL 33(2). L.B. 16.VIII.76.  
- Orgnac-sur-Vézère, bord de la Vézère sous Combarn. Alt. 200m, CL 82(2). L.B., 13.VII.79.

- Estivaux, bord de la Vézère en amont de Comborn, rive gauche.  
Alt. 220m, CL 82(2). L.B., 13.VII.79.

Les deux dernières stations, isolées (?) de l'aire est corrézienne, sont remarquables par leur basse altitude. Elles comptent certainement parmi les plus occidentales de la plante.

#### OMBELLIFERES

- 206 .- *Meum athamanticum* Jacq. Orophyte ouest et centre-europ.  
- Pérols-sur-Vézère, bord immédiat de la chaussée sur la route de Barsanges, à la sortie du bourg. Alt. 760m. DL 24(1).  
Sess. extr. S.B.C.O., 16.VII.79.

Vu sa station, cette plante ne semble pas spontanée (et est fort vulnérable). Cependant, elle a été signalée en Haute Corrèze à Aix par le Dr. F. LONGY (le canton d'Eygurande, Bull. Soc. Lettres, Sc. et Arts de la Corrèze, Tulle, 1893) d'après GONOD d'ARTEMARE.

- 207 .- *Astrantia major* L. Oroph. S. europ.  
- Saint-Etienne-aux-Clos :  
1.- Prairie à *Vicia orobus* (voir 29<sup>3</sup>). Petite colonie près de la route.  
2.- Bord du ruisseau parallèle au Chavanon, dans la prairie à 400 mètres au sud de la gare de Savennes.  
Alt. 600m, DL 54(3) Cl.M. 13.VIII.79  
Signalé à Aix par le Dr. LONGY (cf. 206)

- 139<sup>3</sup>.- *Myrrhis odorata* (L.) Scop. Orophyte sud et médio-eur-cauc.  
- Pêret-Bel-Air, talus de la D.76, au bourg. Alt. 780, DL 23(1). R.M. 28.VI.79.

Cette colonie, qui est fort prospère, provient du nettoyage du jardin du presbytère effectué en 1939. Cet "anis" (comme on l'appelle ici) aurait été introduit en 1919, en provenance de la Lozère.

- 142<sup>3</sup>.- *Selinum pyreneum* (L.) Gouan Orophyte S.O. europ.  
- Ruines des Cars, limite commune à Pérols-sur-Vézère et St-Merd-les-Oussines. Alt. 810m, DL 25(2). Sess. extr. S.B.C.O 16.VII.79.

- 42<sup>3</sup> .- *Peucedanum cervaria* (L.) Lapeyr. Médio-eur-cauc.  
- Jugeals-Nazareth, plateau calcaire au nord du bourg.  
Alt. 330m, CK 89(4). L. B. 13.VII.62.  
- Sioniac, plateau calcaire au nord de la commune, entre la D. 153 et la D. 153e. Abondant.  
Alt. 300-350m, DK 08(2). R.M. 1-X-79.  
- Curemonte, butte calcaire au nord de la jonction de la D. 153 et de la D. 153e. Alt. 320m, DK 08(2). R.M. 1-X-79.

Cette station exceptionnelle à *Erica scoparia* et *Stachelina dubia* en abondance, nous a été signalée par A. VILKS.

#### PYROLACEES

- 208 .- *Monotropa hypopitys* L. var. *glabra* Roth (*M. hypophegea* Wallr.)  
Circumbor.  
- Veix, TR, bois de pins. Alt. 650m, DL 04(4). L.B.  
- Merlines, chênaie claire près du Chavanon. Alt. 600m, DL 55(4).  
R.M. 13.VIII.79. T.R. (sous chêne).

PRIMULACEES

- 209 .- *Anagallis minima* (L.) E.H. L. Krause (*Centunculus minimus* L.)  
Eurasiatique.  
- Le Lonzac, serpentine du Plantadis. Alt. 400m, CL 93(3). L.B. abondant  
le 21.VIII.77.  
Indiqué par RUPIN à "Millevaches RR."

GENTIANACEES

- 210 .- *Gentiana campestris* L. Nord et Centr.-eur.  
- Sioniac: voir 42<sup>3</sup>. Pelouse sèche et rase entre des pins.  
RUPIN indique (n° 875) cette Gentiane : "Pré secs à l'ouest de Roche-de-  
Vic, sous Fontfrège C".

BORAGINACEES

- 149<sup>3</sup>.- *Symphytum tuberosum* L. ssp. *tuberosum*. Submédio.- S. eur.  
- Tulle : 1) La Solane, Alt. 230m, DL 01(2). R.M. 27.IV.74.  
2) St. - Calmine, Alt. 220m, DL 01(2), R.M. 12.V.73.  
- St.- Bonnet-Avalouze, pont sous le cimetière, Alt. 295m, DL 01(4). R.M.  
5.V.74.  
- Eyburie, bord de la D.3, près Chavagnac. Alt. 414m, CL 93(3) R.M. I.V.74.  
- Chenaillers-Mascheix, bord de la route près de la ferme du Mazeaud.  
Alt. 370m, DK 08(3). R.M. 07.V.1974.  
- Lanteuil, vallée de la Loire, bord de la D. 150 Et. entre Prugne et le  
Vialard. Alt. 200m, CK 99(1). L.B. 9.VII.79.  
- Estivaux, bord de la Vézère en amont de Comborn. Alt. 220m, CL 82(2).  
L.B. 13.VII.79.  
- Ségur-le-Château, bords de l'Auvézère en aval du bourg.  
Alt. 270m. CL 63(4). L.B. 24.VII.79.  
- Le Saillant d'Allassac, bord de la Vézère en aval du pont ;  
Alt. 110m, CL 71(4). R.M. 22.IV.76.

OROBANCHACEES

- 52<sup>3</sup> .- *Orobanche hederæ* Duby Médit.-atlantique  
- Turenne, chemin conduisant du D 8 à la ferme de Briat, T.A.  
Alt. 290m, CK 89(4). L.B. 9.VII.79.

PLANTAGINACEES

- 53<sup>3</sup> .- *Plantago maritima* L. ssp. *serpentina* (All.) Arcang. Orophyte S.O. europ.  
- Sioniac (voir 42<sup>3</sup>). Très abondant. Couvre le sol des chemins, terre-pleins,..  
- Curemonte (Voir 42<sup>3</sup>).

DIPSACACEES

- +211.- *Knautia arvernensis* (Briq.) Szabo Franco-ibérique  
- Cornil, entrée du ravin du "Pont de Cornil". Alt. 200m, CL 90(3). L.B.,  
6.VIII.77.

COMPOSEES

- 58<sup>3</sup> .- *Erigeron acer* L. ssp. *acer* Holarct. temp.  
 - Sioniac (voir 42<sup>3</sup>)  
 - Curemonte (voir 42<sup>3</sup>). Dans rocailles AR.
- 59<sup>3</sup> .- *Helichrysum stoechas* (L.) Moench Ouest médit.  
 - Perpezac-le-Blanc, puy de Pampelonne, coteaux et escarpements au S.E.  
 Très abt. Alt. 320m, CL 70(1). L.B. 4.VIII.77.  
 - Perpezac-le-Blanc, talus et coteaux le long des routes à l'extrémité est de la butte d'Ayen. Alt. 320m, CL 61(4). L.B. 4.VIII.77.  
 - Noailles, au Puy-Laborie. Alt. 280m, CK 89(1) assez abt. sur calcaire très sec. R.M. 10.VI.79.  
 - Curemonte (voir 42<sup>3</sup>).
- 212 .- *Bidens tripartita* L. Euras.  
 - Tulle, près du nouveau foirail. Alt. 200m, DL 01(2). R.M. 2.X.77.  
 - Aubazine, canal des Moines. Alt. 380, CL 90(4)  
 Sortie S.B.C.O du 3.IX.78.  
 - Moustier-Ventadour, chemin de Sérilhac. Après une longue bordure de superbes chênes d'Amérique, un champ nouvellement défriché, semé en sarrasin, présente dans sa partie fort humide au moins mille pieds de *Bidens*. Sa présence ici nous paraît un peu insolite.  
 Alt. 570m, DL 22(3). R.M. 3.VIII.79.
- 160<sup>3</sup> .- *Galinsoga ciliata* (Rafin.) S.F. Blake S. et Centr.amér. Adventice.  
 - Meymac, jardin à Lavaur. Alt. 750m. DL 34(2). R.M. 7.08.79
- 213 .- *Achillea ptarmica* L. Eurosib.  
 - St. Etienne-aux-Clos :  
 1) prairie à *Vicia orobus* (voir 29<sup>3</sup>)  
 2) très abondant dans la prairie au sud de la gare de Savennes (voir 207).
- 214 .- *Tanacetum vulgare* L. Eurosib.  
 - Aix :  
 1) bord ouest de la N. 89, peu avant le chemin de la Sauvette.  
 Alt. 740m. DL 55(2). R.M. 13.IX.78.  
 2) Châlons, entrée du village, à l'est.  
 Alt. 775m, DL 55(2) R.M. 13.IX.78.  
 - Veyrières, N.89, près "chez Brillaud", à l'est de la route.  
 Alt. 760m, DL 65 (1) R.M. 13.IX.78  
 - Egletons, sortie sur la route d'Argentat.  
 Alt. 590m. DL 22(3). R.M. 1.X.79.
- La tanaisie, qui envahit les bords de routes et terrains vagues au N.E du Massif Central, est chez nous très discrète.
- +215.- *Staehelina dubia* L. Médit.  
 - Perpezac-le-Blanc, puy de Pampelonne, coteaux et escarpements au S.E.  
 Alt. 320m, CL 70(1). L.B. 4.VIII.77.  
 - Chasteaux, Crochet, pré-bois sur le chemin de Chasteaux.  
 T.R. Alt. 310m, CK 89(2). R. DAUNAS, sess. extr. 20.VII.79.  
 - Curemonte, butte aride au nord du carrefour (cote 307) des D. 153 et D. 153e. Indiqué par A. VILKS (voir 42<sup>3</sup>).

Pousse sur des hectares, surtout à l'abri des touffes basses de genévriers



qui forment l'essentiel de la végétation.  
- Sioniac (voir 42<sup>3</sup>), beaucoup moins abondant.

- 162<sup>3</sup>. - *Senecio cacaliaster* Lam. Orophyte S.O et Médio-europ.  
- Monestier-Port-Dieu, gorges du Dognon. Alt. 550m, DL 63 (1), L.B.10.VII.62  
- Roche-le-Peyroux, gorges de la Diège. Alt. 480m env., DL 53 (2) L.B.  
23.VIII.64.  
- St. Rémy, forêt de Bellechassagne, bord de la Liège entre Mirambel et le  
Madiolet. Alt. 690m, DL 45 (2). L.B. 12.VIII.72.  
- Ambrugeat, forêt de la Cubesse, bords du ruisseau de la Saulière. Alt. 770m,  
DL 24 (2). L.B. 12.VIII.76  
- Darnets, gorges de la Luzège au pont de la Violette. Alt. 500m, DL 33(2).  
L.B. 16.VIII.76.

## II.- Classe des MONOCOTYLEDONES

### ALISMATACEES

- 69<sup>3</sup>. - *Sagittaria latifolia* Willd. (dén. incert.) N. amér.  
- St.- Priest-de-Gimel. La Sagittaire dont nous avons signalé l'existence  
au bord de l'étang de Ruffaud a très probablement été victime de la recti-  
fication de la route.

A. VILKS vient de nous signaler l'existence en abondance, sur la pointe  
nord-est de l'étang de Brach, d'une Sagittaire semblable. Alt. 530m, DL 12(2)

### CYPERACEES

- +216.- *Carex punctata* Gaud. Médit.-atlantique.  
- Cahus (LOT, mais tout près de la limite de la Corrèze, carrière de ser-  
pentine. Alt. 450 m, DK 17 (4). Sess. extr. S.B.C.O., 18-VII-79.

### GRAMINEES

- 77<sup>3</sup>. - *Botriochloa ischaemum* (L.) Keng (*Andropogon isch.* L.) Euro-Asiat. temp.-  
N. afr.  
- Curemonte et Sioniac, voir 42<sup>3</sup>.  
+217.- *Bromus ramosus* Huds. ssp. *benekenii* (Lange) Schinz et Thellung  
Euro-S.O. asiat.-N. afr.  
- Bort-les-Orgues, bord de la Rhue. Alt. 440 m, DL 62(1).  
Sess.extr. S.B.C.O., 17-VII-79.

Cela confirme la détermination que M. E. CONTRE signalait dans sa let-  
tre du 13-IX-1978 ; en ces lieux précis, il observait, le 7-IX-78, des *Bromus*  
*gr. asper*, à inflorescences "toutes démolies", ayant les principaux caractères  
de la ssp. *benekenii*, plante qu'il voyait alors pour la première fois...

### SPARGANIACEES

- 183<sup>3</sup>. - *Sparganium emersum* Rehm. (*S. simplex* Huds.) Holarctique.  
- St.-Merd-les-Oussines, la Vézère en amont de l'étang des Oussines.

Alt. 840 m, DL 25(4). L.B. et R. LUGAGNE, 18-VIII-76.  
-St.-Priest-de-Gimel, étang de Brach (voir 69<sup>3</sup>).

#### LILIACEES

- 184<sup>3</sup>. - *Veratrum album* L. Euras. temp.  
- Pérols-sur-Vézère, prairie plantée de jeunes épicéas au bord du ruisseau de Barsanges, près du bourg.  
Alt. 750 m, DL 24(1), Sess. extr. S.B.C.O., 16-VII-79.

Station exceptionnelle où les nombreux vératres dépassent 1,8 mètre.

- 188<sup>3</sup>. - *Erythronium dens-canis* L. Orophyte Euro-asiat. temp. (CHASSAGNE).  
- Marcillac-la-Croisille, lisière de bois le long du ruisseau de Gane-Bournat, au N.E. de Vergne. Alt. 500m, DL 21(4), R.M. avril 1972.  
- St.-Yrieix-le-Déjalat, pelouses plus ou moins protégées en bordure de bois. Alt. 750 m env., DL 23(1). Plusieurs stations voisines près le pont de Commerly, chemin de la Lavastre, sous Florentin (Cne de Bonnefond).  
- Gourdon-Murat, rive gauche de "la Corrèze de Pradines". Colonie très dense et étendue, sous "le Travers".  
Alt. 710 m, DL 14(2). R.M. 5-IV-1979.  
- Châlons d'Aix, chemin du Moulin à l'est de la N.89 (cote 728), après le passage à niveau. Alt. 740 m, DL 55(2). R.M. mai 1973.

Cette espèce dont l'élégance attire, est répandue dans toute la région de Meymac, Ussel... Une rue d'Ussel, récemment ouverte dans le lotissement "du Bois du Theil" est baptisée "rue des Pingeolles", du nom local de l'*Erythronium*.

- 86<sup>3</sup>. - *Lilium martagon* L. Euras.  
- Merlines, bois en pente, exposé vers l'est, un peu au nord des fours à chaux dits "de Gioux". Alt. 620 m, DL 55(4).

Observé lors de la Sess. extr. S.B.C.O. sous la conduite de Madame COUFFY, qui connaissait la station depuis de nombreuses années.

218. - *Polygonatum verticillatum* (L.) All. Euras. montagnard.  
- Saint-Merd-les-Oussines, bord du ruisseau des Fargettes, entre Fournol et Saint-Merd. Alt. 780 m, DL 25(2). L.B. 10-VIII-72.  
- Saint-Etienne-aux-Clos, gorges du Chavanon en aval de l'ancienne gare. Alt. 600 m, DL 54(3). L.B. 10-VII-62.  
- Saint-Rémy, forêt de Bellechassagne, petit ravin humide au N. du bois d'Iolet. Alt. 700 m, DL 45(2). L.B. 12-VIII-72.  
- Ambrugeat, forêt de la Cubesse, ruisseau descendant du Bouzetier. Alt. 780 m, DL 24(2). L.B., 12-VIII-76.

#### ORCHIDACEES

- 92<sup>3</sup>. - *Goodyera repens* (L.) R. Br. Holarctique, surtout mont.  
- Saint-Yrieix-le-Déjalat. La station du Pré-Malhomme n'a pas survécu à la coupe du bois de pins (et au saccage de toute une zone à proximité).

Mais, et c'est pour nous une grande satisfaction, de nombreuses petites colonies ne pouvaient échapper à l'oeil exercé de MM. SANDRAS, VILKS..., d'autant plus qu'elles avaient élu domicile tout près du camping municipal (lieu-dit : "la Croix de la Mission").

Alt. 760 m, DL 13(4). Sess; extr. S.B.C.O. 1979.

- 189<sup>3</sup>. - *Epipactis palustris* (L.) Crantz Euro-as. temp.-N. afr.  
- Branceilles, petit marécage sous Long. Alt. 140 m, CK 98(3). L.B. et R.M.  
août 1977.
- 96<sup>3</sup> .- *Ophrys scolopax* Cav. O. médit.  
- Noailles, au Puy-Laborie (voir 59<sup>3</sup>).  
- Turenne, pré-bois à chênes pubescents de part et d'autre de la D.19, aux  
abords de la commune de Nespouls.  
Alt. 320 m, CK 88(1). L.B., 9-VII-79.

OOOOOOOOOOOO