Date de parution : 1-10-1981 ISSN 0154 9898
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU CENTRE-OUEST, NOUVELLE SÉRIE, TOME 11, 1980

MARDI 15 JUILLET
ROC DE CUZE PRÈS DE SAINTE-ANASTASIE, CARRIÈRE PRÈS D'ALLANCHE, MARÉCAGES DE LANDEYRAT

Huit heures. Rien ne bouge au camping «Le Valagnon» de Laveissière, sauf au sud-est, dans l'extrême pointe, la «Réserve», où les tentes et les caravanes des membres de la S.B.C.O. entourent le camping-car de Monsieur SAPALY. Là, tout le monde est sur pied. On regarde monter de l'ouest des nuages menaçants ; après un dernier regard sur la rive gauche de l'Alagnon où croît *Arabis cebennensis*, chacun s'apprête à rejoindre l'esplanade de l'hôtel. A huit heures 35 le car sera là ; il doit conduire toute la délégation à Murat, puis sur la route d'Allanche, la N 679.

PREMIER ARRÊT

Un kilomètre au sud de Sainte-Anastasie, à hauteur du rocher de Cuze (DL 98.00 et 98.01).

1°) - La végétation des bords de la N 679 rappelle par de nombreuses espèces la flore calcicole telle qu'on la connaît par exemble au nord d'Angoulême :

Poa bulbosa
Muscari comosum
Euphorbia brittingeri
Silene nutans ssp. *nutans*
Dianthus carthusianorum
Helleborus fœtidus
Papaver dubium
Helianthemum nummularium ssp. *nummularium*
Sedum album
Sedum reflexum
Sanguisorba minor ssp. *minor*
Potentilla argentea
Chamaespartium sagittale
Trifolium dubium
Trifolium medium ssp. *medium*
Anthyllis vulneraria ssp. *vulneraria*
Hippocrepis comosa
Vicia hirsuta
Vicia cracca
Vicia lutea ssp. *lutea*
Lathyrus pratensis
Geranium lucidum
Geranium columbinum
Geranium pyrenaicum
Cornus sanguinea ssp. *sanguinea*
Laserpitium latifolium
Echium vulgare
Digitalis lutea ssp. *lutea*
Prunella vulgaris
Galium verum ssp. *verum*
Galium aparine
Sambucus ebulus
Achillea millefolium ssp. *millefolium*
Lactuca viminea ssp. *viminea*

L'*Anthyllis vulneraria* s'éloigne de la forme type commune en Charente : le calice est un peu plus large (5 mm), non taché de rouge à l'apex, les feuilles inférieures ont des folioles allant croissant jusqu'à la terminale, les feuilles supérieures ont des folioles étroites et égales, toutes à 7-11 folioles ; la corolle enfin est d'un jaune plus vif.

Certaines espèces angoumoisines font défaut, *Coronilla varia* par exemple. Mais des montagnardes, quelques plantes du sud-est de la France, s'y ajoutent. Les plus intéressantes pour les congressistes sont :

Dianthus deltoides
Saponaria ocymoides
Thlaspi arvense
Saxifraga continentalis (abondant)
Trifolium incarnatum ssp. *molinerii*
Vicia onobrychioides
Epilobium angustifolium
Campanula persicifolia ssp. *persicifolia*

A noter que certains exemplaires de *Vicia onobrychioides,* par leurs grappes plus serrées, à plus de douze fleurs, celles-ci de 18 mm de long seulement, et leur stipules non dentées, semblent se rapprocher de *Vicia cracca.*

2°) - Un chemin descend dans la vallée de l'Allanche, en partie boisée ; parmi les essences forestières, les plus abondantes sont : *Fagus sylvatica, Quercus robur* ssp. *robur* et *Corylus avellana.* Nombre de plantes, banales pour le Centre-ouest, constituent une flore bien moins



Sainte-Anastasie ; flanc SO du Roc-de-Cuze (15).
O : orgues basaltiques avec fétuque (f) et lichens nitrophiles ;
(I) : parois verticales ou en surplomb, inaccessibles sans matériel d'alpinisme ;
C : chênaie - frênaie à noisetier ; 21.7.1980 (photo A. LECOINTE).

Tourbière d'Allanches (15 juillet) (Photo M. BOTINEAU).

Roc de Cuze. 15 juillet 1980.
Polemonium caeruleum (Photo M. BOTINEAU).

Champ de Narcisses sur les pentes du Plomb du Cantal, vers 1650 m (Photo J.-M. HOUMEAU).

Arrivée au sommet du Plomb du Cantal, le 16 juillet 1980, vers midi, dans les nuages (Photo J.-M. HOUMEAU).

nettement calcicphile que celle des bords de la N 679 :

Polypodium vulgare
Arrhenatherum elatius ssp. *elatius*
Trisetum flavescens ssp. *flavescens*
Cynosurus cristatus
Moehringia trinervia
Stellaria graminea
Silene vulgaris ssp. *vulgaris*
Fragaria vesca
Geum urbanum
Genista pilosa
Ulex europaeus ssp. *europaeus*
Cytisus scoparius ssp. *scoparius*
Trifolium striatum
Trifolium arvense
Trifolium ochroleucon
Vicia sepium
Lathyrus montanus
Epilobium montanum
Dactylis glomerata s. l.
Platanthera bifolia
Mercurialis perennis
Euphorbia dulcis
Anthriscus sylvestris
Conopodium majus
Myosotis sylvatica ssp. *sylvatica*
Melampyrum pratense s. l.
Prunella laciniata
Galeopsis tetrahit ssp. *tetrahit*
Lamium album
Galium pumilum
Cruciata laevipes
Lonicera xylosteum
Campanula patula ssp. *patula*
Campanula rotundifolia
Crepis biennis
Hieracium maculatum

Le caractère régional est marqué par les espèces suivantes, inconnues ou fort peu répandues dans le Centre-ouest :

Cystopteris fragilis
Lilium martagon
Amelanchier ovalis
Geranium phaeum
Heracleum sphondylium ssp. *sibiricum*
Knautia dipsacifolia ssp. *dipsacifolia*
Valeriana tripteris
Senecio helenitis ssp. *helenitis*

Près des bâtiments abandonnés, on retrouve des espèces habituelles :

Fumaria officinalis
Geranium pusillum
Erodium cicutarium ssp. *cicutarium*
Conium maculatum
Anchusa arvensis ssp. *arvensis*
Dipsacus fullonum
Chamomilla suaveolens

auxquelles s'ajoute *Chenopodium bonus-henricus*

3°) - Au bord même de l'Allanche, sur la rive droite, des frênes (*Fraxinus excelsior* ssp. *excelsior*) s'ajoutent aux arbres déjà cités. L'espèce la mieux représentée est ici *Chaerophyllum aureum ;* elle croît en compagnie de plantes plus communes en notre région :

Silene dioica
Alliaria petiolata
Impatiens noli-tangere
Valeriana repens (voisine de *V. officinalis*)

Sur la rive gauche de l'Allanche, si nous avions disposé d'un peu plus de temps, nous aurions pu voir, au pied du dyke spectaculaire : *Saxifraga paniculata* ssp. *paniculata* et *Polemonium caeruleum.*

DEUXIÈME ARRÊT Côté est de la N 679, anciennes carrières à cinq kilomètres au sud d'Allanche (Commune de Sainte-Anastasie, DL 96.03).

C'est une magnifique station à *Lychnis viscaria* ssp. *viscaria.* Sont aussi représentées les espèces suivantes :

Deschampsia cespitosa ssp. *cespitosa*
Ophrys apifera ssp. *apifera*
Herniaria glabra ssp. *glabra*
Alchemilla xanthochlora
Trifolium ochroleucon
Vicia onobrychioides
Conium maculatum
Seseli libanotis var. *pyrenaicum* (1)
Armeria alliacea ssp. *alliacea*
Laserpitium latifolium
Verbascum lychnitis
Digitalis lutea ssp. *lutea*
Orobanche caryophyllacea
Acinos arvensis
Origanum vulgare
Logfia minima

(1) - Cette variété, caractérisée, selon Fournier, par ses feuilles à lanières étroites et aiguës, ne figure pas dans FLORA EUROPAEA.

Le repas de midi est pris sur la grand place d'Allanche. Le ciel est toujours menaçant mais la pluie n'apparaît vraiment que lorsque tout est terminé. Le car reprend alors vers le nord la N 679. Ce trajet nous permet d'admirer à gauche (côté est) de belles orgues basaltiques, tandis qu'apparaissent à l'ouest les toitures de Landeyrat.

TROISIÈME ARRÊT

Deux kilomètres plus au nord, après avoir dépassé le marais tourbeux que nous nous proposons d'explorer (DL 89.14 et 89.15), le car nous dépose à l'embranchement de la route des Salesses et il ira nous attendre, revenant de quelques centaines de mètres plus au sud, où commençait notre station. Il pleut, et Monsieur SAPALY se voit contraint d'ouvrir son parapluie.

1°) - Il est possible d'herboriser sur les bords de route et d'y reconnaître :

Chenopodium bonus-henricus
Thlaspi alpestre ssp. *alpestre*
Barbarea verna
Lathyrus sylvestris
Pimpinella major var. *rubra*
Angelica sylvestris
Heracleum sphondylium ssp. *sibiricum*
Galeopsis tetrahit ssp. *tetrahit*
Gentiana lutea ssp. *lutea*

Un Leontodon présente des feuilles à pétiole presque aussi long que le limbe, comme *Leontodon pyrenaicus*, mais c'est une plante de soixante centimètres de haut, le limbe des feuilles est nettement denté et une seul bractéole précède le capitule. Ce pourrait être *Leontodon X kaiseri* Murray, hybride de *L. Pyrenaicus* et de *L. hispidus.*

2°) - Le marécage lui-même est naturellement très intéressant. A côté d'espèces que l'on pourrait rencontrer dans le Limousin, certaines autres sont nettement plus montagnardes ou plus particulières à la région.

Parmi les premières nous avons noté :

Equisetum fluviatile
Deschampsia cespitosa ssp. *cespitosa*
Molinia caerulea ssp. *caerulea*
Briza media ssp. *media*
Nardus stricta
Carex ovalis
Carex curta
Carex nigra s. l.
Carex vesicaria
Scirpus cespitosus s. l.
Eriophorum vaginatum
Luzula multiflora ssp. *multiflora*
Paris quadrifolia
Rumex acetosa ssp. *acetosa*
Polygonum bistorta
Caltha palustris
Ranunculus flammula ssp. *flammula*
Rorippa pyrenaica
Viola palustris ssp. *palustris*
Saxifraga granulata ssp. *granulata*
Potentilla palustris
Potentilla erecta
Sanguisorba officinalis
Genista pilosa
Epilobium palustre
Conopodium majus
Calluna vulgaris
Myosotis gr. scorpioides
Rhinanthus minor
Pedicularis palustris ssp. *palustris*
Menyanthes trifoliata
Galium palustre
Galium saxatile ssp. *saxatile*
Valeriana dioica ssp. *dioica*
Scorzonera humilis ssp. *humilis*

Les espèces plus représentatives de la région sont :

Trollius europaeus ssp. *europaeus*
Viola lutea ssp. *lutea*
Geum rivale
Trifolium spadiceum
Vaccinium uliginosum ssp. *uliginosum*
Phyteuma gallicum
Senecio helenitis ssp. *helenitis*

3°) - Certaines plantes n'ont été découvertes qu'à l'est de la N 679 : D'abord une forme de *Narcissus poeticus* qui présente les principaux caractères de la sous-espèce *radiiflorus,* que la Flore d'Auvergne de M. CHASSAGNE ne signale que dans les «Montagnes de Laguiole (Aveyron)».

Puis des orchidées :

Platanthera chlorantha *Dactylorhiza maculata* ssp. *maculata*
Dactylorhiza majalis ssp. *majalis,*
avec un pied très robuste, à fleurs blanches, que nous ne savons trop comment nommer (1)

Signalons encore :

Carex disticha
Eriophorum angustifolium
Salix repens (peut-être hybridé)
Drosera rotundifolia
Sedum telephium ssp. *telephium*
Meum athamanticum
Selinum pyrenaeum
Andromeda polifolia
Gentiana pneumonanthe (non fleurie)
Arnica montana ssp. *montana*
Cirsium rivulare
Cirsium palustre

et leur hybride : *Cirsium X subalpinum.*

M. MÉMIN constate que dans cette partie du marécage le PH est voisin de 5. Il y a aussi quelques champignons ; les plus remarquables sont : *Mitrula paludosa* Fr. et *Omphalia umbellifera* Pers. ex Fr.

Dans un secteur moins humide croissent : *Orchis ustulata* et *Geranium sylvaticum* ssp. *sylvaticum.*

4°) - Un bois de conifères borde à l'ouest le marécage. Le sous-bois ne manque pas d'intérêt, puisque nous avons le temps, avant de repartir pour Laveissière, d'y noter la présence des espèces suivantes :

Allium victorialis
Polygonatum verticillatum
Cerastium arvense ssp. *arvense*
Stachys officinalis
Galium rotundifolium
Cicerbita plumieri

Une journée bien remplie se termine.

René CHASTAGNOL

(1) - M. DAUGE et M. et Mme LABATUT sont retournés, après la session, dans cette tourbière, pour examiner de plus près cette orchidée à fleurs blanches. Ils pensent qu'il s'agit de l'hybride *D. majalis X incarnata* var. *ochroleuca.* Ils ont trouvé dans la même station d'autres orchidées à fleurs blanches, moins robustes, qui leur ont semblé être *Dactylorhiza incarnata* var. *ochroleuca.* Il y avait aussi, dans le voisinage, quelques pieds de *Dactylorhiza incarnata* ssp. *incarnata* de couleur normale.