

Contributions à l'inventaire de la flore (Contributions collectées par André TERRISSE)

Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, **les trouvailles intéressantes** qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, **avant le 15 février**, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants :

- le nom de la plante ;
- le lieu exact **avec indication de la commune** (si possible, les coordonnées U.T.M.) et la date de la découverte ;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station.

On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le bulletin précédent.

Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce - qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du "Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination confirmée par ...".

De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :

- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier ;

- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop communes ;

- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

N.B. : Les départements sont rangés par ordre alphabétique.

Aude

Contribution de Michel BOUDRIE

- *Blechnum spicant*

- Talus humides et bord du ruisseau de Peyrouse, alt. 830 m, La Font des Cos, à 1,8 km au sud-ouest de Laprade (mars 1995!, DJ 30).

- Bord de ruisseau sous hêtraie, alt. 710 m, vallée du Linon, forêt de la Loubatière, près du carrefour des routes D 203, D 562 et D 253, à 2,2 km au nord-est de Lacombe. Avec une belle station d'*Equisetum hyemale* (mars 1995!, DJ 30).

Charente

Contribution de Michel BOUDRIE

- *Asplenium obovatum* subsp. *lanceolatum* :

Sur une indication de M. ROGEON d'un *Asplenium* du groupe *billotii-foreziense* à morphologie indécise, je suis allé prospecter en janvier 1996 les coteaux de la rive droite de l'Issoire en aval du pont de la D 80 au sud-ouest de Brillac (CM 20). J'ai ainsi pu observer dans les rochers siliceux une belle population (plus d'une quarantaine de pieds bien développés) d'*A. obovatum* subsp. *lanceolatum* (= *A. billotii*) qui est protégé en Charente. Il s'agit donc de la deuxième population connue dans le département, la première se trouvant dans la vallée de la Tardoire, vers Ecuras (Cf. A. TERRISSE, *Bull. S.B.C.O.* 1978, **9** : 248, et M. BOUDRIE, *Bull. S.B.C.O.* 1993, **24** : 327). Par ailleurs, bien qu'*A. foreziense* soit connu plus en aval à Saint-Germain-de-Confolens (vu en avril 1986, mais non revu depuis, sans doute disparu ; Cf. BOUDRIE, *Bull. S.B.C.O.* 1988, **19** : 68-69), aucun pied de cette dernière espèce n'a été vu vers Brillac. Il serait notamment intéressant de prospecter les coteaux de l'Issoire entre Brillac et Saint-Germain-de-Confolens pour essayer de le retrouver.

- *Asplenium x alternifolium* nothosubsp. *alternifolium* : (*A. septentrionale* x *A. trichomanes* subsp. *trichomanes*) :

Un pied de cet hybride, *inter parentes*, a été observé en janvier 1996 sur les rochers siliceux de la rive droite de l'Issoire, en aval du pont de la D 80 au sud-ouest de Brillac, un peu plus en aval que les stations d'*A. obovatum* subsp. *lanceolatum*. Cet hybride avait été signalé à Saint-Germain-de-Confolens par E. CONTRÉ (Cf. A. TERRISSE, *Bull. S.B.C.O.* 1977, **8** : 38, et M. BOUDRIE, *Bull.*

S.B.C.O. 1988, 19 : 71-72 ; vu en 1986, non revu depuis, sans doute disparu).

- *Polystichum aculeatum*

- Coteau boisé en rive droite de la Tardoire, en amont du pont de la D 699, à 1,5 km à l'est des Limousines, à 3 km à l'est - nord-est d'Écuras. Quelques rares pieds assez localisés. Dans le même secteur, en abondance, *P. setiferum*, et un pied de l'hybride *Polystichum x bicknellii* (février 1995!, CL 16).

Charente-Maritime

Contribution de : A. TERRISSE et J. TERRISSE

Les indications qui suivent concernent toutes l'île de Ré.

1 - Espèces nouvelles pour Ré, à ajouter à l'Inventaire :

- *Chamaemelum mixtum*

- Au bord d'une rue de la Patache (XS 1621, J.T., 25 mai 1995). Quelques pieds seulement ; il est normal que cette espèce calcifuge soit rare sur Ré.

- *Luzula campestris*

- Les Bragauds (XS 3113, A.T., 9 avril 1995). Quelques pieds au bord d'une piste en sous-bois, à l'entrée d'un terrain qui sert au camping d'été. Il s'agit également d'une espèce calcifuge.

- *Oenanthe fistulosa*

- A l'est du Bois, au sud-ouest de Mille Fleurs XS 2516, A.T., 10 mai 1995) ; en tout début de floraison, alors que *Oenanthe silaifolia*, présent dans la même station, est en fin de floraison.

- *Ranunculus peltatus* subsp. *peltatus*

- Au sud-ouest de La Couarde, lieu-dit les Folies (XS 2216, A.T., 16 mars 1995). Son apparition s'explique sans doute par l'hiver humide, le premier depuis plusieurs années.

- *Vulpia ciliata* subsp. *ambigua*

- La Patache (XS 1621, J.T., 25 mai 1995). Sa présence sur Ré est sans doute sous-estimée, car elle est facile à confondre avec d'autres espèces du même groupe (d'où sans doute le qualificatif d'*ambigua*) ; malgré l'adjectif spécifique, les lemnes ne sont pas ciliées.

2 - Stations nouvelles pour :

- *Spiranthes spiralis*

- Au sud du Peu des Aumonts (XS 2614, A.T., 28 septembre 1995). Quelques dizaines de pieds. L'habitat est inhabituel : sous-bois clair de pins maritimes ; les rosettes de feuilles sont entièrement cachées par les aiguilles !

- A la Patache, en plus de la station déjà connue, on pouvait cette année rencontrer quelques tiges fleuries au bord de plusieurs rues (XS 1620, A.T., 5 octobre 1995).

Contribution de Christian YOU

- *Adiantum capillus-veneris*
 - Pons, rue Charles de Gaulle, premier pont en direction de la gare (janvier 1996).
- *Adonis annua* subsp. *annua*
 - Saint-Médard (Cne d'Ozillac), bords des chemins, la Maison Neuve (mai 1993).
- *Althaea hirsuta*
 - Nougêroux (Cne de Bougneau), friches, à la Combe Chenard (juin 1993).
- *Aquilegia vulgaris*
 - Pons, Les Coteaux, près de l'ancien vivier (mai 1994).
 - Les Chenards, talus bordant la route juste avant l'autoroute (mai 1995).
 - Les Roches, chemin forestier partant des Morineaux au village de Berteaux, à la hauteur de l'Aube du jour (juin 1994).
 - Bois de Villars-en-Pons, les Hauts Journaux (mai 1995).
 - Soubran, aux abords de l'étang, avant les Chapelles (juin 1994, mai 1995).
 - Forêt de Pons, piste forestière, le Grand Val (1995).
- *Avenula pratensis* subsp. *pratensis*
 - Coteaux autour de Font des Merles, près du terrain de moto-cross (Cne de Bougneau, juin 1995).
- *Bupleurum lancifolium*
 - Nougêroux (Cne de Bougneau), friches, à la Combe Chenard, en mélange avec *Xeranthemum cylindraceum* (juillet 1993).
- *Butomus umbellatus*
 - Marjolence (Cne de Pons), bords de Seugne, çà et là, au niveau de l'ancienne pisciculture et des terrains riverains appartenant à la Société de Pêche Pontoise (juin 1994).
- *Calepina irregularis*
 - Meussac, en bordure des vignes, et à Pons, parking des Pêcheurs, près de l'ancienne pisciculture (avril 1993).
- *Campanula trachelium* subsp. *trachelium*
 - Soute, près de Pons, à l'entrée des anciennes carrières (juin 1993).
 - Avy, bois de l'Aube du Jour (juin 1994).
- *Centaurea cyanus*
 - Cravans (Cne de Gémozac), la Viaudrie ; revient avec les jachères (juin 1994).
- *Chrysanthemum segetum*
 - Le Terrier Blanc (Cne de Soubran), vignes çà et là (mai 1995).
- *Corylus colurna* (Coudrier de Byzance)
 - Pons, avenue des Trois Ormeaux (août 1995).
- *Crepis pulchra*
 - Carrefour de Montils-Colombiers, route de Beillant, talus (juin 1993).
 - Champagnac (Jonzac), talus, ancienne voie romaine (mai 1995).
- *Cucubalus baccifer*
 - Pons, les Coteaux, talus boisés, bords de la D 142 et en face du chemin de Soute (juillet 1994).

- Entrée du parc de la Thibauderie (juillet 1994).
- Chemin de Marennes, avant l'ancien moulin, à la hauteur de Bois Bernard (juillet 1994).
- Aux Chartres, bords de la D 142 (juillet 1994).
- Fondurant, à la Font Sèche (août 1993).
- *Digitalis purpurea* subsp. *purpurea*
 - Soubran, bordure de bois, le Jard (juin 1993).
 - Entre Soubran et Boisredon, bords du chemin coupant le Gué de la Marguerite, près de Dodin-Haut et dans les anciennes sablières (mai 1995).
 - Sortie de Soubran, route de Mirambeau, avant les Chapelles, piste forestière autour de l'étang (mai 1995).
- *Filaginella uliginosa* subsp. *uliginosa*
 - Pons, bois des Ragideaux, fief d'Agrippa d'Aubigné, près du lieu-dit Versailles, en compagnie de *Juncus tenuis*, sentier forestier humide (juillet 1994).
- *Frangula alnus*
 - Les Coteaux, aux abords de l'ancien vivier, bord de la Soute (Cne de Pons, juin 1994).
- *Genista tinctoria*
 - Villexavier, Chez Jonas, coteaux calcaires.
 - Route d'Archiac, bords de la D 251e2, direction Saint-Martial-sur-Né (mai 1995).
- *Geranium lucidum*
 - Pons, les Chauveaux, sentier du ball-trap (mai 1994).
- *Gladiolus italicus*
 - Saint-Médard, çà et là, bords de la D 154, sentiers, chemins, coteaux, La Maison Neuve et aux anciens moulins de Chaillot (mai 1995).
 - Route d'Archiac, sortie de Pons, le Renclos et les Fourcades (avril 1993).
 - Marignac, talus à la sortie du bourg, entre Pons et Jonzac (mai 1994).
- *Lactuca perennis*
 - Près de Pons, carrefour de Montils-Colombiers, route de Beillant (juin 1993).
 - Villexavier, entre Jonzac et Montendre, Chez Jonas, D 154 (juin 1994).
- *Lactuca viminea* subsp. *chondrilliflora*
 - Nougéroux (Cne de Bougneau), à la Combe Chenard (juin 1993).
- *Lamiastrum galeobdolon* s. l.
 - Avy, Chez Méneau, en compagnie de *Primula vulgaris* subsp. *vulgaris*, de *Primula veris* subsp. *veris* et leurs hybrides, et plus à l'ouest, entre Bertheau et Font Robin, puis à Font de Boubrie, entre Avy et Fléac (avril 1993).
- *Linum strictum* subsp. *strictum*
 - Bougneau, Nougéroux, Combe Chenard, près de Pons (juin 1993).
 - La Conche (Cne de Meschers-sur-Gironde), entre la plage de l'Arnèche et la plage des Vergnes (juin 1995).
- *Linum trigynum*
 - Nougéroux (Cne de Bougneau), friches, à la Combe Chenard, avec *Linum strictum* subsp. *strictum* (juin 1993).
 - Meussac, route de Pons à Archiac, talus, chemin d'Usson (juin 1993).
- *Lithospermum officinale*
 - Nougéroux (Cne de Bougneau), friches et vignes, à la Combe Chenard (juin 1993).

- *Neottia nidus-avis*
 - Saint-Genis, allée du château de Saint-Julien (avril 1993).
 - Fléac-sur-Seugne, bois du Prêtre (avril 1994).
 - Forêt de Pons, bois longeant le Grand Val (mai 1994).
- *Ophioglossum lusitanicum*
 - Les Coteaux (Cne de Pons), autour de l'ancien vivier.
 - Route de Villars-en-Pons, dépression humide, près du pont de l'autoroute (mai 1994).
 - Forêt de Pons, importante station, grottes de Bois Bertaud (mai 1994).
- *Ophrys fusca* subsp. *fusca*
 - Saint-Médard (Cne d'Ozillac), coteaux à l'entrée du bourg de Saint-Médard (avril 1993).
- *Ornithogalum pyrenaicum*
 - Pons, Les Coteaux (juin 1995).
 - Les Roches (Cne de Pns), bois de l'Aube du Jour (juin 1994).
 - Forêt de Pons, le Grand Val (mai 1994).
- *Oxalis corymbosa*
 - Vignes envahies, à Pons, face au Lycée Technique (juillet 1995).
- *Platanthera bifolia*
 - Bois des Graves (Cne de Thénac), à la Combe du Loup, chemin forestier (mai 1994).
 - Bois des Roches (Cne de Pons), à l'Aube du Jour.
- *Ranunculus ficaria* subsp. *bulbilifer*
 - Pons, la Thibauderie, parterres près des dépendances du Logis (avril 1993).
- *Scilla autumnalis*
 - Pons, village de Fondurant, talus près du lavoir (août 1993).
- *Scorzonera hirsuta*
 - Avy, près de Pons, coteaux de Peu Gros, au-dessus de l'aérodrome de Pons-Avy, autour du bois de *Pinus nigra* s.l. (juin 1994).
 - Meschers, Conche de l'Arnèche (juin 1993).
 - Pons, bords de la Soute, camping, piscine, et çà et là, ruelle des Eaux Barrées (avril 1994).
- *Serapias lingua*
 - Chez Bluteau (Cne de Berneuil), dans un grand pré entre les bois, en compagnie d'autres espèces d'orchidées, *Orchis morio* subsp. *morio*, *Orchis ustulata*, *Orchis laxiflora* subsp. *laxiflora*, puis, dans un autre pré attenant, derrière l'ancienne ferme rénovée, *Platanthera bifolia* (mai 1994).
- *Trachelium caeruleum* subsp. *caeruleum*
 - Pons, impasse des Remparts. Vieux murs de la cour d'une boulangerie, rue Emile Combes. Jardin du presbytère Saint-Martin (juillet 1994).
- *Veronica acinifolia*
 - Chez Bluteau (Cne de Berneuil), abondante dans les vignes (mai 1994).
 - Soubran, le Terrier Blanc, vignes (mai 1995).

Corrèze

Contribution de Michel BOUDRIE

- *Dryopteris affinis* subsp. *cambrensis*

Des spécimens typiques de cette sous-espèce, jusque là jamais signalée en Corrèze, ont pu être enfin découverts en au moins deux stations de la vallée de la Dordogne :

- Talus herbeux, vallée de la Dordogne, rive droite, versant exposé au sud, à 400 m à l'ouest du pont de Chambon, à 4,5 km au sud-est de Lapeau ; un pied isolé (août 1995!, DL 30 ; échantillon herbier n° MB 2517).

- Base de rochers et fossés, vallée de la Dordogne rive gauche, versant exposé au nord, bord de la D 13, à 1,5 km à l'est de Bassignac-le-Haut ; plusieurs pieds (août 1995!, DL 20; échantillon herbier n° MB 2516).

- *Polystichum x bicknellii*

- Pentes boisées en rive droite du Doustre, juste en amont de La Roche-Canillac; plusieurs pieds avec *P. setiferum* (août 1995!, DL 10). Nouveau pour le département.

Contribution d'Olivier DOM

- *Crocus nudiflorus*

- Prairie en pente, dans le virage à la sortie du village de Madegal, commune de Lestards. Deuxième station du Limousin connue à cette date. Espèce protégée dans la région (20 octobre 1995).

- *Polystichum lonchitis*

- Sur un vieux muret en lisière d'une pessière, 800 m au nord-ouest de Madegal (31T, DL04), commune de Lestards. Un seul pied. Alt. : 640 m. Confirmé par Michel BOUDRIE. Unique station connue en Limousin à cette date. Espèce protégée dans la région (8 octobre 1995).

- *Spiranthes spiralis*

- Abondante sur la pelouse du Puy Guimont, 300 m au nord-ouest de La Nouzillade, commune d'Ayen. Sur indication de J.-C. CHATAUR (31 octobre 1995).

Haute Corse

Contribution de : A. TERRISSE

La fréquence des espèces citées est appréciée selon le *Catalogue des plantes vasculaires de la Corse*, de J. GAMISANS & D. JEANMONOD (1993) et aussi, pour deux d'entre elles, selon le *Livre rouge de la flore menacée de France* (1995).

- *Cardamine chelidonia*

- A proximité d'un ruisseau au nord d'Urtaca (1er juin 1995). La 1^{ère} édition

de *FLORA EUROPAEA* considérait cette espèce comme éteinte en Corse, ce que rectifie la 2^e édition ; mais elle y est rare. Elle figure dans le *Livre rouge*, qui en donne neuf stations, localisées dans le nord de la Corse, et J. GAMISANS, dans *La végétation de la Corse* (1991, p. 205), en fait une espèce des buxaises du Cap Corse, « essentiellement localisées aux ubacs, près des crêtes (entre 900 et 1200 m ». Il se pourrait donc que la station d'Urtaca soit la plus méridionale de la Corse et celle située à l'altitude la plus basse (environ 400 m).

- *Carex sylvatica* subsp. *sylvatica*

- Bord d'une piste au nord d'Urtaca (1^{er} juin 1995). Selon le *Catalogue*, 12 localités connues.

- *Dracunculus muscivorus*

- Entre la forêt de Melaja et celle de Tartagine (21 mai 1995). Cette spectaculaire aracée, endémique de Corse, Sardaigne et Baléares, figure dans le *Livre rouge*, qui l'indique en forêt de Tartagine. Selon le *Catalogue*, 13 localités connues.

- *Orobanche hederæ*

- Dans un jardin de rocaille, à Urtaca (19 mai 1995) : quelques tiges semblent sortir d'une touffe de *Gazania* sp., mais à proximité (0,50 m) d'un pied de lierre.

- *Orobanche ramosa* subsp. *nana*

- Au nord d'Urtaca (1^{er} juin 1995, 4 tiges seulement ; détermination confirmée par G. BOSCH). Cette orobanche à petites fleurs d'un bleu violacé, indiquée en Corse par FOURNIER (sous le nom de *Phelypaea nana* Noë), ne semblait pas y avoir été vue récemment (GAMISANS & JEANMONOD, 1993, p.198). Dans le n°453 du *Monde des Plantes*, Ch. BERNARD et G. FABRE ont signalé sa découverte récente dans le département de l'Hérault.

Creuse

Contribution de : Michel BOUDRIE

(Rubrique botanico-nécrologique)

- *Asplenium x alternifolium* nothosubsp. *heufleri* (*A. septentrionale* x *A. trichomanes* subsp. *quadri-valens*) :

L'unique pied de cet hybride rarissime que j'avais trouvé en juin 1992 dans les environs d'Aubusson (Cf. M. BOUDRIE, *Bull. S.B.C.O.* 1993, **24** : 337) a malheureusement récemment disparu (fin de l'année 1995), innocente victime du zèle des vaillants maçons creusois. Le mur a été recrépi, et la fougère avec ! Tristesse... Par bonheur, j'avais eu la bonne idée d'en récolter trois frondes comme témoin qui se trouvent dans mon herbier sous le n° MB 2134. J'ai également une série de diapositives.

Contribution d'Olivier DOM

- *Oreopteris limbosperma*

- Tourbière de Friaulouse, commune de Saint-Goussaud, en lisière d'une pessière (18 juillet 1995).

- *Phegopteris connectilis*
- Tourbière de Friaulouse, en lisière d'une pessière, en compagnie d'*Oreopteris limbosperma* (18 juillet 1995).

Dordogne

Contribution de Pamela LABATUT

- *Cardamine impatiens*
- Bayac (13 mai 1995).
- *Chamaecytisus supinus*
- Abondant au bord de la D8, entre Lalinde et Sainte-Foy-de-Longas, au lieu-dit la Colombe, avec *Psoralea bituminosa*, *Lathyrus aphaca*, *Convolvulus cantabrica*, *Papaver rhoeas*, *Helichrysum stoechas* subsp. *stoechas* et *Thymus serpyllum* subsp. *serpyllum* (11 juin 1995).
- *Coronilla scorpioides*
- Sur un ancien chemin du village de Bayac (13 mai 1995).
- *Geranium sanguineum*
- Tout le long d'un chemin vers Bidot (Cne de Beaumont-du-Périgord) (31 mai 1995).
- *Neottia nidus-avis*
- Dans un bois sombre à La Faye (Manzac-sur-Vern) (30 mai 1995).
- *Senecio erucifolius*
- Abondant sur les talus, à Faux (7 septembre 1995).
- *Tolpis barbata*
- Sur un talus sec, au lieu-dit Peyroudal (Sainte-Foy-les-Vignes) (20 septembre 1995).

Essonne

Contribution de : Kveta MALHER

- *Anacamptis pyramidalis*
- Corbeil-Essonne, deux pieds dans le terrain vague au nord des Tarterêts. Première observation du 8 juin 1989, renouvelée le 9 juin 1995.
- *Bunium bulbocastanum*
- Gironville, cinq pieds près de Gandevilliers, le 23 juin 1994.
- *Campanula glomerata* subsp. *glomerata*
- Champmotteux, bord du chemin de la vallée sèche, le 2 août 1994.
- *Carduncellus mitissimus*
- Valpuiseaux, trois pieds dans la pelouse calcaire à la Bosse-aux-Prêtres, le 12 juin 1995.
- *Carthamus lanatus* subsp. *lanatus*
- Valpuiseaux, un seul pied au bord d'un champ calcaire dans la Vallée Josaphat, le 2 août 1994.

- *Caucalis platycarpos*
 - Valpuseaux, trois pieds au bord d'un champ calcaire dans la Vallée Josaphat, le 12 juin 1995.
- *Centaurea calcitrapa*
 - Gironville, près de Gandevilliers, le 2 août 1994.
 - Champmotteux, au lieu-dit le Chêne, le 2 août 1994.
- *Digitalis lutea* subsp. *lutea*
 - Champcueil, petite station dans la forêt des Grands Avaux, le 22 juin 1994.
- *Draba muralis*
 - Saint-Martin d'Étampes, assez abondante sur le talus près de la voie ferrée. C'est la seule station dans l'Essonne à ma connaissance. Le 1^{er} mai 1995.
- *Geranium purpureum*
 - Chamarande, au bord de la voie ferrée. Première observation du 6 avril 1991, renouvelée le 7 juin 1995.
- *Hypericum montanum*
 - Champcueil, trois pieds dans la forêt des Grands Avaux, le 13 juin 1994.
- *Hypochoeris maculata*
 - Soisy-sur-École, sur la pente sablonneuse du Tertre Blanc, le 15 juin 1995.
- *Inula hirta*
 - Maisse, coteau calcaire du Bois de Malabry, le 2 juin 1993.
- *Isopyrum thalictroides*
 - Chamarande, une vingtaine de pieds dans le Ravin de Longue Noue, le 30 mars 1995. C'est la seule station dans l'Essonne à ma connaissance.
- *Laserpitium latifolium* var. *asperum*
 - Dannemois, sur l'Aqueduc de la Vanne et du Loing (les Quatre Chemins). Première observation du 16 août 1992 (une dizaine de pieds), renouvelée le 5 août 1995 (deux pieds! dont un seul fleuri). Cette diminution semble être due au fauchage fréquent du lieu. C'est la seule station dans l'Essonne à ma connaissance.
- *Lychnis viscaria* subsp. *viscaria*
 - Boutigny, chemin de l'ancienne carrière au-dessus de la Vallée Saint-Jacques. Première observation du 21 août 1994, renouvelée le 15 juin 1995.
- *Mínuartia setacea* subsp. *setacea*
 - Valpuseaux, petite station dans l'ancienne sablière, le 18 juin 1994.
- *Moenchia erecta* subsp. *erecta*
 - Champcueil, pelouse sur platière siliceuse dans la forêt des Grands Avaux, le 29 mars 1995.
- *Montia fontana* subsp. *fontana*
 - Champcueil, assez abondante au bord de la mare sur platière siliceuse dans la forêt des Grands Avaux, le 29 mars 1995.
- *Ononis pusilla*
 - Champmotteux, pelouse au lieu-dit la Hâte Thibaut, le 26 juin 1994.
- *Orchis mascula* subsp. *mascula*
 - Saint-Sulpice de Favières, une petite station près de Charville, le 9 avril 1995.
- *Pyrola minor*
 - Saint-Martin d'Étampes, petite population sous le Mont Poussin, le 1^{er} mai 1995. C'est la seule station dans l'Essonne à ma connaissance.

- *Reseda phyteuma*
- Valpuiseaux, bord d'un champ calcaire dans la Vallée Josaphat, le 2 août 1994.
- *Sedum hirsutum* subsp. *hirsutum*
- Dannemois, une petite station sur des rochers siliceux près de la Louvetière, le 20 juin 1995.
- *Sedum sexangulare*
- Champcueil, ancienne carrière de grès dans la forêt des Grands Avaux, le 28 juin 1994.
- *Sparganium emersum*
- Forêt domaniale de Sénart, petite mare à l'est de la Lande des Uzelles, le 14 août 1993.
- *Thalictrum minus* subsp. *minus*
- Gironville, deux pieds près de Gandevilliers, le 11 juin 1995.
- *Thymelaea passerina*
- Valpuiseaux, bord du champ calcaire dans la Vallée Josaphat, le 2 août 1994.
- *Torilis nodosa*
- Champmotteux, une petite station à la Haie Thibaut, le 26 juin 1993.
- *Vaccinium myrtillus*
- Janville-sur-Juine, une petite population sur des rochers sous le coteau de l'Ermitage, le 28 juin 1992. C'est la seule station dans l'Essonne à ma connaissance.

Gard

Contribution de Michel BOUDRIE

- *Isoetes duriel*
- Petit talus humide à la base de rochers siliceux, alt. 380 m, bord de la D 907, vallée du Gardon de Saint-Jean, à 500 m au nord-est du Mas-Auric, 4 km au sud-est de Saint-André-de-Valborgne ; 5 ou 6 pieds (13 mai 1995!, EJ 58). N'avait pas été revu dans ce département depuis les récoltes de l'herbier COSTE (1911-1917).

Indre-et-Loire

Contribution de Christian MOULINE

- *Senecio inaequidens* :
- A Tours : un individu en bordure de la voie ferrée Tours-Bordeaux (28 décembre 1995). Cette espèce a également été observée dans ce département à L'Île Bouchard en novembre 1995 par F. BOTTÉ et D. TESSIER (comm. pers. de F. BOTTÉ et D. TESSIER).

Lot

Contribution de Jean-Pierre JACOB

- *Aster amellus*
 - Cras, sur le bord gauche de la petite route qui monte du Moulin de Cras dans la vallée du Vers en direction du village, un petit nombre de plantes espacées (25 août 1995, CK 83).
- *Bidens aurea*
 - Cahors, grande friche de la rive droite du Lot située immédiatement au sud des remparts de la Plaine du Pal, entre la voie ferrée et la rivière, petits groupes dispersés de plantes bien développées, avec *Solidago canadensis* (28 octobre 1995, CK 72).
 - Cahors, rive droite enherbée inondable du Lot en contrebas du quai Ségur d'Aguesseau, deux exemplaires rabougris mais bien fleuris avec *Bidens frondosa* commun et défleuri (30 octobre 1995, CK 72).

A noter que la présence dans le Lot de ce taxon a été signalée par E. MALINVAUD dans le *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 1898, **45** : 604 ; il avait été alors recueilli par l'abbé BACH dans la vallée du Lot à Soturac, à la limite avec le Lot-et-Garonne. A ce propos, l'abbé TERRÉ reprend l'information d'après une citation de COSTE situant "Saturac" dans l'Aveyron (n°1 749 du Catalogue des Plantes de l'Aveyron de J. TERRÉ, 1979).
- *Blechnum spicant*
 - Saint-Denis-Catus, La Brousse, quelques belles touffes en sous-bois humide : bord est de la D 12 au-dessus d'une petite tourbière à Sphaignes installée sur les sols siliceux formés sur les épandages fluviaux de l'âge oligocène recouvrant les calcaires jurassiques de cette région (8 mai 1995, CK 73).
- *Carex pseudocyperus*
 - Caix, rive droite du Lot à la sortie ouest de l'agglomération, une grosse touffe (6 août 1994, CK 62).
- *Centaurea triumfetti* subsp. *lugdunensis*
 - Lugagnac, à la lisière d'un petit bosquet limitant une moisson calcaire, sur le bord sud de la D 911 entre Limogne et Concots (3 juin 1995, CK 91).
 - Cabrerets, touffes sur 50 m environ, en lisière de la chenaie, au bord nord de la D13, à 5 km de l'agglomération, avec *Lathyrus niger* subsp. *niger* (3 juin 1995, CK 83).
- *Chamaespartium sagittale*
 - Quelques touffes fleuries à l'entrée d'une carrière exploitant les dépôts d'altérites recouvrant les calcaires tendres jurassiques ; au sommet de la montée de la D 13, peu avant le croisement avec la D 10 ; avec *Genista tinctoria* sur matériaux argilo-sableux. D'autres stations existent sur cette même D 13, sur les mêmes sols, dans le même secteur au-delà du carrefour, mais la plante reste rare et passe inaperçue en dehors de la période de floraison (30 mai 1995, CK 83).
- *Dipsacus pilosus*
 - Catus, population très importante de plusieurs centaines de plantes dans

la vallée du Vert entre Catus et Saint-Médard, colonisant une parcelle voisine d'une peupleraie à 200 m à l'ouest de la Fontaine de Graudène, en bordure de la D13. Observée avec Baptiste CAROFF. Cette espèce n'avait pas été récoltée par T. PUEL (mention "à rechercher" en 1845), ni par GIRAUDIAS (1876), ni par les botanistes contemporains. Elle a été rarement citée dans le département (BOURNÉRIAS, 1947) et les citations sont souvent anciennes (Voir Atlas partiel de P. DUPONT, pl. 227) (1^{er} août 1994, CK 63).

• *Genista anglica*

- Lavercantière, étang du Frau, rare autour de l'étang et au départ du chemin qui monte vers le plateau reboisé (4 mai 1995, CK 64).

• *Genista hispanica* subsp. *hispanica*

- Cabrerets, vallée de la Sagne au bord de la D 13, au pied d'une petite falaise de calcaire compact jurassique avec *Ranunculus gramineus*. Ce taxon se rencontre habituellement dans les friches marneuses du Quercy blanc (Voir R. VIROT et H. BESANÇON : *Cahiers des Natur.*, N. S., **33**, fasc. 4 : 86 (1978). C'est la 1^{ère} station au nord de la vallée du Lot (31 mai 1995, CK 83).

• *Lilium martagon*

- Environs de Rocamadour, route entre Couzou et Calès. Petite station d'une dizaine de plantes non fleuries dans une charmaie assez humide. Observation d'A. LE PASLIER. Avec *Convallaria majalis*, *Anemone nemorosa*, *Arum maculatum*, ... (29 avril 1995, CK 85).

• *Lobelia urens*

- Lavercantière : assez commun sur le chemin d'accès à l'étang du Frau (22 août 1995, CK 64).

• *Melampyrum cristatum*

- Calvignac, population importante de plusieurs centaines de plantes au bord de la D 143, entre Rojouls et Calvignac (2 Juin 1995, DK 02).

• *Paris quadrifolia*

- Saint-Denis Catus, La Brousse. Une dizaine de plantes au niveau de la population d'*Osmunda regalis* décrite l'année précédente. Bord est de la D 12. La station doit être nouvelle pour le département au vu de la pl. 279 de l'Atlas partiel de P. DUPONT (6 Mai 1995, CK 73).

• *Pedicularis sylvatica* subsp. *sylvatica*

- Lavercantière. Étang du Frau. Quelques plantes fleuries, petites, entre les touffes de *Molinia* sur le bord nord-est de l'étang, avec, non loin de là, *Eriophorum angustifolium*. 3 Mai 1995. CK 64.

• *Scilla bifolia*

- Vallée de la Sagne, non loin d'un lavoir à la limite des communes de Cabrerets et de Sabadel Lauzès. Station peu importante, repérée une première fois en 1987 (3 avril 1995, CK 93).

• *Tulipa sylvestris* subsp. *australis*

- Petite population au sommet d'une falaise calcaire de 2,5 m sur le bord de la D 13 dans la vallée de la Sagne à deux km de Sabadel Lauzès. Une vingtaine de fleurs (7 Mai 1995, CK 93).

• *Veronica anagalloides*

- Caix. Bords du Lot à la sortie ouest du village. Quelques plantes disséminées (29 Mai 1995, CK 62).

Maine-et-Loire

Contribution de Serge BRAUD

- *Sagittaria latifolia*

- Une population, couvrant environ 5 m², découverte en juillet 1993 dans une saulaie marécageuse sur la commune du Filet (XT 83 ; détermination confirmée par P. DUPONT en juillet 1995).

Nouveau pour la flore de l'Anjou (Selon le Conservatoire Botanique National de Brest, cette espèce ne paraît pas avoir été mentionnée, jusqu'à présent, en Massif armoricain).

Pyrénées-Orientales

(ouest et zones voisines de l'Ariège et de l'Aude)

Contribution de : G. BOSCH, Ch. CHAFFIN,
A. TERRISSE (qui a rédigé ces notes),
J. TERRISSE, E. VIAUD.

- *Achillea millefolium* subsp. *sudetica*

- Au nord de Font-Romeu, près du sentier qui mène du refuge des Farnells au col del Pam, en deux points (66, DH 2109, 1920 et 1960 m, A.T., 4 août 1995).

- Au sud-sud-est d'Err, près de la route forestière, en plusieurs points (66, DG 2296 et 2297, 1450 à 1590 m, A.T., E.V., 5 août 1995).

- Au sud-sud-ouest de Targasonne (66, DH 1605, 1560 m, A.T., E.V., 7 août 1995).

Il arrive que les deux sous-espèces poussent à proximité l'une de l'autre ; on remarque alors l'aspect nettement plus touffu des feuilles de la subsp. *sudetica*.

- *Androsace vandellii* (= *A. imbricata*)

- Vallée d'Eyne : deux touffes dans un rocher situé sur la rive droite (66, DH 2601, 1900 m, J.T. sur une indication fournie par A. et S. MICHELIN, 9 août 1995).

A cette époque l'androsace est déflourie, mais identifiable grâce à son tomentum épais fait de poils étoilés.

Déjà vue dans cette même vallée un peu plus haut (1950 m, J. T., 6 mars 1987), elle semble plus commune aux confins de l'Ariège : sentier vers le Lanoux et au bord même du Lanoux ; à l'est de Porte, près du sentier vers l'étang de Font Vive ; sommet du Camporeys ; au sud de l'étang de Font Nègre (CH 9609, 2310 m) ; dans le département de l'Ariège (09), près du ruisseau de Siscar, en plusieurs points entre 1870 et 2000 m.

- *Berteroa incana*

- Au nord de l'enclave espagnole de Llivia. La station déjà signalée sur un coteau schisteux aride (*Bull. S.B.C.O.* n° 19, p. 147) s'est étendue à des terrains plus frais, bords des chemins et des champs, talus, où les tiges sont en fleurs, alors qu'elles sont en fruits sur la pente sèche (Espagne, Llivia, DH 1604 et 1605, 1500 à 1560 m, A.T., E.V., 7 août 1995).



1 Photographies 1, 2, 3 :
Campanula "hispanica".
Err, route forestière. 5 août
1995.
1 : fleur ;
2 : tige hirsute ;
3 : base de la plante.
(Photographies E. VIAUD)



3



2

- *Campanula* cf. *hispanica*

- Odeillo, au sud-ouest du Four solaire (66, DH 2005, 1560 m, A.T., E.V., 1 août 1995).

- Egat, les Bergeries (66, DH 1906, 1710 m, A.T., 3 août 1995).

- Au sud-sud-est d'Err, route forestière (66, DG 2297, A.T., E.V., 5 août 1995).

- Dans l'enclave espagnole de Llivia, au sud-ouest de Targasonne (Espagne, Llivia, DH 1604, 1490 m, A.T., E.V., 7 août 1995).

- Au sud-ouest de Dorres (66, DH 1103, 1580 m, A.T., 8 août 1995).

- Près de Llo, au nord-ouest du Mas Patiras (66, DH 2230, A.T., 9 août 1995).

- Au bord de la route Mijanès - port de Pailhères (09, A.T., 15 août 1995).

J'ai essayé, cette année, d'y voir un peu plus clair dans ce groupe d'espèces proches de *C. rotundifolia* et qui, selon les différentes flores, comprend *C. macrorhiza*, *C. hispanica* subsp. *hispanica* et subsp. *catalanica*, *C. catalanica* subsp. *catalanica* et subsp. *aitanica*. J'y ai renoncé, tellement les traitements, selon les flores, sont divers et parfois même contradictoires. Les récoltes ci-dessus correspondent à *C. hispanica* au sens de P. FOURNIER, essentiellement : plante hérissée de poils raides et dents du calice appliquées à la corolle. Encore faudrait-il préciser que les dents du calice sont rapprochées de la corolle et non appliquées, que la plante n'est hirsute que dans la partie inférieure. Mais il s'agit d'un caractère spectaculaire, visible à l'oeil nu, comme on peut s'en rendre compte grâce aux photos d'E. VIAUD (page précédente). Les poils raides, larges à la base, étalés, parfois même réfléchis, ressembleraient à ceux qui ornent le calice de *C. persicifolia* subsp. *subpyrenaica*. J'ajouterais qu'on trouve souvent, en mélange avec les plantes hirsutes, des exemplaires presque totalement glabres !

- *Carex otrubae* (= *C. subvulpina* = *C. cuprina*)

- Au nord d'Osséja, bord du Rec de Puig Menti (actuellement à sec) (66, DG 1698, 1220 m, G.B., A.T., E.V., 22 juillet 1995). C'est la première fois que je rencontre ce carex en Cerdagne.

- *Festuca borderi*

- Massif du Péric (66, J.T., 17 août 1995).

- *Juncus compressus*

- Sur la piste qui mène à la Torre de Creu, à l'est de Formiguères (66, DH 2820, 1420 m, A.T., J.T., 12 août 1995).

- *Juniperus communis* s. l.

- Enclave espagnole de Llivia (Espagne, Llivia, DH 1604, 1470 m, A.T., E.V., 7 août 1995).

- Entre Odeillo et Bolquère, au bord du chemin de terre situé au nord de la D 10 (66, DH 2306, 1640 m, A.T., E.V., 14 août 1995).

Dans ces deux stations (et en bien d'autres) on trouve des arbustes dressés et d'autres complètement prostrés, avec quelques intermédiaires. Dans tous les cas, les aiguilles sont semblables : la largeur de la bande blanche égale à peu près celle de chacune des deux bandes latérales. Les individus prostrés sont à rattacher à la var. *intermedia* (Schur) Sanio, et non à la subsp. *hemisphaerica*. Cf. le commentaire de J. VIGO dans son ouvrage *El poblament vegetal de la Vall de Ribes* (1983, p. 129) : selon lui il s'agit d'une variété intermédiaire entre le type

et la subsp. *nana*, et on la rencontre surtout entre 1600 et 2000 m d'altitude.

• *Lysimachia ephemerum*

- Dans l'Aude, dans les gorges du Torgan, en plusieurs points, au bord de la D 123, entre Maisons et Padern (11, A.T., 17 juillet 1995).

Cette espèce spectaculaire, qui fait l'objet d'une protection au niveau national, avait été signalée à Dernacueillette, quelques kilomètres à l'ouest de Maisons, dans le "Catalogue de la Flore des Corbières, de G. GAUTIER, "mis en ordre" par L. MARTY" (1912, p. 203).

• *Neslia paniculata* subsp. *thracica*

C'est à cette sous-espèce (et non à la subsp. *paniculata*) qu'il faut rapporter les plantes signalées à Osséja et Sainte-Léocadie (Bull. S.B.C.O. n° 21, p. 199). Cf. description et illustration des deux sous-espèces dans l'ouvrage de Ph. JAUZEIN *Flore des champs cultivés*, p. 296 et 297).

• *Phalaris arundinacea* subsp. *arundinacea* cv. *Picta*

Je n'ai jamais rencontré en Cerdagne l'espèce type, mais, par deux fois à distance de toute habitation, ce cultivar aux feuilles bicolores :

- Sur la rive droite de l'Aude, au sud de Vilanova (66, DH 2818, 1445 m, A.T., E.V., 15 août 1994).

- Dans le lit de l'étang asséché de Puyvalador, au bord du cours de l'Aude qui le traverse (66, DH 2820, 1 420 m, A.T., E.V., 11 août 1995).

Ce même taxon a aussi été noté de l'autre côté de la frontière, échappé de cultures, par J. VIGO (*El Poblament vegetal de la Vall de Ribes*, p. 727).

• *Phyteuma rupicola*

- Dans le même massif Carlitte-Péric et dans le même genre de milieu (fentes de rochers) que la station déjà signalée (cf. Bull. S.B.C.O. n°17, p.140), et à un kilomètre environ de celle-ci (66, J.T., 17 août 1995).

• *Poa laxa*

- Massif du Péric (66, J.T., 17 août 1995).

• *Ranunculus hederaceus*

- En plusieurs points de la cuvette provisoirement asséchée de l'étang de Puyvalador, sur sa rive sud-ouest, dans des zones où le sable est resté très humide ; elle constitue des plaques denses mais peu étendues (66, DH 2820 et 2821, 1 420 m, A.T., E.V., 10 août 1995).

• *Seseli peucedanoides* (= *Silaua virescens*)

- En plusieurs points, mais jamais abondant, au bord du sentier de randonnée qui contourne par le sud le four solaire d'Odeillo (66, DH 2005, 1 570 m, A.T., E.V., 1^{er} août 1995).

• *Spergularia segetalis*

- Dans une moisson au bord du chemin de terre situé au nord de la D 10, entre Odeillo et Bolquère (66, DH 2306, 1 630 m, A.T., E.V., 14 août 1995).

• *Xeranthemum inapertum*

- Un beau peuplement sur un talus du village de Llo (66, DH 2200, 1 420 m, Ch. Ch., A.T., J.T., 10 août 1995). Cette espèce, commune dans le Roussillon, atteint rarement cette altitude. Autres stations en Cerdagne : à l'ouest de Dorres, piste vers N. D. de Belloch ; entre Osséja et la N 116 ; à l'est-nord-est de Llar, DH 3709, 1 360 m.

Deux-Sèvres

Contribution de : Gaston BONNIN

1 - Espèces découvertes à l'occasion de l'étude de la flore et de la végétation du terrain militaire d'Avon

réalisée par Deux-Sèvres Nature Environnement (Cercle des Naturalistes), à la demande du Conservatoire des Espaces Naturels de Poitou-Charentes :

- *Astragalus monspessulanus*

- 4 stations, sur des chaumes à pelouses xérophiles établies sur des sols minces de calcaire marneux ou de marne argileuse (Oxfordien ou Rauracien). 30 mai 1995. (Plante signalée en 1850 par le botaniste niortais GUILLON).

- *Amaranthus lividus* (= *Euxolus viridus*)

- Indiquée comme commune au siècle dernier. Une seule station dans une petite mouillière au nord du camp près de Boesse. 7 juillet 1995.

- *Crepis capillaris* (= *C. virens*)

- Espèce polymorphe. Quelques exemplaires, d'un Crépis à tige feuillée unique, s'écartent nettement des variétés ou formes décrites dans les flores récentes.

- *Fritillaria meleagris*

- "Vallée des Ayrault", pâturages humides, sur sol alluvionnaire. Vue en fruits le 15 mai 1995.

- *Scorzonera laciniata* (= *Podospermum laciniatum*)

- Signalée en 1850 par SAUZÉ et MAILLARD, la plante a été retrouvée en 4 stations par G. ROBERT au sud-est du camp. Sortie du 31 octobre.

- *Scirpus maritimus*

- Présence surprenante du Scirpe maritime, qui a complètement envahi la mare de La Crouzillière au sud de l'ancienne école d'Avon. Quelques hampes de Massette à larges feuilles, espèce assez commune dans les mares d'Avon, ont peine à trouver place au soleil. Sortie du 30 juillet 1995. Si les botanistes du siècle dernier n'ont pas signalé cette station c'est qu'elle n'existait pas de leur temps.

- *Sisymbrella aspera*

- Cette espèce méditerranéo-atlantique a plusieurs fois changé de nom. C'est l'ancien "Sisymbre rude" de SOUCHÉ, espèce protégée en Poitou-Charentes. Bien qu'en légère régression (sécheresse et pâturage extensif trop précoce), il demeure encore AC en de nombreuses mouillères du terrain militaire. Sorties des 15 mai 1988 et 30 mai 1995.

- *Spiranthes autumnalis*

- Trouvé l'an dernier dans les Chaumes de Gandomé, Commune de Bougon, le Spiranthe ne pouvait manquer d'être dans le terrain d'Avon. Une sortie, le 14 septembre, contrariée par la pluie, nous permet de localiser cette orchidée tardive, en début de floraison en deux stations voisines, au centre du terrain militaire : pelouses xérophiles du lieu dit "Chiot" et les pâturages mésophiles en bordure du D 329.

- *Teucrium montanum*

- Une seule station : au nord-est de La Crouzillière, à la cote 136. G. ROBERT,

31 octobre 1995. Espèce signalée par SOUCHÉ à Pamproux et Bougon.

• *Trifolium squamosum* (= *T. maritimum*)

Deux stations :

- Prairie de Mélé, au NE d'Aintrié
- Lieu-dit Les Gervaisières. 30 mai 1995.

Le Trèfle maritime était signalé à Bougon et à La Mothe Saint-Héray (SAUZÉ et MAILLARD, 1853)

• *Xeranthemum cylindraceum*

- Cette "Immortelle", en voie de disparition, était signalée dans la Flore des Deux-Sèvres de SAUZÉ et MAILLARD "au coteau de Blet, en Pamproux et non en Bougon". Nous l'avons revue le 20 juillet 1994 au bord d'un chemin marneux montant aux chaumes de Gandomé, en Bougon. (Voir *Bull. S.B.C.O.* n° 26, p. 282.)

La nouvelle station découverte le 30 mai 1995 au sud-est d'Aintrié est très importante car elle occupe un ourlet de haie et la "chintre" d'un labour resté abandonné.

2 - Autres :

• *Isopyrum thalictroides*

- Etusson : vallée de l'Ouère, au lieu-dit "Les Coteaux", méandre boisé en aval d'Etusson ; 14 avril 1995 (Gaëtan ROBERT). Station non signalée dans le bassin de l'Argenton.

• *Potamogeton pectinatus*

- Moutiers-sur-Argenton : étang de La Grue (ZNIEFF N° 427). Espèce rare, nouvelle pour la flore argentonnaise. Station proche de celle où *Ranunculus lingua* et *Utricularia vulgaris* se sont maintenues.

• *Potentilla recta*

- Etusson : 3 pieds, au bord d'un chemin argilo-siliceux dominant la vallée de l'Ouère. C'est peut-être la même station qu'Émile CONTRÉ avait découverte en 1963 et mentionnée dans la Flore du Massif Armoricain ; 27 juin 1995.

• *Ranunculus nodiflorus*

- Disparue du lieu dit "Les Oeufs-durs". Lors de la sortie du Cercle des Naturalistes des Deux-Sèvres, le 16 juillet 1995, nous avons constaté la disparition des espèces rares qui avaient justifié l'homologation en ZNIEFF (N° 429) de ces pâturages argileux parsemés de petites mares. Elles ont été victimes de la sécheresse et surtout du piétinement excessif des troupeaux de bovins autour des mares-abreuvoirs par suite de la pratique du pâturage extensif donnant accès à tous les points d'eau.

• *Sedum forsterianum*

- Argenton-Château, vallée de l'Argenton, site de "Reino". Quelques beaux exemplaires fleuris, sur et au pied d'un muret, le long d'un sentier dominant les gorges boisées et le vieux moulin ; 27 juin 1995.

• *Sedum andegavense*

- Disparue du lieu dit "Les Oeufs-durs". Cf. ci-dessus remarque concernant *Ranunculus nodiflorus*.

• *Trifolium ornithopodioides*

- Disparue du lieu dit "Les Oeufs-durs". Cf. ci-dessus remarque concernant

Ranunculus nodiflorus et *Sedum andegavense*.

Contribution de : Hubert FROUIN et Simone RABIER

- *Ranunculus omiophyllus* (= *R. lenormandi*)
- Forêt de Secondigny, dans un petit ruisseau, 7 juin 1995.

Vienne

Contribution de : Yves BARON (Y.B.), Jacques BOUFFARD (J.B.),
Antoine CHASTENET (A.C.) et Patrick GATIGNOL (P.G.)

- *Aethusa cynapium* subsp. *cynapium*
- Queaux, coteau des Cordeliers, avec *Euphorbia serrulata* (= *E. stricta*) ;
Persac, pont de Cliel (24 juin 1995, Y.B.).
- *Althaea cannabina*
- Plusieurs pieds le long de la D25 entre Chaulnay et Brux aux environs de
"la Touche" ; 5 juillet 1995 (P.G.).
- *Anacamptis pyramidalis*
- Vouneuil-sous-Biard, coteau de la Queue du Renard, avec *Veronica*
prostrata s.l. (3 mai 1995, Y.B.).
- *Artemisia verticillorum*
- Quelques pieds de cette espèce peu connue le long de la D25 entre Chaulnay
et Brux aux environs de "la Touche" ; 5 juillet 1995 (P.G.).
- *Astragalus glycyphyllos*
- Cheneché, les Châteliers, avec *Orchis purpurea*, *Daphne laureola* subsp.
laureola, *Tilia cordata* (8 avril 1995, Y.B.).
- *Campanula erinus*
- Les Lourdines à Migné-Auxances avec : *Orchis purpurea* et *Thalictrum minus*
subsp. *minus* (30 avril 1995, A.C.).
- *Carex disticha*
- Vauvinard sur la commune de Béruges avec *Myosotis laxa* subsp. *caespitosa*
et *Galium elongatum* (25 mai 1995, A.C.).
- *Carex laevigata* (= *C. helodes*)
- Montreuil-Bonnin, étang du Moulin du Roi, 1 hampe, à revoir (2 mai 1995, Y.B.).
- *Caucalis platycarpus*
- Montamisé, à Fontaine, première mention dans la Vienne depuis 1989, où
il semble au bord de l'extinction (14 juin 1995, Y.B.).
- *Daphne laureola* subsp. *laureola*
- Chéneché, les Châteliers (8 avril 1995) ; Ligugé, à Grande-Chaintre (10 avril
1995) ; Iteuil, les Genèbres, avec *Tilia cordata* (1^{er} mai 1995, Y.B.).
- *Dipsacus pilosus*
- Aslonnes, le Pont, assez abondant, près du bassin tuffeux à *Hookeria*
lucens, 3^e mention dans la Vienne, probablement la station de "Port de la Vayré"
signalée par SOUCHÉ (31 mars 1995, confirmé le 1 août 1995, Y.B.).
- *Erica vagans*

- Chauvigny, coteau de Peuron (26 mai 1995, Y.B.).
- *Euphorbia esula* subsp. *tommasiniana*
 - Près de la décharge d'Ayron (1^{er} mai 1995, A.C.).
- *Galium boreale*
 - Quelques pieds de cette espèce présumée disparue dans la Vienne, dans le lit asséché de la Bouleure avec *Teucrium scordium* s.l., *Veronica catenata*, *Samolus valerandi*, *Thalictrum flavum* subsp. *flavum* et *Althaea officinalis* : Chaunay, "les Bertons" ; 5 juillet 1995 (P.G.).
 - Assez abondant dans le même milieu à Brux, "le Bout du Pont" ; 5 juillet 1995 (P.G.).
- *Genista anglica*
 - Laie de la forêt de Vouillé avec *Parentucellia viscosa* (22 avril 1995, A.C.).
- *Gladiolus italicus*
 - Le Gros Chillou sur la commune de Mairé avec *Orchis militaris* (27 mai 1995, J.B.).
- *Hordeum secalinum*
 - Latillé près de Brin avec *Stachys germanica* et *Stachys alpina* (18 mai 1995, A.C.).
- *Ludwigia palustris*
 - Avaïlles-Limouzine, étang de Chez Rateau, avec *Equisetum fluviatile* (= *E. limosum*) et *Bidens frondosa* (8 août 1995, Y.B.).
- *Lythrum portula*
 - Mairé, forêt de la Groie, bord d'étang aux 5 routes (11 juillet 1995, Y.B.).
- *Oenanthe lachenalii*
 - Plusieurs pieds de cette espèce très rare dans la Vienne, dans le fond d'un étang à sec : Montreuil-Bonnin ; 10 septembre 1995 (P.G.).
- *Oxalis acetosella*
 - Iteuil, vallon des Genèbres, sur un tronc mort enjambant le ruisseau (unique station de la Vienne hors confins du Limousin, proche, mais différente de celle du 20 avril 1981, disparue, 1^{er} mai 1995, Y.B.).
- *Pedicularis sylvatica* subsp. *sylvatica*
 - Ligugé, rond-point au sud de la forêt, abondant (1^{er} mai 1995, Y.B.).
- *Peucedanum cervaria*
 - Chauvigny, vallon au nord-ouest des Groges, avec *Carex hallerana*, *Inula montana*, *Ophrys insectifera*, *Cephalanthera* sp. (26 mai 1995, Y.B.).
- *Ranunculus aquatilis*
 - Lacs Jumeaux de la forêt de Vouillé avec *Ranunculus tripartitus* qui apparaît dans deux autres mares et *Potamogeton natans* dans une troisième (22 avril 1995, A.C.).
- *Ranunculus ololeucos*
 - Dans deux nouvelles mares de la réserve naturelle du Pinail. On peut signaler également de belles populations de *Moenchia erecta* subsp. *erecta* et *Logfia minima* sur les pare-feux (3 juin 1995, A.C.).
- *Samolus valerandi*
 - Aslonnes, le Port (31 mars 1995, Y.B.).
- *Sanguisorba officinalis*
 - Quelques pieds de cette espèce très rare dans la Vienne (une seule mention dans la flore de SOUCHÉ) dans un fossé le long de la D 15 face à la Lombarderie :

La Roche-Posay ; 15 juin 1995 (P.G.).

- *Scilla verna*
 - Iteuil, la Chétive Coupe, en limite nord-est (1^{er} mai 1995, Y.B.).
- *Sedum album* subsp. *micranthum* (Bast.) Syme
 - Petite station de cette sous-espèce peu citée, sur des rochers calcaires : Chateau-Larcher, "Thorus" ; 10 juin 1995 (P.G.).
- *Silene gallica*
 - Saint-Georges-les-Baillargeaux, les Misterlingues, signalé par L. BUSNEL (14 juin 1995, Y.B.).
- *Sison amomum*
 - Quelques pieds de cette espèce peu signalée dans un chemin ombragé et frais : Chaulnay, "les Bertons" ; 5 juillet 1995 (P.G.).
- *Stachys palustris*
 - Deux pieds isolés le long de l'Auxances : Migné-Auxances ; 10 septembre 1995 (P.G.).
- *Stachys alpina*
 - Queaux, coteau des Cordeliers ; l'Isle-Jourdain, à Chardes ; Persac, coteau de Rosières (24 juin 1995, Y.B.).
- *Thelypteris palustris*
 - Ligugé, îles de Pont, station déjà connue, mais non retrouvée depuis une dizaine d'années (1^{er} mai 1995, Y.B.).
- *Veronica actnifolia*
 - Iteuil, la Chétive Coupe, jachère (1^{er} mai 1995, Y.B.).
- *Veronica montana*
 - Queaux, coteau des Cordeliers, près d'un filet d'eau à *Veronica beccabunga* (24 juin 1995, Y.B.).

Haute-Vienne

Contribution d'Olivier DOM

- *Asplenium scolopendrium* subsp. *scolopendrium*
 - Le Petit Landouge, commune de Limoges, au bord du ruisseau, à l'exutoire de l'étang. Station étendue avec des individus bien développés (27 juin 1995).
 - Sur le pont médiéval qui enjambe la Glane, 500 m au nord - nord-est de Nieul. Commune de Nieul. Quelques pieds de mauvaise venue (23 juillet 1995).
- *Ornithogalum pyrenaicum*
 - Dans une haie près de la voie ferrée, dans la vallée de la Glayeule, commune de Breuilaufa (25 juin 1995).
- *Spiranthes aestivalis*
 - Lande de Cinturat, commune de Cieux. Dans une dépression tourbeuse à *Rhynchospora fusca* et *R. alba* : 8 pieds comptés le 23 juillet 1995 (2 pieds le 9 juillet 1994, 6 pieds en juillet 1993).