

***Cladonia brevis* (Sandst.) Sandst.
Espèce nouvelle pour le Centre-Ouest
et une grande partie de la France**

par Robert BÉGAY*

Les voies de la découverte passent parfois par d'étranges cheminements et ce fut bien le cas pour ce lichen.

La Fédération Régionale Poitou Charentes Nature ayant eu l'idée de réaliser un inventaire systématique des mares de la région pendant trois ans, un travail considérable a été entrepris sur le terrain par chacune des associations départementales et ce travail a été confié à Charente Nature pour notre département.

Parmi les nouvelles mares recensées, l'une d'entre elles semblait particulièrement intéressante, non seulement par la présence du crapaud sonneur à ventre jaune (*Bombina variegata*), mais aussi par l'abondance de plantes peu



Cladonia brevis (Sandst.) Sandst. Pèrignac (Charente).
Photo J.-P. MONTAVONT

* R. B. : 13, chemin de la Garenne, Résidence des Essarts, 16000 ANGOULÈME.

courantes comme *Pinguicula lusitanica* ou *Drosera rotundifolia* et *D. intermedia* (de l'ordre du millier de pieds). Quand on sait que le droséra est une plante rare en Charente, seulement deux petites stations de *D. rotundifolia* et une de *D. intermedia*, on peut s'imaginer que notre intérêt fut éveillé par la découverte de cette zone exceptionnelle et que nous ne tardâmes pas à la visiter en compagnie d'un animateur de Charente Nature.

Il s'agit d'une ancienne carrière d'argile bordée d'un plan d'eau sur la commune de Pérignac, à une altitude d'environ 144 m, que son accès difficile ne nous avait pas permis de repérer auparavant. Après un rapide examen, nous eûmes la chance d'y trouver plusieurs lichens dont nous ignorions l'existence en Charente : *Porpidia cinereoatra*, *Parmelia revoluta* et surtout *Cladonia brevis*, dont l'aspect de *C. symphicarpa* malingre ne nous aurait pas frappé sans sa belle réaction jaune d'or au paraphénilène diamine et ses réactions négatives aux autres produits.

La localisation indiquée sur le *Likenoj - Germanio, Skandinavio, Finnio* - exigeait une confirmation de la détermination, ce qui fut fait par J.-C. BOISSIÈRE pendant la session de Fontainebleau, et une photo fut prise par J.-P. MONTAVONT. En fait, ce lichen avait déjà été trouvé en France après 1985, dans le Massif Central et dans les Vosges, comme il est indiqué dans la traduction, avec mise à jour, du genre *Cladonia* du *Likenoj*, publiée dans le *Bulletin de l'Ass. Fr. de Lichénologie*, n° 21-1, p. 34 (traduction de Paulette RAVEL). Il est cependant très rare et sa présence en Charente n'est sans doute pas inintéressante.

Bibliographie

- CLAUZADE, G. et ROUX, C., 1985 - *Likenoj de okcidenta Europo - Illustrata determinlibro*. *Bull. Soc. Bot. du Centre-Ouest*, N. S., n° spéc. 7. 893 p.