

Contributions à l'inventaire de la flore

Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, **les trouvailles intéressantes** qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, **avant le 31 mars**, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants :

- le nom de la plante ;
- le lieu exact **avec indication de la commune en premier lieu**, puis du lieu dit (en fournissant, si possible, les coordonnées U.T.M.) et la date de la découverte ;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station ;
- ces contributions seront **classées par département (en suivant l'ordre des numéros minéralogiques) et à l'intérieur de chaque département par ordre alphabétique.**

On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le bulletin précédent.

Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce - qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du "Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination confirmée par ...".

De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :

- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier ;
- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop communes ;
- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

16 - Département de la Charente

Contribution de Jean-Robert CHARRAUD

➤ *Cardamine bulbifera*

- Champagne-Mouton. La station des rives de l'Or (bois du Mas), suivie depuis 1990, se complète par un peuplement d'une vingtaine de pieds situé environ à 300 mètres, en bordure du chemin du Frény à la Garnerie (observation de 1999).
- Champagne-Mouton. 11 mai 2001. Sur le talus et dans le bois bordant la route qui part de la D. 740 au pied du viaduc - en aval du moulin de Basser - une cinquantaine de pieds avec *Anemone nemorosa*, *Lamiastrum galeobdolon*, *Melica uniflora*, *Milium effusum*, *Ornithogalum pyrenaicum* et *Stachys sylvatica* et, en plus, en bordure de la même route : *Cardamine impatiens*, *Saxifraga granulata* et *Pentaglottis sempervirens*.

Contribution de Bruno HÉRAULT

➤ *Serapias lingua*

- Juignac, coteau de Majestés. Exemplaires dispersés sur le coteau. 15 juin 2000.
- *Serapias vomeracea*
- Juignac, coteau de Majestés, 5 pieds fleuris. 15 juin 2000.

Contribution de Jean TERRISSE

➤ *Arenaria controversa*

- Clatx, chaumes de Clérignac, plus d'un millier de pieds. 18 mai 1999. En compagnie de : *Linum austriacum*, *Convolvulus cantabricus*, *Rhamnus saxatilis*, *Globularia valentina* etc. Vus par Yves BARON le 18 septembre 1998.
- *Stachys heraclea*
- Douzat, Bois de Pelon, quelques dizaines de pieds sur les bermes de la D. 14. Juillet 2000.

17 - Département de la Charente-Maritime

Contributions de Yves BARON (Y.B.)
et de Didier PERROCHE (D.P.),

➤ *Euchlaena mexicana* Schrad.

- Chives, lisière de champ. Cet ancêtre hypothétique du Maïs (ou Téosinte), ramené

d'un voyage d'études au Mexique par l'agriculteur, se perpétue sur place depuis 4 ans (récolte de Yves AUDOUIN, transmise par M. ROGEON), 15 août 2000, (Y.B.).

- *Ophrys passionis* Sennen ex J. et P. Devillers-Terschuren
- Château d'Oléron, au Fief Melin, 27 avril 2000, (D.P.).
- *Ranunculus ophioglossifolius*
- Ile d'Oléron, aux Courants, Moulin de Caillot où il tapisse le fond d'un fossé débouchant sur la route, 27 avril 2000, (D.P.).

Contribution de : Muriel DAUDON et Jean TERRISSE

- *Callitriche truncata*
 - Hiers-Brouage, "jas" en marais "doux", 6 stations (25 et 31 mai 1999, 21 juin 1999).
 - *Ceratophyllum submersum*
 - Saint-Just-Luzac, mare abreuvoir en marais salé (28 mai 1999) ;
 - Le Gua, mares abreuvoirs en marais salé, 3 stations (24 juin 1999) ;
 - Nieulle-sur-Seudre, mare abreuvoir en marais salé (1^{er} juin 1999).
 - *Myriophyllum alterniflorum*
 - Hiers-Brouage, "jas" en marais "doux", abondant dans 4 stations (31 mai 1999, 7 et 21 juin 1999) ;
 - Nieulle-sur-Seudre, mare abreuvoir en marais salé, abondant (8 juin 1999) ;
 - Saint-Just-Luzac, "jas" en marais "doux", abondant dans 2 stations (4 juin 1999).
 - *Potamogeton trichoides*
 - Le Gua, mares abreuvoirs en marais salé, 2 stations (24 juin 1999) ;
 - Nieulle-sur-Seudre, mare abreuvoir en marais salé (1^{er} juin 1999).
- Lloyd (1886) mentionne cette espèce dans le département à Genouillé, où la station a dû disparaître depuis du fait du drainage agricole. On peut se demander si cette espèce subsiste ailleurs dans ce département ?
- *Utricularia australis*
 - Nieulle-sur-Seudre, mare abreuvoir en marais salé (8 juin 1999).

Contribution de Jacques DROMER

- *Geranium lucidum*
- Échillais, bois du Chay, 18 mai 2001. Coord. en grades, long. par rapport au méridien de Paris : 50,995 nord, 3,634 ouest. Avec *Narcissus pseudo-narcissus* subsp. *pseudo-narcissus*, *Hyacinthoides non-scripta*...

Contribution de Christophe LAGRANGE

- *Angelica heterocarpa*
- Saint-Hippolyte, berge ouest du canal de la Bridoire. 30 août 1999. Sur 1 km de berge.
- *Bellis papullosa*
- Angoulins, pointe du Chay. 5 mars 2000. Nombreux pieds fleuris sur 1 km de falaises. Station très anciennement connue.
- *Centaurea calcitrapa*
- Echillais, brandes de Varaise. 12 juillet 2000. Avec *Echium plantagineum*.
- *Dianthus gallicus*

- Rivedoux-Plage, pointe de Sablanceaux. 09 juillet 1999. Une quinzaine de pieds.
- *Odontites jaubertianus*
- Moëze, Thionnet. 29 août 1999. Quelques dizaines de mètres carrés.
- Rivedoux, pointe de Sablanceaux. 1^{er} septembre 2000 Plus de 100 pieds avec *Lobularia maritima*.
- *Oenanthe foucaudi*
- Saint-Hippolyte, berge est de la Charente, en face du chantier de construction de l'Hermione. 25 juin 2000. 117 pieds sur 300 m de berge.
- *Ononis natrix*
- La Rochelle, zone industrielle de Chef-de-Baie. 24 juin 2000 Environ 15 pieds.
- *Vicia villosa* subsp. *villosa*
- La Rochelle, zone industrielle de Chef-de-Baie. 1^{er} juin 2000. 116 pieds inventoriés.

Contribution de Jean-Michel MATHÉ et Yves PEYTOUREAU

- *Lycopodiella inundata*
- Sainte-Gemme, landes de Cadeuil. Station connue depuis de nombreuses années dans ces landes (Jean TERRISSE) aussi bien à l'est qu'à l'ouest de la route départementale Cadeuil - Rochefort, Nous avons revu cette rareté qui bénéficie d'une protection nationale dans la partie est des landes.
- *Spiranthes aestivalis*
- Sainte-Gemme, landes de Cadeuil. Environ 30 pieds en boutons le 29 juin 2000. Espèce connue de longue date dans le secteur de Cadeuil, mais la plus importante station a été détruite en 1991 (3 000 pieds !). Quelques pieds subsistent à l'abord immédiat des étangs situés à l'est de la route de Rochefort. Protection nationale. Vue en compagnie de *Lobelia urens*, *Epipactis palustris*, *Pinguicula lusitanica*, *Erica cinerea*, *Erica tetralix*.

Contribution de Dominique PATTIER

- *Astragalus purpureus*
- Saint-Saturnin-du-Bois, bois du Fief de la Garde au lieudit Le Coudray. Quelques pieds au bord d'un chemin (sortie S.B.C.O. - S.F.O. du 13 mai 2000 guidée par Anne RICHARD).
- *Centaureum maritimum*
- Dolus, Les Grissotières, quelques pieds au bord d'un chemin sableux. 25 juin 2000.
- *Cynanchum acutum*
- Le Grand-Village, Oléron, passe des Écossais. Une petite station à proximité du chemin, non loin de la mer. 2 juillet 2000.
- *Onosma fastigiata* (Br.-Bl.) Br.-Bl. subsp. *atlantica* Br.-Bl. ex Kerguelen
- Surgères. Il existe encore au moins un pied de cette espèce en voie de disparition, dans l'ancienne carrière de Surgères transformée en terrain de moto-cross. 13 mai 2000.
- Dans l'autre site aunisien, une quinzaine de pieds se maintiennent dont la moitié a fleuri en 2000. La carrière où ils se trouvent est en voie de remblaiement, mais la station ne semble pas menacée à court terme. 2 juillet 2000.
- *Pancratium maritimum*
- Rivedoux (île de Ré). Toujours présent dans la pelouse dunaire de Sablanceaux : le pied principal a été arraché en 1995, mais une repousse a eu lieu dans le trou

laissé par les vandales, tandis qu'un deuxième pied a fleuri un peu plus loin. 9 septembre 2000.

- Sainte-Marie-de-Ré. La station des Ensebert est plus menacée : un seul pied se maintient entre falaise et chemin piétiné.
- *Thalictrum minus* subsp. *minus*
- Saint-Saturnin-du-Bois, bois du Fief de la Garde, au lieu-dit Le Coudray : trois pieds en bordure de la chênaie pubescente (sortie S.B.C.O. - S.F.O. du 13 mai 2000 guidée par Anne RICHARD).

Contribution de Jean TERRISSE

- *Hordeum hystrix*
- La Ronde, abondante localement sur la digue entre le Passage de la Ronde et Caillaude ainsi que çà et là dans quelques prairies hygrophiles pâturées riveraines. 5 juillet 2000.
- *Senecio erraticus*
- La Ronde, quelques pieds dans une prairie vers le Passage de la Ronde. 5 juillet 2000).
- *Centaurium spicatum*
- Saint-Laurent-de-la-Prée, au moins 200 pieds sur le talus de la route de la Levée des Reverseaux. 11 juillet 2000.
- *Stachys germanica*
- Trizay, quelques pieds le long de la D. 238 vers le Champ des Combes. Juillet 2000.

Contribution de Jean-Marc THIRION

- *Bellis pappulosa* Boiss.
- Nieul-les-Saintes, pelouse sèche du Trou de Pampin : plus de 1 000 pieds. Mai 2001.
- *Biscutella guillonii*
- Dompierre-sur-Charente, vallée des Sauzées. Cette crucifère est endémique d'une partie de l'ouest de la France des Deux-Sèvres à la Charente-Maritime (JOVET *et al*, 1984). Nous en avons trouvé deux stations aux extrémités de la vallée : 300 pieds environ. Mai 2001.
- *Carex disticha*
- Chaniers, vallée du Bourrut. Nous avons découvert quelques pieds dans une aulnaie de la vallée.
- *Catananche caerulea*
- Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, falaise morte de la combe à Rambaud. La plante colonise la pelouse sèche du haut de la falaise : une dizaine de pieds. Juin 2001. (En compagnie d'Anne RICHARD).
- *Convolvulus lineatus*
- Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, falaise morte de la combe à Rambaud : 3 pieds. Juin 2001.
- *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *fuchsii*
- Brizambourg, Chez Petit Bois, station dans un bois frais calcaire : 30 pieds. Mai 2001. (en compagnie de Marie-France HULSEN).
- Brizambourg, Verdrie La Petite, station dans un fond de vallée : plusieurs centaines de pieds. Juin 2001. (En compagnie de Serge SEGUIN).

- Villars-les-Bois, Fontbelle, le long de la route qui mène à Chez Journeau : plusieurs dizaine de pieds. Juin 2001. (En compagnie de Marie-France HULSEN).
- *Fritillaria meleagris* subsp. *meleagris*
- Genouillé, bois de la Bastière : une trentaine de pieds. Avril 2001. (En compagnie de Pierre GRILLET).
- *Gladiolus italicus*
- Annezay, les Herses, sur le bord d'un champ argilo-calcaire : 10 pieds. Mai 2001.
- Villars-les-Bois, les Maines, dans une ancienne vigne arrachée, plus de cent pieds. Mai 2001.
- *Hottonia palustris*
- Chaniers, Vallée du Bourrut. La station a été découverte au sein d'une mare créée par un chablis suite à la tempête de décembre 1999. Avril, mai et juin 2001.
- *Iris spuria* subsp. *maritima*
- Rochefort, dans une seule parcelle du marais du Vergeroux où nous avons également noté *Ranunculus ophioglossifolius* : plusieurs centaines de pieds. Juin 2001.
- *Lathyrus palustris* subsp. *palustris*
- Rochefort, base aéronavale, petit fossé à berges abruptes : 1 pied. Juin 2001.
- *Oenanthe foucaudii*
- Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, roselière au bord de la Gironde, sur les terrains du Conservatoire du Littoral : 2 pieds. Juin 2001. (En compagnie d'Anne RICHARD).
- Rochefort, roselière sur bord de Charente à proximité de la base aéronavale : 30 pieds. Juin 2001.
- *Ononis pusilla*
- Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, falaise morte de la combe à Rambaud. La plante colonise le haut de la falaise gratté par les sangliers : plus de 100 pieds. Juin 2001. (En compagnie d'Anne RICHARD).
- *Ophrys lutea*
- Dompierre-sur-Charente, vallée des Sauzées. Cette Orchidée de la région méditerranéenne à subméditerranéenne compte déjà de nombreuses stations en Charente-Maritime dont celle-ci qui a été découverte en 1996 par la SFO : 80 pieds. Mai 2001.
- *Ophrys passionis* Sennen ex J. et P. Devillers-Terschuren
- Dompierre-sur-Charente, Vallée des Sauzées. Nous avons observé un pied de cette espèce sur la même station qu'*Ophrys lutea*. Mai 2001.
- *Ophrys sulcata* J. et P. Devillers-Terschuren
- Nieul-les-Saintes, Pelouse sèche du Trou de Pampin : plus de 100 pieds. Mai 2001.
- *Ophioglossum vulgatum*
- Annezay, Genouillé et Saint-Laurent-de-la-Barrière, bois de la Bastière : plusieurs milliers de pieds. Juin 2001.
- *Orchis mascula*
- Chaniers, bord de route longeant le bois de la Haute Baine : 10 pieds. Mai 2001.
- *Orchis laxiflora* subsp. *militaris*
- Saint-Laurent-de-la-Barrière, au voisinage des mares du bois de la Bastière : une dizaine de pieds. Juin 2001. (En compagnie de Pierre GRILLET).
- Dompierre-sur-Charente, vallée des Sauzées, sur la même station qu'*Ophrys lutea* : 10 pieds. Mai 2001.
- *Orchis palustris*
- Saint-Porchaire, Marais de la Charrie : 5 pieds. Juin 2001.

- *Osyris alba*
 - Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, petit boisement de Chêne vert en haut de falaise morte de la combe à Rambaud : plusieurs centaines de pieds. Juin 2001. (En compagnie d'Anne RICHARD).
- *Pallenis spinosa* subsp. *spinosa*
 - Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, falaise morte de la combe à Rambaud : moins de 10 pieds. Juin 2001. (En compagnie d'Anne RICHARD).
- *Phillyrea latifolia*
 - Trizay, dans une ancienne carrière proche du bois des Coudraies : 50 pieds. Avril 2001.
- *Ranunculus ophioglossifolius*
 - Saint-Laurent-de-la-Barrière, mares des bois de la Bastière. Nous avons trouvé l'espèce en deux petites stations : 24 pieds. Juin 2001.
- *Ribes rubrum*
 - Chaniers, vallée du Bourrut. Nous avons trouvé quelques spécimens dans une aulnaie de la vallée.
- *Scorzonera hispanica*
 - Annezay, Genouillé et Saint-Laurent-de-la-Barrière, bois de la Bastière : plusieurs centaines de pieds. Juin 2001.
- *Vicia villosa* subsp. *villosa*
 - La Rochelle, sur le bord du parking de la gare de marchandises : une dizaine de pieds robustes. Juin 2001.
- *Utricularia vulgaris*
 - Juicq, dans l'ancien vivier de Château-Gaillard qui est actuellement en Réserve Naturelle Volontaire. Avril 2001.
 - Saint-Laurent-de-la-Barrière, bois de la Bastière. Nous avons trouvé l'espèce dans plusieurs mares.

19 - Département de la Corrèze

Contribution de Luc BRUNERYE

(Nomenclature *Flora Europaea*)

- *Abutilon theophrasti*
 - Liourdres (7 octobre 2000). Plaine alluviale à l'est du bourg, très abondant dans un champ de Maïs. Nouveau pour la Corrèze.
- *Alchemilla inconcinna*
 - Saint-Rémy (14 août 2000). Le Chalard, prairie humide près de la Liège, altitude 710 m.
- *Althaea cannabina*
 - Collonges-la-Rouge (15 juillet 2000). Bord de l'ancienne route de Meyssac, sud-est du camping, deux pieds.
- *Amaranthus graecizans*
 - Liourdres (7 octobre 2000). Cultures de la plaine alluviale de la Dordogne.
- *Asplenium* × *alternifolium* nothosubsp. *alternifolium*
 - Voutezac (1^{er} avril 2000). Muret de soutènement au nord-ouest de Sajueix, une grosse touffe, en l'absence des parents.
- *Avenula pratensis* subsp. *pratensis*
 - Saint-Julien-aux-Bois (4 juin 2000). La Chassagne, talus herbeux sur basalte, peu abondant.

- *Centranthus calcitrapae* subsp. *calcitrapae*
 - Estivals (2 juin 2000). Dessus sableux de muret, place de l'Eglise. Nouveau pour la Corrèze, espèce à la limite nord de son aire.
- *Cerastium brachypetalum* subsp. *tauricum*
 - Estivals (2 juin 2000). Larchassal, dessus d'un muret de pierres sèches.
- *Chaerophyllum aureum*
 - Beaulieu-sur-Dordogne, talus-ourlet à l'ouest de Lascombes, altitude 310 m. (2 avril 2000) ;
 - Beaulieu-sur-Dordogne, route du nouveau cimetière, altitude 230 m. (16 mai 2000).
- *Chondrilla juncea*
 - Brive (9 mai 2000). Talus à l'ouest de Labrousse.
- *Cyperus longus*
 - Meyssac (12 juin 2000). Peupleraie au nord-est du Mazet, très abondant.
- *Eleusine indica*
 - Liourdres (7 octobre 2000). Pelouse rudérale dans le bourg, localement abondant. Espèce d'origine tropicale, nouvelle pour la Corrèze.
- *Eragrostis cilianensis*
 - Liourdres (7 octobre 2000). Berme de la route D. 41 à l'est du bourg, peu abondant.
- *Eriophorum vaginatum*
 - Auriac (22 mai 2000). Tourbière entre la route D. 111 et Vialaure, très rare : une seule touffe observée. Nouveau pour la Xaintrie.
- *Fumaria vaillantii*
 - Turenne (17 mai 2000). Causse, bord d'un champ de Blé, près Russac, rare.
- *Galinsoga ciliata* (= *G. quadriradiata*)
 - Liourdres (7 octobre 2000). Cultures de la plaine alluviale de la Dordogne, rare.
- *Galium timeroji*
 - Nespouls (26 septembre 2000). Berme caillouteuse calcaire de la route D. 19 près du pont sur l'autoroute. Nouveau pour la Corrèze.
- *Helianthemum salicifolium*
 - Causse, limite des communes de Nespouls et de Turenne, au nord de Fougères (17 mai 2000).
- *Helianthemum* × *sulfureum* Willd. ex Schlecht (*H. apenninum* × *nummularium*)
 - Avec le précédent (17 mai 2000). Nouveau pour la Corrèze.
- *Heracleum sphondylium* subsp. *sibiricum*
 - Beaulieu-sur-Dordogne (16 mai 2000). Bord de la route entre le nouveau cimetière et Sioniac.
 - Saint-Julien-aux-Bois (4 juin 2000). La Chassagne, talus herbeux.
- *Herniaria glabra*
 - Brive (9 mai 2000). Talus à l'ouest de Labrousse.
- *Hypericum montanum*
 - Voutezac (4 mai 2000). Le Saillant, bord du sentier au dessus de la centrale électrique, rare.
 - Nonards (16 juin 2000). Vallée de la Mémoire en amont de la Mazeyrie, rare.
- *Iris foetidissima*
 - Lignéyrac (6 mai 2000). Talus-ourlet rocheux calcaire au sud-ouest du bourg, rare.
- *Isopyrum thalictroides*
 - Reygade (20 mai 2000). Bois riverain de la Dordogne, à l'est de Vours. Très local.
- *Linum austriacum* subsp. *collinum*
 - Causse, limite des communes de Nespouls et de Turenne, avec les Hélianthèmes ci-dessus. 17 mai 2000.

- *Lythrum hyssopifolia*
 - Cosnac (27 octobre 2000). Fossé sableux humide à l'est de Montplaisir, rare. Seule station actuellement connue en Corrèze.
- *Moenchia erecta* subsp. *erecta*
 - Bassignac-le-Haut (22 mai 2000). Nord-est de Sirieux, pelouse rocailleuse sur basalte.
- *Myosoton aquaticum*
 - Liourdres (7 octobre 2000). Grève de la Dordogne au sud-est du bourg. Seule station actuellement connue en Corrèze.
- *Ornithopus compressus*
 - Brive (9 mai 2000). Talus à l'ouest de Labrousse, abondant. Seule station actuellement connue en Corrèze.
- *Orobanche amethystea* subsp. *amethystea*
 - Jugeals-Nazareth (17 mai 2000). Prairie à *Bromus erectus* entre le bourg et Malepeyre, sur *Eryngium campestre*, rare.
- *Orobanche teucrii*
 - Chartrier-Ferrière (2 juin 2000). Limite de la commune au sud des Ages, talus bord de route, sur *Teucrium chamaedrys*.
- *Panicum capillare*
 - Liourdres (7 octobre 2000). Bord de la route D. 41 entre le bourg et la Geneste, localement abondant.
- *Phyteuma gallicum*
 - Lestards (26 mai 2000). Bord de la Vézère en amont des gorges du Saut de la Virole, localement abondant, altitude 630 m.
- *Ranunculus aconitifolius*
 - Voutezac (1^{er} avril 2000). Bord de la Loyre au nord-ouest de Sajueix, altitude 160 m. Une des stations les plus basses et les plus occidentales de l'espèce en Corrèze.
- *Ranunculus ololeucos*
 - Bassignac-le-Haut (22 mai 2000). Forêt domaniale de Redenat, lande tourbeuse sur basalte, rare.
- *Salvia verbenaca*
 - Brive (24 avril 2000). Bord de prairie à Chèvrecujols, peu abondant. Nouveau pour la Corrèze.
- *Saponaria ocymoides*
 - Estivals (2 juin 2000). Nord du Troulier, pelouse enrochée sur talus, très rare. Espèce à sa limite nord-occidentale.
- *Spergula pentandra*
 - Brive (24 avril 2000). Lande sableuse sur grès décomposé, au sud de la Montade.
- *Stachys palustris*
 - Saint-Viance (14 juin 2000). Le Teyres, fossé humide, rare.
- *Stellaria neglecta* (= *Stellaria media* subsp. *major*)
 - Brive (24 avril 2000). Vallée de Planchetorte au nord de Champ, fossé ombragé au pied de rochers suintants. Espèce souvent confondue avec *Stellaria media*.
- *Taraxacum* groupe *palustre*
 - Brive (22 mars 2000). Sud-est de Puyjarrige, à la limite de la commune de Noailles, pelouse marneuse.
- *Tolpis barbata*
 - Brive (9 mai 2000). Talus à l'ouest de Labrousse, peu abondant.
- *Trifolium striatum*
 - Brive (9 mai 2000). Talus à l'ouest de Labrousse, en fleurs.

- Turenne (26 septembre 2000). Causse au nord de Fougères, fruits secs.
- *Vaccinium microcarpum*
- Davignac (26 juillet 2000). Sud-est de la tourbière de la Ferrière, local, altitude 880 m.
- Le Longéroux, limite des communes de Meymac et Saint-Merd-les-Oussines, plusieurs populations, altitude 875 m. (20 août 2000).

Département de la Corrèze

Contribution de Jean-Claude FELZINES

- *Aceras anthropophorum*
- Noailles, au Déves. 01.06.2000.
- Saint-Julien-Maumont, dans un bois de pins, au bord de la route montant sur le causse. 29.05.2001.
- *Agrimonia procera*
- Curemonte, chemin entre la Marquisie et la route D. 153. 29.05.2000.
- *Anagallis tenella*
- Nonards, chemin descendant de la D. 153 à Arche, au pied de la butte, avec *Equisetum telmateia*. 06.06.2000.
- *Bidens frondosa*
- Astaillac, AC dans le **Bidention** du bord de la Dordogne, avec *Polygonum hydropiper*, *Aster lanceolatus*, *Echinochloa crus-galli*, *Leersia oryzoides*. 18.09.2000.
- *Bromus commutatus*
- Branceilles, le Perrier. 12.06.2000.
- *Buglossoides purpureocaerulea*
- Marcillac-la-Croze, à la Brousse. 03.04.1999.
- Astaillac, bord D. 41 à la Geneste. 30.03.1999.
- *Buxus sempervirens*
- Subspontané, çà et là :
- Nonards, coteau calcaire à Laroche. 20.04.1999.
- Saint-Julien-Maumont, coteau sous la Teyssière. 30.03.2000.
- Branceilles, quelques pieds sous Claval. 07.04.2000.
- *Cardaria draba*
- Tudeils, Lallé. 14.05.1999.
- *Carex demissa*
- Végennes, carrefour de la route de Queyssac et du Chassaing, dans la lande à *Erica scoparia* et *Molinia caerulea*. 29.05.2001
- *Carex pallescens*
- Curemonte, SE de la Marquisie. 29.05.2001.
- *Carex serotina*
- Végennes, creux humide sur la dalle de grès, route de la Borderie. 29.05.2001.
- *Cistus salvifolius*
- Saint-Julien-Maumont, talus bordant le chemin qui longe l'étang, en limite de la commune de Branceilles. Cette station est peu éloignée de celle indiquée à Marcillac-la-Croze (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **30** : 218), où une autre station a été observée depuis sur le flanc est du Puy Redon, toujours sur banc de grès. 07.04.2000.
- *Conyza blakei*
- Stoniac, Madelbos, chemin descendant dans la vallée du Palsou. 18.06.1999.

- Tudeils, vallon de Combressolles. 15.06.1999.
- *Cucubalus baccifer*
- Saint-Julien-Maumont, près de la chapelle. 14.05.1999.
- Branceilles, le Perrier. 12.06.2000.
- *Desmazeria rigida*
- Branceilles, bord de la route de Rhodes, avec *Vulpia unilateralis*. 24.05.2001.
- *Festuca auquieri*
- Branceilles, la Bourdie. 12.06.2000. Cette fétuque est AC sur le causse.
- *Gaudinia fragilis*
- Curemonte, bord du chemin entre la Marquisie et la D. 153. 29.05.2001.
- *Iris foetidissima*
- Curemonte, talus de la route d'Eynard. 16.03.2000.
- Astailac, la Plaine. 08.04.1996.
- *Laurus nobilis*
- Subspontané, isolé, çà et là :
- Végennes, versant de la vallée de l'Escandrouillère. 22.03.2000.
- Branceilles, bois au nord de Crauffon. 12.06.2000.
- Nonards, ravin au-dessus de Frat. 06.06.2000.
- *Limodorum abortivum*
- Saint-Julien-Maumont, AC en lisière des bois de pins sur d'anciennes vignes, à la Rue, à la Croix de la Chambre, à Saint-Julien, bord de la route montant sur le causse. 29.05.2000.
- Branceilles, à la Bourdie, à Rabot, à Picharoux. 12.06.2000.
- Noailles, au Déves. 01.06.2000.
- *Lithospermum officinale*
- Branceilles, près de Rabot. 12.06.2000 et coteau au nord de Rhodes. 24.05.2001.
- *Lotus angustissimus*
- Nonards, au-dessus de Frat. 06.06.2000.
- Curemonte, au pied de la butte au niveau de la bifurcation D. 153 - D. 153E. 14.06.1999.
- *Montia fontana* subsp. *chondrosperma*
- Saint-Julien-Maumont, affleurement gréseux dans un pré, au sud de la Broussolle. 30.03.2000.
- *Ophrys apifera*
- Saint-Julien-Maumont, AC dans les bois de pins sur d'anciennes vignes, à la Rue, à Saint-Julien. 29.05.2000
- Branceilles, à Picharoux. 26.05.2001.
- Sioniac, entre le Chassaing et la D. 153. 29.05.2001.
- *Ophrys scolopax*
- Branceilles, à la Bourdie. 01.06.2000.
- Saint-Julien-Maumont, route montant sur le causse. 29.05.2001.
- *Ophrys sphegodes* subsp. *litigiosa*
- Végennes, au Puy Turlau. 21.03.2000.
- Saint-Julien-Maumont, abondant sous la Teyssière et à la Rue. 30.03.2000.
- Branceilles, au-dessous de Claval. 07.04.2000.
- *Orchis militaris*
- Noailles, au Déves. 01.06.2000.
- *Plantago maritima*
- Végennes, versant de la vallée de l'Escandrouillère. 22.03.2000.

- Branceilles, sous Claval. 07.04.2000.
- *Platanthera chlorantha*
- Nonards, au-dessus d'Arche. 06.06.2000.
- Branceilles, à Picharoux. 26.05.2001.
- *Polygonum minus*
- Astaillac, bord de la Dordogne. 18.09.2000.
- *Quercus ilex*
- Saint-Julien-Maumont, un jeune individu isolé sur un affleurement gréseux, sous la Rue ; trois autres, très jeunes, ont été vus sur le causse (où, par ailleurs, quelques plantations sont réalisées en association avec du noisetier et du chêne pubescent). 30.03.2000.
- *Ranunculus paludosus*
- Marcillac-la-Croze, à la Brousse. 03.04.1999.
- *Salix repens*
- A supprimer de la liste parue dans le *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **30** : 219. Il s'agit d'une forme très prostrée et à petites feuilles de *S. capraea*.
- *Serratula tinctoria*
- Curemonte, au pied de la butte au niveau de la bifurcation D. 153 - D. 153E. 14.06.1999.
- Végennes, versant de la vallée de l'Escandrouillère. 22.03.2000.
- *Scirpus setaceus*
- Végennes, carrefour de la route de Queyssac et du Chassaing, dans la lande à *Erica scoparia* et *Molinia caerulea*. 29.05.2001.
- *Thelypteris limbosperma*
- Puy d'Arnac, talus suintant ombragé dans le vallon situé à l'ouest de Beauregard, avec *Blechnum spicant*. 24.07.1998.
- *Trifolium incarnatum* subsp. *molinerii*
- Altillac, le Treil. 08.05.1999.
- *Thymus praecox* subsp. *arcticus*
- Puy d'Arnac, sur le plateau calcaire. 06.06.2000.
- Saint-Julien-Maumont, sur le causse. 29.05.2001.
- *Tuberaria guttata*
- Sioniac, Madelbos, chemin descendant dans la vallée du Palsou. 18.06.1999.
- Curemonte, sur un banc de grès entre la Marquisie et la D. 153. 29.05.2001.
- *Veronica agrestis*
- Tudeils, Lallé. 14.05.1999.
- *Veronica opaca*
- Saint-Julien-Maumont, affleurement gréseux dans un pré, au sud de la Broussolle. 30.03.2000.

24 - Département de la Dordogne

Contribution de Paméla LABATUT

- *Orchis coriophora* subsp. *fragrans*
- Beaumont-en-Périgord, 4 exemplaires sur un coteau en face du château de Bannes, le 20 mai 2000.

➤ *Serapias cordigera*

- Bergerac, Rosette. Requiem pour *Serapias cordigera* de la Dordogne. Découvert en 1977 sur un coteau à Rosette à 4 km de Bergerac (Contribution à l'Inventaire de la Flore, *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **13**, 1982).

Historique dans le *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **20**, 1989 : de 1987 à 1991 aucun pied n'a paru. En 1992 : 1 pied ; en 1993 : 5 pieds ; en 1994 et 1995 : 1 pied ; en 1996 et 1997 aucun pied ; en 1998 : 2 pieds et en 1999 : 5 pieds.

En 2000 le terrain, qui est constructible, a été vendu et une maison est prévue. Le *Serapias cordigera* se trouve maintenant sous une épaisse couche de pierres, sous-bassement de l'allée qui conduira à la maison éventuelle. Donc, avec *Serapias cordigera* et *Liparis loeselii*, officiellement disparu aussi, (*L'Orchidophile*, **140** "Une répartition des Orchidées Sauvages en France" de Pierre JACQUET, 2^{ème} mise à jour, février 2000), deux de nos plus rares taxons n'y sont plus.

36 - Département de l'Indre

Contribution de Muriel DAUDON

➤ *Apium inundatum*

- Migné, étang de Pied-Bernard (9 juillet 1997).

➤ *Butomus umbellatus*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang Benoît (24 juillet 1997), étang récent dans la Réserve Naturelle de Chérine (12 juillet 1999).

➤ *Cardamine parviflora*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang près des Robineries (21 juin 2000), étang Gorgeat (18 mai 2000).

➤ *Carex bohemica*

- Ciron, étang du Grand Fauviget (23 juillet 1997) ;

- Saint-Michel-en-Brenne, étang Miclos (16 juillet 1997).

➤ *Ceratophyllum submersum*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang Gorgeat (19 juillet 2000).

➤ *Damasonium alisma*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang Gorgeat, plusieurs centaines d'individus (21 juin et 19 juillet 2000).

➤ *Epilobium palustre*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang Gorgeat (21 juin 2000).

➤ *Gratiola officinalis*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang Gorgeat (12 mai 2000).

➤ *Hottonia palustris*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang Gorgeat (17 mai 2000).

➤ *Hypericum elodes*

- Migné, étang de Pied-Bernard (9 juillet 1997) ;

- Saint-Michel-en-Brenne, Bois des Touches (20 juillet 2000).

➤ *Leersia oryzoides*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang Nuret (18 juillet 2000).

➤ *Limosella aquatica*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang près des Robineries, étang Gorgeat (21 juin 2000).

➤ *Linaria pelisseriana*

- Saint-Michel-en-Brenne, pelouses près de l'étang de l'Ardonnière (12 mai 1997).

➤ *Littorella uniflora*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang Miclos (26 août 1997, revue en juillet 1999 et juin 2000).

➤ *Ludwigia palustris*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang Gorgeat (21 juin 2000).

➤ *Luronium natans*

- Ciron, étang du Grand Fauviget (23 juillet 1997).

➤ *Marsilea quadrifolia*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang près des Robineries, petite station de quelques mètres carrés (5 juillet 2000).

➤ *Najas minor*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang Miclos (16 juillet 1997, revu en juillet 1999 et 2000), étang près des Robineries (4 juillet 2000).

➤ *Orchis laxiflora* subsp. *palustris*

- Saulnay/Sainte-Gemme, abords de l'étang Vieux (4 juillet 1997).

➤ *Ophioglossum azoricum*

- Saint-Michel-en-Brenne, lande près de l'étang Miclos, environ 5 individus chétifs conformes au taxon décrit en Brenne par Michel BOUDRIE, dans le tome 25 du présent bulletin (28 mai 1996, revus le 12 mai 1997, le 21 mai 1999 et le 11 mai 2000).

➤ *Pinguicula lusitanica*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang Ricot dans la Réserve Naturelle de Chérine (13 juillet 1999).

➤ *Potamogeton polygonifolius*

- Saint-Michel-en-Brenne, Bois des Touches (20 juillet 2000).

➤ *Potamogeton trichoides*

- Migné, étang de la Folie (22 juillet 1997) ;

- Saint-Michel-en-Brenne, étang récent dans la Réserve Naturelle de Chérine (12 juillet 1999), étang près des Robineries (5 juillet 2000).

➤ *Pulicaria vulgaris*

- Saint-Michel-en-Brenne, étangs récents dans la Réserve Naturelle de Chérine (17 juillet 1997, revue en juillet 1998 et 1999), étangs près des Robineries (5 juillet 2000).

➤ *Ranunculus hederaceus*

- Saint-Michel-en-Brenne, au sud-est du Bois des Touches (18 mai 2000).

➤ *Ranunculus ophioglossifolius*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang Gorgeat, plusieurs centaines de pieds (12 mai 2000).

➤ *Sedum villosum*

- Saint-Michel-en-Brenne, près de l'étang Gorgeat (12 mai 2000).

➤ *Spiranthes spiralis*

- Saint-Michel-en-Brenne, pelouses près de l'étang Nuret (27 août 1997).

➤ *Trapa natans*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang Barineau (4 juillet 2000).

➤ *Trifolium michelianum*

- Saint-Michel-en-Brenne, étang Gorgeat, plusieurs centaines de pieds (12 mai 2000).

➤ *Trifolium squamosum*

- Saint-Michel-en-Brenne, près de l'étang Gorgeat, quelques centaines de pieds (12 mai 2000).

➤ *Utricularia minor*

- Rosnay, étang Massé (24 juillet 1997).

37 - Département de l'Indre-et-Loire

Contribution de Patrick GATIGNOL (P. G.)
et de Dominique et Jean PROVOST (D. & J. P.),

➤ *Potamogeton trichoides*

- Abilly, bord de la Creuse près de Leugny, avec *Potamogeton pectinatus*, *P. nodosus*, *Zanichellia palustris* et sur le bord *Cyperus longus*, *Juncus compressus* et *Brassica nigra*, 23 septembre 2000, (P. G.), (D. & J. P.).

46 - Département du Lot

Contribution de Jean-Jacques LACROIX

➤ *Arabis alpina*

- Carennac, La Roque, 20 mars 2000. 31 T CK07. Station cantonnée au pied d'une falaise calcaire sur éboulis en forte pente, en sous-bois clair de *Cornus mas* et *Corylus avellana*, sur sol moussu parsemé de *Mercurialis annua*.

➤ *Catananche caerulea*

- Cahors, 3 juillet 2000. 31 T CK72. Station abondante de plus d'un hectare sur coteau calcaire exposé à l'ouest.

➤ *Hypericum androsaemum*

- Autoire, 21 juillet 2000. 31 T DK06. Un pied isolé en fruit au bas d'une cascade sur terrain détritique humide et calcaire en sous-bois clair.

➤ *Chaenorhinum villosum* (L.) Lange in Willk. et Lange

- Autoire, 21 juillet 2000. (MASSON, J.-J. L.). 31 T DK06. Un pied isolé sous une balme calcaire. Station très précaire (activité d'escalade sportive et sécheresse prononcée).

➤ *Scilla bifolia*

- Rocamadour, Cabouy, 27 février 2000. 31 T CK86. Pieds épars sur toute la partie humifère du versant nord. Un pied, sur les deux fleurs les plus basses, présentait l'anomalie de sept pétales ou sépales et de sept étamines.

Contribution de Jérôme SEGONDS

➤ *Ajuga chamaepitys*

- Aujols, "Sarrades", petit secteur de cultures et de prés entre la D. 911 et les premiers contreforts du plateau du causse de Lalbenque. Localisé mais abondant le 19 juillet 2000.

➤ *Althaea hirsuta*

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, pelouses rocailleuses, landes-garrigues et chênaie pubescente sur lithosols calcaires dominant le ruisseau de Saint-Jean. Localisé le 7 juin 1999.

➤ *Anthericum liliago*

- Aujols, combe de la Valse, secteur de causse (de Limogne) aux abords d'une carrière en exploitation. Mosaïque de chênaie pubescente, pelouse sèche caussenarde, éboulis calcaires et corniches. Localisé mais abondant les 13 mars et 29 mai 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Localisé mais abondant le 7 juin 1999.

➤ *Arenaria controversa*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Localisé les 13 mars et 29 mai 2000.

➤ *Arenaria serpyllifolia*

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Peu fréquent le 7 juin 1999.

➤ *Argyrobium zanonii*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Peu fréquent les 13 mars et 29 mai 2000.

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Peu fréquent le 7 juin 1999.

➤ *Artemisia alba*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Abondant les 13 mars et 29 mai 2000.

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Abondant le 7 juin 1999.

➤ *Bombycilaena erecta*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Localisé les 13 mars et 29 mai 2000.

➤ *Bupleurum rotundifolium*

- Aujols, "Sarrades", idem *Ajuga chamaepitys*. Peu fréquent le 19 juillet 2000.

➤ *Carduncellus mitissimus*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Peu fréquent les 13 mars et 29 mai 2000.

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Quelques pieds le 7 juin 1999.

➤ *Catananche caerulea*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Localisé mais abondant les 13 mars et 29 mai 2000.

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Peu fréquent le 7 juin 1999.

➤ *Caucalis platycarpus*

- Aujols, "Sarrades", idem *Ajuga chamaepitys*. Abondant le 19 juillet 2000.

➤ *Cephalanthera damasonium*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Peu fréquent les 13 mars et 29 mai 2000.

➤ *Cephalanthera rubra*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Abondant les 13 mars et 29 mai 2000.

- Aujols, "Sarrades", idem *Ajuga chamaepitys*. Abondant le 19 juillet 2000.

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Abondant le 7 juin 1999.

➤ *Cephalaria leucantha*

- Aujols, "les Rouquets", petit secteur de cultures entre la D. 911 et les premiers contreforts boisés du plateau du causse de Lalbenque. Peu fréquent le 4 octobre 2000.

➤ *Chaenorhinum minus*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Peu fréquent les 13 mars et 29 mai 2000.

➤ *Convolvulus cantabrica*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Peu fréquent les 13 mars et 29 mai 2000.

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Peu fréquent le 7 juin 1999.
- *Coronilla minima*
- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Peu fréquent les 13 mars et 29 mai 2000.
- *Coronilla scorpioides*
- Aujols, "Sarrades", idem *Ajuga chamaepitys*. Peu fréquent le 19 juillet 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Peu fréquent le 7 juin 1999.
- *Digitalis lutea*
- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Peu fréquent les 13 mars et 29 mai 2000.
- Aujols, "Sarrades", idem *Ajuga chamaepitys*. Peu fréquent le 19 juillet 2000.
- *Euphorbia exigua*
- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Abondant les 13 mars et 29 mai 2000.
- Aujols, "les Rouquets", idem *Cephalaria leucantha*. Abondant le 4 octobre 2000.
- Aujols, "Sarrades", idem *Ajuga chamaepitys*. Abondant le 19 juillet 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Abondant le 7 juin 1999.
- *Galeopsis angustifolia*
- Aujols, "les Rouquets", idem *Cephalaria leucantha*. Peu fréquent le 4 octobre 2000.
- Aujols, "Sarrades", idem *Ajuga chamaepitys*. Abondant le 19 juillet 2000.
- *Genista cinerea*
- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Localisé mais abondant les 13 mars et 29 mai 2000.
- *Genista hispanica*
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Localisé le 7 juin 1999.
- *Geranium sanguineum*
- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Peu fréquent les 13 mars et 29 mai 2000.
- *Globularia punctata*
- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Abondant les 13 mars et 29 mai 2000.
- *Helianthemum apenninum*
- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Peu fréquent les 13 mars et 29 mai 2000.
- *Helianthemum oelandicum*
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Localisé le 7 juin 1999.
- *Hepatica nobilis*
- Saint-Denis-Catus, Ensemble de bois (châtaigneraie) sur les pentes autour d'une carrière en exploitation. Localisé le 4/10/2000.
- *Hypericum montanum*
- Aujols, "Sarrades", idem *Ajuga chamaepitys*. Quelques pieds le 19 juillet 2000.
- *Iberis amara*
- Aujols, "Sarrades", idem *Ajuga chamaepitys*. Abondant le 19 juillet 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Peu fréquent le 7 juin 1999.
- *Inula conyza*
- Aujols, "Sarrades", idem *Ajuga chamaepitys*. Peu fréquent le 19 juillet 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Peu fréquent le 7 juin 1999.

➤ *Inula montana*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Abondant les 13 mars et 29 mai 2000.

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Abondant le 7 juin 1999.

➤ *Lactuca perennis*

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Peu fréquent le 7 juin 1999.

➤ *Leuzea confiera*

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Localisé le 7 juin 1999.

➤ *Limodorum abortivum*

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Localisé le 7 juin 1999.

➤ *Linaria arvensis*

- Aujols, "Sarrades", idem *Ajuga chamaepitys*. Abondant le 19 juillet 2000.

- Aujols, "les Rouquets", idem *Cephalaria leucantha*. Abondant le 4 octobre 2000.

➤ *Linaria supina*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Peu fréquent les 13 mars et 29 mai 2000.

➤ *Linum catharticum*

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Abondant le 7 juin 1999.

➤ *Melittis melissophyllum*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Abondant les 13 mars et 29 mai 2000.

➤ *Monotropa hypopitys*

- Saint-Denis-Catus, ensemble de bois (châtaigneraie) sur les pentes autour de la carrière en exploitation. Quelques pieds le 4 octobre 2000.

➤ *Narcissus requienii*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Localisé mais abondant les 13 mars et 29 mai 2000.

➤ *Ononis natrix*

- Aujols, "Sarrades", idem *Ajuga chamaepitys*. Quelques pieds le 19 juillet 2000.

➤ *Ononis striata*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Localisé mais abondant les 13 mars et 29 mai 2000.

➤ *Orchis simia*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Peu fréquent les 13 mars et 29 mai 2000.

➤ *Pistacia terebinthus*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Localisé les 13 mars et 29 mai 2000.

➤ *Rhamnus alaternus*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Localisé mais abondant les 13 mars et 29 mai 2000.

- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Peu fréquent le 7 juin 1999.

➤ *Saponaria ocymoides*

- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Localisé les 13 mars et 29 mai 2000.

➤ *Scutellaria galericulata*

- Saint-Denis-Catus, ensemble de bois (châtaigneraie) sur les pentes autour de la carrière en exploitation. Localisé le 4 octobre 2000.

- *Securigera varia*
- Aujols, "Sarrades", idem *Ajuga chamaepitys*. Peu fréquent le 19 juillet 2000.
- *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata*
- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Localisé mais abondant les 13 mars et 29 mai 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Localisé le 7 juin 1999.
- *Stachys annua*
- Aujols, "les Rouquets", idem *Cephalaria leucantha*. Abondant le 4 octobre 2000.
- Aujols, "Sarrades", idem *Ajuga chamaepitys*. Abondant le 19 juillet 2000.
- *Stachelina dubia*
- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Peu fréquent les 13 mars et 29 mai 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Localisé le 7 juin 1999.
- *Tanacetum corymbosum*
- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Peu fréquent les 13 mars et 29 mai 2000.
- *Teucrium montanum*
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Localisé le 7 juin 1999.
- *Thesium divaricatum*
- Aujols, combe de la Valse, idem *Anthericum liliago*. Peu fréquent les 13 mars et 29 mai 2000.
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Peu fréquent le 7 juin 1999.
- *Trinia glauca*
- Villesèque, ruisseau de Saint-Jean, idem *Althaea hirsuta*. Peu fréquent le 7 juin 1999.
- *Xeranthemum cylindraceum*
- Aujols, "Sarrades", idem *Ajuga chamaepitys*. Abondant le 19 juillet 2000.

79 - Département des Deux-Sèvres

Contributions de Yves BARON (Y. B.), Antoine CHASTENET (A. C.),
Patrick GATIGNOL (P. G.), Alain METAIS (A. M.),
Didier PERROCHE (D. P.), Dominique et Jean PROVOST (D. & J. P.),
S.B.C.O.-86 (découvertes collégiales lors des sorties)

- *Adonis flammea*
- Marnes, la Croix Guillet, deux pieds sur le bord d'un champ de colza, 2^e référence régionale depuis un demi-siècle, après Breuil-Magné (C. L. et R. D., bulletin 29) !, 23 mai 2000, (Y.B.).
- *Astragalus glycyphyllos*
- Airvault, coteau de Vernay, 5 pieds au moins, avec *Chamaespartium sagittale*, 4 mai 2000, (Y.B.).
- *Corydalis solida*
- Le Breuil-sous-Argenton, sous-bois en aval du pont de Grifferus, sur la rive droite, 10 mars 2000, (D.P.).
- *Euphorbia platyphylla*
- Villefollet, abondant dans un champ, 29 juin 2000, (P.G.).
- *Galium glaucum*
- Assais-les-Jumeaux, vallée Bourdigal, les Voyes, colonie importante, 23 mai 2000, (Y.B.).

- *Geranium sanguineum*
- Marnes, vallée Carreau, une touffe, 23 mai 2000, (Y.B.).
- *Lathyrus sphaericus*
- Assais-les-Jumeaux, vallée Bourdigal, les Voyes, 23 mai 2000, (Y.B.).
- *Melilotus altissimus*
- Prin-Deyrançon, chemin humide à proximité des tourbières, quelques pieds de cette espèce peu connue, 17 juin 2000, (P.G.).
- *Myosotis balbiana*
- Coutières, ancienne carrière de granit, plusieurs pieds pour cette espèce récemment découverte dans le département des Deux-Sèvres, à rechercher, 29 avril 2000, (A.C.).
- *Ophrys fusca*
- Assais-les-Jumeaux, vallée Bourdigal, les Voyes, une centaine de hampes (J.-C. GUÉRIN), une dizaine de pieds vus le 23 mai 2000, (Y.B.). Les quelques pieds découverts dans la partie aval, sur la Grimaudière (Vienne), à l'occasion de la sortie du 21-5-78 (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 9 : 254-256) ne semblent pas par contre y avoir eu de descendance.
- *Orchis simia*
- Airvault, coteau de Vernay (sur indication G. BONNIN), plusieurs dizaines de hampes, 4 mai 2000, (Y.B.).
- *Orobanche ramosa*
- Saint-Jouin-de-Marnes, bois de Mai, plus de 40 hampes, égrenées au bord d'un champ, 23 mai 2000, (Y.B.).
- *Ranunculus ophioglossifolius*
- Vanzay, Le Grand Marchais, quelques pieds autour d'une mare, 18 mai 2000, (P.G.).
- *Sedum andegavense*
- Le Breuil-sous-Argenton. La station signalée entre Les Brissonnières et le bourg (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 30 : 227), revue en parfait état en 1999, s'est fortement appauvrie. Seulement 10 individus repérés cette année sur la bande médiane de la route, particulièrement menacés car à la merci d'aménagements divers de la voirie sur cette petite route régulièrement empruntée par les voitures. A proximité se trouvait *Crassula tillaea*, 1^{er} juin 2000, (D.P.).
- *Stachys heraclea*
- Availles, bois de la Villedieu, lisière d'un chemin, 29 juin 2000, (P.G.).
- *Teesdalia coronopifolia*
- Mauzé-Thouarsais, château du Pressoir, quelques pieds de cette rare espèce déjà connue dans cette station, 27 février 2000, (P.G.).

Contribution de Jean TERRISSE

- *Anagallis minima*
- Clave, forêt de la Saisine, layon herbeux hygrophile. 18 mai 2000.
- *Hieracium lactucella*
- Clave, forêt de la Saisine, talus oligotrophe (18 mai 2000).
- Pugnny : rive ouest de l'étang de Courberive. 4 juillet 2000.
- *Carex laevigata*
- Clave, forêt de la Saisine, layons hydromorphes. 18 mai 2000.
- Vernoux-en-Gâtine, bois de Vernoux, quelques pieds dans une zone à écoulement temporaire en sous-bois (4 juillet 2000).
- Ménigoute : vallée de la Vonne entre le Bois du Moulin Neuf et la Basse Aumônerie, quelques pieds dans des suintements forestiers. 28 juin 2000.

➤ *Carduncellus mitissimus*

- Petit-Breuil-Deyrançon, chênaie de Viron. 25 mai 2000. En compagnie de : *Hypochoeris maculata* (250 pieds !), *Scorzonera hirsuta*, *Inula squarrosa*, *Limodorum occidentale* (1 pied), *Astragalus purpureus*, etc. déjà connus là.
- Thorigny, bois de Beaulieu. En compagnie de *Catananche caerulea*, *Fumana procumbens*, etc. déjà connus là. 23 mai 2000.
- Saint-Saturnin-du-Bois, bois de la Motte-Aubert. 23 mai 2000.

➤ *Chamaecytisus supinus*

- PRIAIRES, bois de Breuillac. 23 mai 2000.

➤ *Lysimachia nemorum*

- L'Absie, forêt de l'Absie : une station de moins de 100 pieds. 4 juillet 2000.

➤ *Salix aurita*

- Vernoux-en-Gâtine, bois de Vernoux, quelques individus en bordure d'un étang à rives tourbeuses. 4 juillet 2000.

➤ *Betula pubescens*

- Vernoux-en-Gâtine, bois de Vernoux. Présent en mélange avec *Betula verrucosa* ! sur les rives d'un étang. 4 juillet 2000.

➤ *Stellaria alsine*

- L'Absie, forêt de l'Absie. 4 juillet 2000.

➤ *Leersia oryzoides*

- L'Absie, forêt de l'Absie, en bordure d'un petit étang mésoeutrophe. 4 juillet 2000. En compagnie de *Scirpus silvaticus*.
- Ménigoute, abondante sur les rives de l'étang de Boispouvreau. 28 juin 2000.

➤ *Veronica montana*

- L'Absie, forêt de l'Absie. 4 juillet 2000.
- La Motte-Saint-Héray, vallée des Grenats, quelques pieds en bordure du ruisseau. 28 mars 2000.
- La Crèche, bois pentu dominant le Chambon, à proximité de l'importante station de *Dipsacus pilosus*. 21 juin 2000.

➤ *Luzula silvatica*

- Vernoux-en-Gâtine, bois de Vernoux, rare en sous-bois. 4 juillet 2000.

➤ *Achillea ptarmica*

- Vernoux-en-Gâtine, bois de Vernoux, quelques pieds en bordure d'un étang. 4 juillet 2000.
- Pigny, quelques pieds sur la rive ouest de l'étang de Courberive. 4 juillet 2000.
- Ménigoute, rives de la Vonne, entre le Bois du Moulin Neuf et la Basse Aumônerie, quelques pieds. 28 juin 2000.

➤ *Ranunculus hederaceus*

- Pigny, borbier sur la rive ouest de l'étang de Courberive. 4 juillet 2000.
- Ménigoute, borbier au bord de la Vonne, sous le Bois du Moulin Neuf. 28 juin 2000.

➤ *Blechnum spicant*

- Ménigoute, vallée de la Vonne sous le Bois du Moulin Neuf, deux pieds sur un suintement forestier. 28 juin 2000.

➤ *Sedum rubens*

- Ménigoute, rochers granitiques en bordure de l'étang de Boispouvreau. 28 juin 2000.

➤ *Senecio erraticus*

- Ménigoute, rives de la Vonne en amont de la Basse Aumônerie. 28 juin 2000.

➤ *Paspalum distichum*

- Ménigoute, pas rare sur la rive sud-est de l'étang de Boispouvreau. 28 juin 2000.

- *Arnoseris minima*
 - Le Breuil-sous-Argenton, pelouses oligotrophes sur granite. En compagnie de *Plantago holosteum* et *Sesamoides canescens*, le 6 juin 2000.
- *Ranunculus nodiflorus*
 - Le Breuil-sous-Argenton, entre 300 et 400 pieds fleuris cette année dans la station classique qui reste la seule connue du Poitou-Charentes. 6 juin 2000.
- *Avenula lodunensis*
 - Taize, butte de Moncoué, quelques pieds en ourlet d'une lande mésophile à *Erica scoparia*. 17 mai 2000.
- *Crassula tillaea*
 - Taize, pied du versant sud de la butte de Moncoué dans un beau **Thero - Airion** avec *Polycarpon tetraphyllum*, *Aphanes inexpectata*, *Trifolium glomeratum*, etc. 17 mai 2000.
- *Ornithopus compressus*
 - Taize, pied du versant sud de la butte de Moncoué, des centaines de pieds dans un champ sablonneux en friche. 17 mai 2000.
- *Arenaria controversa*
 - Grandzay-Gript, station EDF vers le Bois de la Noue, des centaines (milliers ?) sur le sol pierreux calcaire décapé à l'intérieur des clôtures de la centrale. 17 mai 2000. Unique station en Deux-Sèvres pour cette espèce protégée au niveau national, découverte là par Gaston BONNIN.
- *Isoetes hystrix*
 - Le Breuil-sous-Argenton, suintements dans un vallon latéral de la vallée de l'Ouère sous la Fréminière, quelques dizaines de pieds en plusieurs micro-stations. 6 juin 2000.
- *Scorzonera hispanica*
 - Thorigny, bois de Beaulieu, une cinquantaine de pieds en ourlet, avec *Scorzonera hirsuta*, *Hypochoeris maculata*, *Inula squarrosa*, etc, déjà connus là. 23 juin 2000.
- *Scorzonera hirsuta*
 - Saint-Saturnin-du-Bois, bois de la Motte-Aubert, 9 pieds fleuris dans une pelouse-ourlet. 23 juin 2000.
- *Euphorbia esula*
 - Saint-Saturnin-du-Bois, bois de la Motte-Aubert, 2 pieds. 23 mai 2000.
- *Aster linosyris*
 - Prieaires, bois de Breuillac, plus d'un millier. 23 mai 2000.
- *Galium boreale*
 - Thorigny, bois de Beaulieu, au moins 500 pieds. 23 mai 2000.
- *Hypochoeris maculata*
 - Maires, bois de Breuillac, 4 stations totalisant 24 pieds, en compagnie d'*Astragalus purpureus*, assez abondante, déjà connue ici. 23 mai 2000.
- *Juncus striatus*
 - Périgné, sur les 0.8 ha de **Molinion** subsistant de ce qui fut un des sites les plus remarquables de la région pour ce type de végétation, une dizaine de pieds, avec *Deschampsia media* (2), *Carex serotina*, *Galium debile*, etc. 20 juin 2000.
- *Gratiola officinalis*
 - Périgné, base de loisirs. Se maintient en abondance autour du petit plan d'eau aménagé pour la pêche, plus d'un millier de pieds. 20 juin 2000.

85 - Département de la Vendée➤ *Ceratophyllum submersum*

- Noirmoutier-en-l'île, mare d'eau douce, vers les Douins (2 octobre 2000).

86 - Département de la Vienne

Contributions de Yves BARON (Y.B.), Antoine CHASTENET (A.C.),
Patrick GATIGNOL (P.G.), Alain METAIS (A.M.),
Didier PERROCHE (D.P.), Dominique et Jean PROVOST (D. & J.P.),
S.B.C.O.-86 (découvertes collégiales lors des sorties)

➤ *Achillea ptarmica*

- Mauprévoir, bois de Charroux, 6 juillet 2000, (A.M.).

➤ *Adonis annua* subsp. *annua*

- Migné Auxances, dans un champ déjà moissonné de la zone artisanale ouest. Une petite dizaine de pieds, en fleur, avec *Ammi majus*, 2 août 2000, (D.P.).

➤ *Ammi majus*

- Montcontour, la Grande Machère, grande station avec *Chamomilla recutita*, *Lathyrus tuberosus*, etc, 13 juin 2000, (P.G.).

➤ *Anthericum liliago*

- Sillardards, les Roches, une touffe sur un rocher, 20 mai 2000, (P.G.).

➤ *Anthericum ramosum*

- Bonnes, les Pierres percées, 22 mai 2000, (Y.B.).

➤ *Arctium lappa*

- Chaunay, bord de la Bouleure, quelques pieds, 24 juin 2000, (S.B.C.O.-86).

➤ *Briza minor*

- Béruges, bord est du champ entre forêt de l'Épine et les Grissonnières, nouveauté pour la moitié ouest de la Vienne, 6 octobre 2000, (Y.B.).

➤ *Bunias orientalis*

- Buxerolles, vallée des Buis, quelques pieds dans une friche à *Carduus tenuiflorus* et *Carduus pycnocephalus*, 25 mai 2000, (P.G.).

➤ *Butomus umbellatus*

- Targé, moulin de Mazeray, dans un fossé (signalé par Miguel GAILLED RAT, permanent à Vienne-Nature), 6 avril 2000, (Y.B.).

➤ *Campanula erinus*

- Ligugé, talus de la route de Poitiers en sortie bourg, plus de 100 pieds, avec *Helianthemum salicifolium*, *Chaenorhinum minus*, etc., 12 juin 2000, (Y.B.).

➤ *Carex demissa*

- Béruges, forêt de l'Épine, cuvette humide au nord de Belleroute, 5 octobre 2000, (Y.B.).

➤ *Carex digitata*

- Saint-Germain, vallon des Grands Essarts, 12 pieds avec *Mycelis muralis* et *Lilium martagon*, 25 avril 2000, (Y.B.).

➤ *Carex distans*

- Saires, le Champ de Las, avec *Epipactis palustris*, *Juncus obtusiflorus*, *Tussilago farfara*, 5 septembre 2000, (Y.B.).

➤ *Carex lepidocarpa*

- Smarves, petit marais de Fontputet où se maintiennent pour l'instant *Epipactis*

palustris (8 hampes) et *Gentiana pneumonanthe* (1 seule hampe !) signalés en 1977 (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 9 : 286), alors que 700 m en amont, le marais du Clos des Roches, découvert en 1991, visité en 1994 (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 26 : 335), a été converti en espace vert par son nouveau propriétaire, avec élimination de sa moliniaie neutrophile, de son importante population de *Gentiana pneumonanthe*, de ses *Orchis incarnata*, *sesquipedalis* et *laxiflora* subsp. *palustris* (seule station retrouvée dans la Vienne), 17 août 2000, (Y.B.).

- *Carex pallescens*
 - Lussac-les-Châteaux, vallon de Chantegros, 14 mai 2000, (Y.B.).
- *Carex paniculata*
 - Surin, bord de la Dive, 21 juin 2000, (A.M.).
- *Carex pendula*
 - Saint-Pierre-de-Maillé, vallon de Pérajoux, 1 pied, 6 avril 2000, (Y.B.).
 - Aslonnes, vallon de Fontjoise, une touffe, 14 août 2000, (Y.B.).
- *Carex pseudocyperus*
 - Surin, bord de la Dive, 21 juin 2000, (A.M.).
- *Caucalis platycarpus*
 - Saint-Jouin-de-Marnes, Vallée Rouget, très abondant le long d'une moisson, 3 juin 2000, (P.G.).
- *Centaurea cyaneus*
 - Vouzailles, en lisière d'un champ sur une butte marneuse. Se rencontre encore régulièrement autour de Vouzailles et de Champigny-le-Sec, 3 août 2000, (D.P.).
- *Chamaespartium sagittale*
 - Lavoux, Taillis Joseph, 22 mai 2000, (Y.B.).
- *Cicendia filiformis*
 - Saint-Martin-l'Ars, bord de l'étang des Maisons Neuves avec *Radiola linoides*, 6 juillet 2000, (A.M.).
- *Consolida ajacis*
 - Le Rochereau, 7 pieds en fleur, tous bleus sauf un rose, dans un champ abandonné situé près de l'église, et envahi par *Daucus carota*, *Cichorium intybus*, *Odontites verna* subsp. *serotina*, etc., 4 août 2000, (D.P.).
- *Coriandrum sativum*
 - Ligugé, Le Granit, importante colonie dans une jachère, 25 mai 2000, (Y.B.).
- *Corydalis lutea*
 - Nouaillé-Maupertuis, toujours sur les murs de l'Abbaye, 12 juin 2000, (A.C.).
- *Corydalis solida*
 - Saint-Pierre-de-Maillé, entrée du vallon de Foussac, 4 pieds, 6 avril 2000, (Y.B.).
 - Availles-Limouzine, coteau de Vaireilles, en tapis, 4 mars 2000, (S.B.C.O. 86).
 - Millac, coteaux de Chalais, en tapis, 17 mars 2000, (Y.B.).
- *Cucubalus baccifer*
 - Vouneuil-sous-Biard, plaine aux Genêts, haie de la D3, abondant, 7 août 2000, (Y.B.).
- *Cyperus longus*
 - Migné-Auxances, bord de l'Auxance, belle station pour cette espèce devenue assez rare, 26 août 2000, (P.G.).
- *Daphne laureola*
 - Bignoux, route de Poitiers, 20 janvier 2000, (Y.B.).
- *Digitalis lutea*
 - Angles-sur-l'Anglin, Roc-à-Midi, près de la station de Doronic, 15 mars 2000, (Y.B.).
- *Elodea nuttallii* (?)
 - Saint-Benoît, l'Ermitage, frayère à brochet au bord du Clain, dont elle occupe tout le volume bien qu'installée depuis peu, été 2000, (Y.B.).

- *Epipactis microphylla*
 - Bonnes, les Pierres percées, 22 mai 2000, (Y.B.).
- *Epipactis palustris*
 - Montreuil-Bornin, Moulin au roi, près de l'étang (1 pied signalé par Michel BRAMARD), 6 juillet 2000, (Y.B.).
 - Saires, le Champ des Las, bord de l'ancienne voie ferrée, 129 hampes sur 200 m (signalé par J. et A. METAIS le 21 juin 2000), 5 septembre 2000, (Y.B.).
- *Eragrostis minor*
 - Civray, gare de marchandises (M. ROGEON), espèce peu courante dans la région, relevée cependant à Poitiers (cimetière de Chilvert, 23 juillet 1989 et, vers 1960, dans les jardins de la Station biologique de Beau-Site), 20 août 2000, (Y.B.).
- *Erigeron acer*
 - Maulay, Clairville, ancienne voie ferrée avec *Odontites jaubertiana*, 5 septembre 2000, (Y.B.).
- *Fagus sylvatica*
 - Lussac-les-Châteaux, vallon de Chantegros, 14 mai 2000, (Y.B.).
- *Galium glaucum*
 - Saint-Jouin-de-Marnes, vallée de la Saute aux Chiens et Vallée Rouget, stations anciennes (29 juin 1984 et 23 juin 1985, (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **16** : 140 et **17** : 352) mais non revues depuis longtemps, 3 juin 2000, (P. G.).
- *Geranium sylvaticum*
 - Brigueil-le-Chantre, bord de la route de Brigueil, près de Rimord, 3 touffes, 4^{ème} station de la Vienne, toutes à Brigueil ou Thollet, cf. compte rendu de la sortie du 20 mai 2000, (Y.B.).
- *Gladiolus illyricus*
 - Montmorillon, landes de Sainte-Marie, abondant (signalé par Th. ANTON), 23 juin 2000, (Y.B.).
- *Gratiola officinalis*
 - Lussac-les-Châteaux, étang de la Crouzette, belle population menacée par le piétinement, 31 août 2000, (P.G.).
 - Payroux, étang des Patureaux, 6 juillet 2000, (A.M.).
 - Usson-du-Poitou, étang de la Cotterie, 18 juin 2000, (A.M.).
- *Gymnadenia conopsea*
 - Mazeuil, coteaux de Naumont, au sud de la D. 725, un millier de hampes, parmi lesquelles quelques formes à éperon court, peut-être hybrides de *G. odoratissima*, introuvable dans la région ces dernières années. Le *G. conopsea* est abondant aussi dans la partie nord du coteau, ainsi que *Coeloglossum viride* (environ 50 hampes), *Aceras anthrophorum*, *Anacamptis pyramidalis*, divers *Ophrys*, etc...Coteau visité déjà le 31 mai 81 (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **13** : 81-84) et, récemment, par J. METAIS, 20 juin 2000, (Y.B.).
- *Helianthemum salicifolium*
 - Ligugé, talus de la route de Poitiers, en sortie du bourg (Chantegrelet), environ 500 pieds, avec *Campanula erinus*, *Chaenorhinum minus*, etc., 12 juin 2000, (Y.B.).
- *Hieracium laevigatum*
 - Saint-Léomer, lisière du camp militaire, quelques pieds de cette espèce peu citée et dont la répartition et la fréquence sont peu connues, 31 août 2000, (P.G.).
- *Hottonia palustris*
 - Monts-sur-Guesnes, étang de Maison Neuve, en forêt de Scévolles, 21 octobre 2000, (Y.B.).

- *Impatiens noli-tangere*
 - Mairé, bord de la Creuse à la Petite Guerche, quelques pieds bien fleuris le long d'un chemin, 23 septembre 2000, (P.G.), (D. & J.P.).
- *Inula montana*
 - Bonnes, les Pierres percées, avec *Anthericum ramosum*, 22 mai 2000, (Y.B.).
- *Juncus heterophyllus*
 - Bourg-Archambault, étang de la Loge, une petite station à une extrémité de l'étang, 31 août 2000, (P.G.).
- *Lathraea squamaria*
 - Saint-Saviol, bas du coteau à l'est de Pont-Bridé, 88 hampes, 9 mars 2000, (Y.B.).
 - Béruges, coteau de Vauvinard, une trentaine de hampes, 28 mars 2000, (Y.B.).
- *Lathyrus sphaericus*
 - Frontenay-sur-Dive, Puy de Mouron, avec *Xeranthemum cylindraceum*, *Aceras anthropophorum*, *Anacamptis pyramidalis* (plus d'une centaine de hampes chacune), *Coeloglossum viride* et autres orchidées, 23 mai 2000, (Y.B.).
- *Legousia speculum-veneris*
 - Champigny-le-Sec, observé en deux points. Se rencontre encore régulièrement autour de Champigny-le-Sec et du Rochereau, début août 2000, (D.P.).
- *Lilium martagon*
 - Persac, coteau de Rosières, 65 pieds comptés (la station n'avait pas été retrouvée lors de la sortie du 25 juin 1995, *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **27** : 285), 25 avril 2000, (Y.B.).
 - Saint-Germain, vallon des Grands Essarts, une deuxième tache en bas de vallon (150 pousses, dont une douzaine de hampes), la première, en haut du vallon, signalée le 5 avril 1981 (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **13** : 52), ayant plus de 200 pousses, dont une vingtaine en fleurs, et quelques jeunes, 25 avril 2000, (Y.B.).
 - Journet, bois de Maviaux, 3 colonies d'une cinquantaine de pousses, dont une au bas du versant sud du vallon du ruisseau temporaire affluent, non signalée le 30 avril 1979 (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **10** : 258), 2 mai 2000, (Y.B.).
- *Linum strictum* subsp. *corymbulosum*
 - La Prouterie à La Chapelle-Montreuil, 1^{ère} mention récente de cette sous-espèce pour la Vienne (connue encore de A. BARBIER à Saint-Benoît), avec *Ranunculus paludosus*, *Sedum rubens*, *Stachys alpina* et *Trifolium striatum*, 1^{er} juin 2000, (A.C.).
- *Lythrum portula*
 - Chapelle-Montreuil, mare de la Vignette, 9 juillet 2000, (A.M.).
- *Malva alcea*
 - Monts-sur-Guesnes, bord de la Briande, au nord de Beaumont, 21 octobre 2000, (Y.B.).
- *Minuartia hybrida* subsp. *hybrida*
 - Lussac-les-Châteaux, à la Barbotterie, sous-espèce caractérisée par la présence de nombreux poils glanduleux sur toute l'inflorescence. A rechercher ailleurs car il semble que ce soit la sous-espèce *tenuifolia* (L.) Kerguelén la plus fréquente, 14 mai 2000, (P.G.).
- *Misopates orontium*
 - Jazeneuil, le Grand Pâtis, 11 août 2000, (Y.B.).
- *Mycelis muralis*
 - Saint-Germain, vallon des Grands Essarts, 25 avril 2000, (Y.B.).
- *Myosoton aquaticum*
 - Biard, la Boivre, étang de la Cassette, 17 juillet 2000, (A.M.).

- *Nasturtium microphyllum*
 - Brigueil-le-Chantre, espèce bien caractérisée par ses graines qui présentent un réseau de mailles très serrées, 20 mai 2000, (P.G.).
- *Nigella arvensis* subsp. *arvensis*
 - Migné-Auxances, plusieurs dizaines de pieds parfaitement fleuris sur les marges d'un champ déjà moissonné de la Zone Artisanale Ouest. Première observation personnelle pour cette espèce aujourd'hui devenue très rare, signalée dans ce secteur il y a 13 ans (Y. BARON, *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **19** : 157 - un seul pied), pour la dernière fois en Poitou-Charentes. C'est dans un autre champ de ce même secteur qu'a été observé *Adonis annua* subsp. *annua*. Les messicoles font partie des plantes les plus menacées d'Europe occidentale. *Nigella arvensis* figure dans le Tome 1 - espèces prioritaires - du livre rouge de la flore menacée de France. 2 août 2000, (D.P.).
- *Nigella damascena*
 - Champigny-le-Sec, au pied d'un poteau électrique ce qui lui a valu d'être épargné par la fauche, au bord d'un chemin longeant le ruisseau "le Baigne-Chat". Petite population de moins de dix pieds pour cette espèce échappée de culture (contrairement à la précédente), et relevée çà et là dans les moissons près des habitations, 4 juin 2000, (D.P.).
- *Odontites jaubertiana*
 - Maulay, Clarville, et Monts-sur-Guesnes, les Cosses de Raguteau, ancienne voie ferrée, 5 septembre 2000, (Y.B.).
 - Aslonnes, les Teilles, 2 septembre 2000, (Y.B.).
- *Oenanthe fluviatilis*
 - Montreuil-Bonnin, au Moulin du Roi, en belles touffes submergées dans la Boivre. Cette espèce, le plus souvent stérile, n'était pas encore signalée dans la région, mais est à rechercher, 6 juillet 2000, (Y.B.).
- *Ophioglossum vulgatum*
 - Béruges, à Ferrière, station de plus de 100 individus, 2 avril 2000, (A.C.).
- *Ophrys argensonensis* Mathé et Guérin
 - Nouaillé-Maupertuis, Champ de Bataille, nouvelle station pour cette orchidée décrite récemment (cf. *L'Orchidophile* **133**), 12 juin 2000, (A.C.).
- *Orchis simia*
 - Ternay, bois de Ternay, plusieurs centaines de pieds signalés par Joël METAIS le long de la route, 15 mai 2000, (A.M.).
 - Roches-Prémarie, 1 pied sur la berme de la D. 142, à l'ouest du Bois du Moine, 8 mai 2000, (Y.B.).
- *Orchis simia* × *Orchis purpurea*
 - Ternay, bois de Ternay, quelques dizaines de pieds signalés par Joël METAIS, 15 mai 2000, (A.M.).
- *Ornithopus compressus*
 - Monts-sur-Guesnes, Maison Neuve, 21 octobre 2000, (Y.B.).
- *Orobanche reticulata*
 - La Grimaudière, vallée sèche des Voyes, nombreux pieds sur *Carduus nutans*. Cette espèce caractérisée par des glandes pourpres sur la corolle constitue une nouvelle citation pour la région, 27 mai 2000, (P.G.).
- *Papaver argemone*
 - Orches, Le Vivier, avec *Spergula pentandra*, *Spergularia segetalis*, *Filago minima*==
Vicia lathyroides, 30 avril 2000, (A.C.).
 - Champigny-le-Sec, dans le jardin de mes parents où il est présent à l'état spontané, mais où il ne se manifeste pas tous les ans. Réapparu en force cette année,

après une éclipse de trois ans. Je n'ai pas revu la plante dans les deux autres stations de la Commune où je la connaissais. L'espèce est à rechercher dans ce secteur, de préférence le matin car elle se fane vers midi, et n'est plus repérable que par ses capsules l'après-midi, 1^{er} juin 2000, (D.P.).

➤ *Populus alba*

- Sérigny, le Ris ; le Bouchet, la Pierre Levée, l'espèce semble répandue en Loudunais, comme en val de Loire, mais paraît manquer dans le reste de la Vienne, 15 septembre 2000, (Y.B.).

➤ *Potamogeton gramineus*

- Usson-du-Poitou, étang de la Cotterie, avec *Potamogeton lucens* 18 juin, 15 août 2000 (A.M.).

➤ *Potamogeton trichoides*

- La Ferrière-Airoux, mare des Effes, 8 juin 2000, (A.M.).

➤ *Potamogeton crispus*

- Chapelle-Montreuil, mare de la Vignette, 9 juillet 2000, (A.M.).

➤ *Ranunculus hederaceus*

- Brigueuil-le-Chantre, étang de la Planchille, une petite tache, première mention pour la Vienne, cf. CR sortie du 20 mai 2000, (Y.B.).

➤ *Ranunculus ophioglossifolius*

- Pleumartin, petit étang au nord de Languillé, 1 seul pied signalé par Stéphanie PHILIPPE, nouveauté pour la Vienne, 1^{er} mai 2000, (Y.B.).

➤ *Ranunculus paludosus*

- Béruges, bois de Saint-Laurent, 23 avril 2000, (A.C.).

➤ *Ranunculus sceleratus*

- Monts-sur-Guesnes, étang de Maison-neuve, en forêt de Scevolles, 21 octobre 2000, (Y.B.).

➤ *Rapistrum rugosum* subsp. *orientale*

- Buxerolles, vallée des Buis, au même endroit que *Bunias*, très grande population découverte par Fabien ZUNINO, 23 mai 2000, (P.G.).

➤ *Rhamnus alaternus*

- Château-Larcher, coteau boisé à l'est du bourg, 15 septembre 2000, (Y.B.).

➤ *Rosa rubiginosa*

- La Grimaudière, vallée sèche des Voyes, quelques buissons avec *Sanguisorba minor* subsp. *muricata*, *Vicia tenuissima*, etc., 27 mai 2000, (P.G.).

➤ *Salix repens*

- Orches, ancienne sablière aux Lacs Communaux (massif de Sérigny), 3 belles touffes, déjà signalées le 18 mai 1985 (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **17** : 148), jouxtant un tapis de *Sphagnum inundatum* (déterminé par M. ROGEON), nouveauté pour le Loudunais, (Y.B.).

➤ *Scilla bifolia*

- Availles-Limouzine, coteau de Vareilles, en tapis sur des hectares, 4 mars 2000, (S.B.C.O.-86).

- Millac, vallon de Puits-Tourlet (signalée par J.-P. RING), 7 mars 2000, (Y.B.).

- Millac, coteau de Chalais, déjà connue au bord du lac de la Roche (18 avril 1979), mais très abondante à l'intérieur, 17 mars 2000, (Y.B.).

➤ *Scilla verna*

- Fontaine-le-Comte, le Chêne blanc, abondant au bord de la route, 18 avril 2000, (Y.B.).

➤ *Scirpus sylvaticus*

- Lussac-les-Châteaux, vallon de Chantegros, 14 mai 2000, (Y.B.).

- Brigueil-le-Chantre, berges de l'Asse, cf. compte rendu dans ce bulletin de la sortie du 20 mai 2000, (Y.B.).
- *Sedum telephium* subsp. *fabaria*
- Moussac, vallée de la Blourde au Pont de Kiel, une touffe de cette espèce qui constitue la deuxième mention récente (avec Brigueil-le-Chantre) pour le département, 14 mai 2000, (P.G.).
- *Sison amomum*
- Civaux, la Font-Tignoux, 17 juin 2000, (Y.B.).
- *Smyrniolum olusatrum*
- Brux, berme chez Mercier, 15 avril 2000, (Y.B.).
- *Sorbus latifolia*
- Vellèches, bois de la Crotte d'Ane, 2 pieds, plus un jeune, sur calcaire marneux, 7 juin 2000, (Y.B.).
- Les Trois Moutiers, bois de la Roche-Vernaize, 4 pieds signalés par Vincent AGUILLON dont 2 vus le 5 septembre 2000, (Y.B.).
- Saint-Cassien, le Bois Brûlé, 2 pieds (signalés par Vincent AGUILLON). L'aire de l'espèce dans la Vienne déborde par conséquent largement à l'ouest les communes de Vellèches et Mondion où l'on croyait être confinée cette endémique ouest-européenne, seule espèce d'arbre protégée de notre région. A rechercher méthodiquement, (Y.B.).
- *Spergula pentandra*
- Availles-Limousine, coteau des Grands Moulins, en compagnie de *Ceratocarpus claviculata*, *Coincya monensis* subsp. *recurvata*, 16 mars 2000, (P.G.).
- *Stachys alpina*
- Brux, à l'est du gué de la Touche, 24 juin 2000, (Y.B.).
- Availles-Limousine, coteau de Vareilles, 4 mars 2000, (S.B.C.O.-86).
- Saint-Saviol, coteau à l'est de Pont-Bridé, 9 mars 2000, (Y.B.).
- *Stachys arvensis*
- Saint-Sauvant, aux abords d'une vigne à Pouzeau, belle population pour cette espèce devenue rare avec *Veronica acinifolia*, 10 avril 2000, (P.G.).
- Dissay, bord de culture au pied du coteau des Pendants, 1 pied, 4^{ème} mention régionale, avec *Teucrium botrys* et *Cynoglossum officinale*, 25 juin 1999, (Y.B.).
- *Stellaria uliginosa*
- Lathus, pied du coteau de la Barlotière, 20 mai 2000, (Y.B.).
- *Stellaria pallida*
- Lussac-les-Châteaux, la Barbotterie, plusieurs touffes de cette espèce qui affectionne les sols sablonneux et semble nouvelle pour le département de la Vienne, 31 mars 2000, (P.G.).
- *Tanacetum vulgare*
- Béruges, Jean Moulin, espèce sûrement subspontanée, 2 avril 2000, (A.C.).
- *Teucrium scordium*
- Usson-du-Poitou, étang de la Cotterie, 15 août 2000, (A.M.).
- *Thelypteris palustris*
- La Grimaudière, en bordure de la Dive, 21 juin 2000, (A.M.).
- Vouneuil-sous-Biard, marais de la Queue du Renard, près du viaduc de l'A. 10, dans une petite dépression de la mégaphorbiaie, 6 juillet 2000, (Y.B.).
- *Torilis arvensis* subsp. *purpurea* var. *heterophylla* (Guss.) Jury
- La Grimaudière, motte de Puy-Taillé, quelques pieds de cette espèce peu fréquente, 6 mai 2000, (P.G.).

➤ *Tulipa sylvestris*

- Targé, les Petites Maisons, sur le talus de la D. 131, à l'ouest du bourg, une centaine de pieds, 36 fleurs. Après la destruction par labourage de la station occupant le champ, la colonie survivant en lisière de cette espèce protégée se maintient bien, 6 avril 2000, (Y.B.).

➤ *Ulmus glabra*

- Brigueil-le-Chantre, au bord de la prairie au sud du bourg, 20 mai 2000, (S.B.C.O.-86).

➤ *Utricularia australis*

- Guesnes, étang près du Taillis aux Gaultiers, 5 septembre 2000, (Y.B.).
- Monts-sur-Guesnes, petit étang à l'est de l'étang de Maison Neuve, espèce à préciser ici l'été prochain, le milieu confinant à la tourbière neutre, (cf. *Epipactis palustris* au marais de la Fondeire tout proche dans Contribution à l'inventaire, (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 24 : 352), 21 octobre 2000, (Y.B.).

➤ *Vicia lutea*

- Vouneuil-sous-Biard, la Fosse aux Cannes, 17 juin 2000, (A.C.).

➤ *Viola alba* subsp. *dehrhardtii*

- Château-Larcher, Camp Alaric, assez abondant dans le chemin en bas du coteau, 9 mars 2000, (P.G.).

➤ *Viola suavis* subsp. *catalaunica* W. Becker

- Lussac-les-Châteaux, forêt et étang, nouvelle citation pour la région. Cette espèce est caractérisée par un éperon aigu violacé. (Détermination : M ESPEUT), 16 mars 2000, (P.G.).

91 - Département de l'Essonne

Contribution de Didier PERROCHE

➤ *Bombycilaena erecta*

- Boutigny-sur-Essonne, dans une ancienne carrière vers "les Greffières", au nord de la Vallée Saint-Jacques, 17 juin 2000, (D.P.).