

Espèces intéressantes observées dans le département de la Corrèze au cours de l'année 2002

par Luc BRUNERYE *
avec la collaboration de J.-C. FELZINES

Cette note comporte deux parties. Dans la première les espèces rencontrées au cours des herborisations sont citées par ordre alphabétique. La seconde concerne quelques sites particulièrement riches ou originaux. La nomenclature utilisée est celle de « *Plantes et Végétation en Limousin, Atlas de la flore vasculaire* », avec en synonymie, si nécessaire, celle de *Flora Europaea*.

Première partie

- *Adoxa moschatellina*
 - Goulles (07-05-2002), gorges de la Cère au sud de Teulet.
 - Courteix (07-08-2002), vallée de la Mazonne, taillis dense à Coudrier et Lamier jaune, alt. 730 m.
- *Allium ericetorum*
 - Noailles (26-03-2002), flanc nord de la vallée de la Couze au sud de Mas-del-Bos, talus de grès. Feuilles et hampes sèches, confirmé en culture. Les stations déjà connues du sud de la Corrèze étaient sur serpentinite (Xaintrie), ou sur marne (Cosnac).
- *Althaea officinalis*
 - Ayen (24-06-2002), Graschamp, deux stations.
- *Amaranthus cruentus* (*A. patulus*)
 - Végennes (09-09-2002), la Borderie, localisé.
- *Arabis turrita*
 - Saint-Julien près Bort (30-04-2002), site de Saint-Nazaire, coteau rocailleux à *Festuca arvernensis*, rare.
- *Arenaria leptoclados* (*A. serpyllifolia* subsp. *leptoclados*)
 - Queyssac-les-Vignes (12-06-2002), talus de route près de la Picaïoune.
 - Billhac (18-06-2002), muret, sortie nord du bourg.
- *Artemisia verlotiorum*
 - Saint-Merd-les-Oussines (01-08-2002), terrain vague au pont de Marcy, alt. 800 m.

* L. B. : le Bourg, 19500 MEYSSAC.

➤ *Avena sterilis* L.

- Bilhac (18-06-2002), talus et bord de route entre le bourg et Puymyerle.
- Ayen (24-06-2002), village de Graschamp.
- Collonges (14-08-2002), bord de route au Puy-de-Vézy.
- Ligneyrac (14-08-2002), bord de champ de maïs près du Château de la Rue.

Espèce indiquée par RUPIN (1884) « dans les champs cultivés A.R. », non signalée depuis, à rechercher parmi les avoines en bord de route dans tout le Bassin de Brive. La nomenclature selon Flora Europaea serait *A. sterilis* subsp. *ludoviciana*, et selon P. JAUZEIN (1995) *A. sativa* subsp. *sterilis*.

➤ *Avena strigosa* subsp. *strigosa*

- Ménoire (27-06-2002), vallon à l'est de la Roderie, dans un champ d'avoine, rare.

LE GENDRE, dans le second volume de son Catalogue (1922), écrit « espèce communément cultivée dans les montagnes granitiques ». Cette culture a été complètement abandonnée et aucune observation de cette espèce, devenue très rare, n'a été signalée depuis 1960.

➤ *Avenula pubescens*

- Estivals (16-05-2002), très abondant dans les prairies à la sortie est du bourg. Anciennement signalé sur les calcaires du Bassin de Brive, mais non cité depuis 1960.

➤ *Biscutella laevigata* subsp. *laevigata*

- Estivals (16-05-2002), talus rocailleux en bordure de chemins sur le causse, à la limite du Lot, près du Moulin de Gignac. Plusieurs stations voisines.

➤ *Brassica nigra*

- Ayen (24-06-2002), village de Graschamp.

➤ *Bromus catharticus* (= *Bromus willdenowii*)

- Altillac (20-06-2002), bord de la route longeant la Dordogne, face à Beaulieu.
- Végennes (09-09-2002), bord de route, près de la Borderie.

Semble en expansion rapide dans l'extrême sud de la Corrèze, à suivre.

➤ *Bromus ramosus*

- Saint-Robert (24-06-2002), vallon au sud des Bernardoux, taillis marécageux sur grès permien.

Espèce rare en Corrèze en dehors des calcaires du Bassin de Brive.

➤ *Bromus secalinus*

- Altillac (20-06-2002), bord de champ de blé, au nord du bourg.

➤ *Capsella rubella*

- Segonzac (11-05-2002), Puy de Segonzac, reposoir à bétail, forte population.
- Altillac (20-06-2002), bord de route au nord-ouest du bourg.

➤ *Cardamine palustris* (*C. pratensis* subsp. *dentata*)

- Saint-Julien-Maumont (15-04-2002), fossé de la route près du cimetière (J.-C. FELZINES). Espèce méconnue souvent considérée comme sous-espèce de *Cardamine pratensis*.

➤ *Carex nigra*, forme en touradons.

- Saint-Merd-les-Oussines (01-08-2002), Grand-Billoux, tourbière de la Grande Roubière, alt. 815 m.

J'ai déjà signalé à Bonnefond (BRUNERYE 1990) cette forme très robuste et constituant des populations très denses éliminant les autres espèces, en l'attribuant à la subsp. *juncella* Fries, ce qui est douteux. Le statut exact reste à déterminer.

- *Corrigiola littoralis*
 - Saint-Julien-le-Vendômois (16-07-2002), vallée de la Boucheuse, bord de champ de maïs.
- *Dianthus carthusianorum*
 - Chanac-les-Mines (04-01-2002), coteau au nord-ouest de Lachèze, rare. Déséché mais bien déterminable.
- *Dipsacus pilosus*
 - Altilac (20-06-2002), taillis au bord de la Dordogne, face à Beaulieu.
- *Drosera intermedia*
 - Courteix (07-08-2002), pacage tourbeux en bordure de la forêt de Mirambel, rare, avec *Drosera rotundifolia*, plus abondant. Espèce très rare dans le nord-est de la Corrèze.
- *Eleocharis palustris*
 - Estivals (16-05-2002), bord de mare sur le causse, au sud du bourg.
- *Epilobium angustifolium*
 - Puy-d'Arnac (01-07-2002), carrefour de la route D 38 et de la route des Fardines, un seul individu (J.-C. FELZINES). Espèce exceptionnelle dans le bassin de Brive.
- *Euphorbia angulata*
 - Beynat (27-06-2002), deux stations sur talus de chemin dans le bois de Masdel-Bos.
- *Euphorbia stricta* (= *E. serrulata*)
 - Bilhac (18-06-2002), bord de route entre le bourg et Puymyerle.
 - Louignac (24-06-2002), talus de route entre l'Elle et la Chassagne, rare.
- *Fragaria moschata*
 - Orgnac-sur-Vézère (25-04-2002), localement abondant près des ruines du Bois-de-Gallet, probablement subspontané.
 - Margerides (30-04-2002), gorges de la Diège en amont du pont de Rotabourg, localisé près d'une ruine, probablement subspontané.
- *Fraxinus ornus*
 - Meysnac (21-04-2002), le Monteil, localement abondant dans une haie, subspontané.
- *Galium lucidum*
 - Chasteaux (22-06-2002 et 18-09-2002).
 - Ayen (24-06-2002).

Ce *Galium* du groupe *mollugo* n'est probablement pas rare sur les coteaux calcaires du bassin de Brive, mais généralement non distingué de *Galium mollugo* subsp. *mollugo*, plus fréquent.
- *Galium palustre* subsp. *elongatum* (= *G. elongatum*)
 - Uzerche (14-07-2002), bord de la Vézère en amont du Gour-Noir, rare.
 - Saint-Eloy-les-Tuileries (16-07-2002), bord de taillis marécageux, vallée de la Boucheuse.
 - Chasteaux (18-09-2002), aulnaie marécageuse, extrémité sud-est du lac du Causse.
- *Groenlandia densa*
 - Estivals (06-05-2002), mare sur le causse au sud du bourg.

Indiqué comme assez commun dans la Couze (de Noailles à Saint-Cernin-de-Larche) par RUPIN (1884). Ne semble pas avoir été signalé en Corrèze depuis.
- *Heracleum sphondylium* subsp. *sibiricum*
 - La Chapelle-aux-Saints (22-05-2002), abords du bourg.

- Curemonte (24-05-2002), Peyre, bord de pré.
- *Hieracium* gr. *maculatum*
- Orgnac-sur-Vézère (25-04-2002), charmaie au nord du bourg.
- *Hordeum secalinum*
- Louignac (24-06-2002), prairie humide de la vallée de l'Elle.
- *Juncus foliosus* Desf.
- Ménoire (27-06-2002), la Roderie, pacage tourbeux à l'ouest de la route D 940, rare, dans une dépression avec *Juncus bulbosus* abondant.

Espèce méditerranéo-atlantique du groupe *Juncus bufonius*, méconnue mais bien caractérisée ; ne figure, parmi les flores récentes, que dans Flora Europaea et FOURNIER. Nouveau pour le Limousin.

- *Knautia arvernensis*
- Louignac (24-06-2002), vallée de l'Elle à l'est du bourg, sur talus, rare.
- Monestier-Merlines (27-07-2002), vallée du Chavanon, commun.
- Courteix (07-08-2002), talus et bords de routes près du bourg, abondant.

Ces localités indiquent les limites ouest, et nord actuellement connues, en Corrèze, pour cette espèce longtemps confondue avec *Knautia maxima* (= *K. dipsacifolia*). La répartition dans le centre du département est encore mal définie.

- *Lactuca saligna*
- La Chapelle-aux-Saints (22-05-2002), nord-est du bourg, talus calcaire au bord de la route D 15.
- *Leersia oryzoides*
- Uzerche (14-07-2002), bord de la Vézère en amont du Gour-Noir.
- *Lithospermum arvense* (*Buglossoides arvensis*)
- Estivals (16-05-2002), truffière sur le causse, au sud du bourg.
- *Lonicera etrusca*
- Estivals (16-05-2002), haies et bords de bois à l'est et sud-est du bourg.

Le récent Atlas de la flore du Limousin indique « station méritant vérification ». L'espèce est réellement présente et abondante sur cette localité, à la limite nord-ouest de son aire.

- *Lonicera japonica*
- Voutezac (25-04-2002), naturalisé dans un ourlet de chênaie pédonculée, à l'ouest du Saillant.
- *Luronium natans*
- Uzerche (14-07-2002), bord de la Vézère en amont du Gour-Noir, rare dans une anse vaseuse.
- *Medicago polymorpha*
- Estivals (16-05-2002), bord de prairie à l'est du bourg, rare.
- *Myriophyllum spicatum*
- Chasteaux (18-09-2002), sud-est du lac du Causse, peu abondant. Nouveau pour la Corrèze.
- *Odontites vernus* subsp. *vernus*
- Courteix (07-08-2002), vallée de la Mazonne, bord de la route D 91, rare.
- *Oxalis fontana* (= *O. europaea*)
- Uzerche (14-07-2002), chemin près du Gour-Noir.
- Brivezac (17-07-2002), bord de la route de Champeau (J.-C. FELZINES).
- *Phleum pratense* subsp. *serotinum* (= subsp. *bertolonii*)
- Ligneyrac (14-08-2002), friche calcaire au nord du Château de la Rue.

➤ *Polygonum amphibium*

- Saint-Robert (24-06-2002), fossé dans la vallée de l'Elle, forme terrestre.

➤ *Polygonum aviculare* subsp. *depressum* (= *P. arenastrum*)

- Saint-Merd-les-Oussines (01-08-2002), Pont-de-Marcy.

- Collonges (14-08-2002), Puy-deVézy.

- Végennes (09-09-2002), le Breuil.

➤ *Potamogeton trichoides*

- Chasteaux (18-09-2002), rive sud-est du lac du Causse, local et rare.

Seconde localité pour la Corrèze.

➤ *Potentilla anserina*

- Ayen (24-06-2002), Graschamp et vallée de l'Elle.

Cette espèce, très rare en Corrèze, est ici curieusement abondante au bord des petites routes.

➤ *Ranunculus acris* subsp. *friesianus*

- La Chapelle-aux-Saints (22-05-2002), Chauffour-sur-Veil (la Fondial).

- Ayen (24-06-2002), Saint-Robert, Louignac.

➤ *Rorippa islandica*

- Uzerche (14-07-2002), bord de la Vézère en amont du Gour-Noir.

➤ *Rosa corymbifera* (groupe *canina*)

- Chasteaux (22-06-2002), causse au nord de Farges.

➤ *Rubus caesius*

- Branceilles (24-05-2002), vallée du Maumont, commun.

➤ *Sagina subulata*

- Beynat (27-06-2002), chemin au bord d'une coupe dans le bois de Mas-del-Bos.

➤ *Salix fragilis*

- Saint-Robert (24-06-2002), vallon au sud des Bernardoux, deux individus dans un taillis marécageux.

➤ *Sambucus racemosa*

- Lagraulière (14-04-2002, sortie S.B.C.O.), coupe dans la forêt de Blanchefort, alt. 400 m.

➤ *Scleranthus perennis*

- Le Lonzac (12-04-2002), affleurement de serpentinite du Plantadis, rare.

➤ *Sedum anglicum*

- Courteix, (07-08-2002), muret près de l'église, rare. Localité à la limite orientale de l'aire de l'espèce.

➤ *Sison amomum*

- Saillac (14-08-2002), talus-ourlet près des Quatre-Croix, rare.

➤ *Spiraea japonica*

- Orgnac-sur-Vézère (25-04-2002), taillis du bord de la Loyre entre le Moulin de Mialet et le Bois-de-Gallet, plusieurs populations bien naturalisées.

Nouveau pour la Corrèze.

➤ *Stellaria neglecta*

- Gouilles (07-05-2002), gorges de la Cère, bois riverain, rare.

- Curemonte (24-05-2002), vallée du Maumont, bord de bois.

- Végennes (09-09-2002), vallée de l'Escadrouillère, fossé, localement abondant.

➤ *Sternbergia lutea*

- Collonges (06-10-2002), en pleine floraison dans un pré à Bernoux (extrême sud de la commune). Spontané ou naturalisé. Nouveau pour la Corrèze.

- *Taraxacum* section *Palustria*
 - Végennes (29-03-2002), base sud du Puy Turlau sur marnes humides, peu abondant.
- *Taraxacum* section *Spectabilia*
 - Noailles (26-03-2002), chemin humide dans la vallée de la Couze, sud-est de Chamdroux.
- *Thlaspi arvense*
 - Perpezac-le-Blanc (24-06-2002), butte d'Ayen, bord de route entre la route D 2 et la Charnie, rare.
- *Tragopogon dubius* subsp. *major*
 - Saint-Julien-près-Bort (30-04-2002), site de Saint-Nazaire, rare.
- *Ulmus minor* subsp. *procera* (= *U. procera*)
 - Rosiers-de-Juillac (11-05-2002), bois rudéral entre Echalat et Lescure.
 - Saillac (14-08-2002), bois au dessus de Combe-Redonde.
- *Valerianella dentata*
 - Louignac (24-06-2002), talus de route entre l'Elle et la Chassagne.
- *Viola reichenbachiana*
 - Lagraulière (14-04-2002, sortie S.B.C.O.), forêt de Blanchefort, vallée du Brezou.
 - Roche-le-Peyroux (30-04-2002), vallée de la Diège au pont de Rotabourg.

Deuxième partie

Sites particuliers.

➤ Groupements marécageux du sud-est du Bassin de Brive. Alt. 125-170 m.

Je regroupe ici quelques localités sur sol hydromorphe non acide, présentant, de ce fait, une végétation rare pour le département.

• Chauffour-sur-Vell (22-05-2002), marais de la Fondial, à la limite du département du Lot.

Salix triandra

Carex riparia

Callitriche obtusangula. Une seule mention précédente concerne cette espèce pour le département : « herb. Chassagne, Ayen, 03/08/1893 » SCHOTSMAN (1967).

• La Chapelle-aux-Saints (22-05-2002), fossés et prés humides de la vallée de la Sourdoire au nord-est du bourg.

Eleocharis palustris

Carex riparia

Carex acuta

Carex vulpina. Il s'agit bien du véritable *C. vulpina*, et non du *C. cuprina* qui se trouve d'ailleurs ici en mélange avec lui. Cette espèce n'avait pas été signalée avec certitude en Limousin.

• Brançailles (24-05-2002), marais dans la vallée du Maumont.

Dactylorhiza incarnata, dans une *Callitriche stagnalis*
phragmitaie à *Carex riparia*, très rare

• Queyssac-les-Vignes (12-06-2002, avec Laurent CHABROL), mare dans un vallon à l'est de la Picaïoune.

Veronica anagallis-aquatica

Callitriche platycarpa (non cité en Corrèze depuis LE GENDRE).

- **Queyssac-les-Vignes** (18-06-2002), prairies humides de la vallée du Palsou.

Callitriche platycarpa

Carex disticha

Eleocharis palustris

Juncus compressus (troisième localité pour la Corrèze)

Carex vulpina (sur indication de Laurent CHABROL)

- **Ayen** (24-06-2002), rebord de la butte vers la Charnie, talus et coteaux calcaires. Alt. 320 m.

Les espèces suivantes sont nouvelles pour la butte d'Ayen prise dans son ensemble.

Arabis hirsuta subsp. *hirsuta*, rare

Koeleria pyramidata, localement abondant,

Galium lucidum

en mélange avec *Festuca marginata*.

Trifolium rubens, localement abondant

Espèce nouvelle pour le Limousin.

- **Segonzac** (11-05-2002), Puy de Segonzac = Butte de Guimont. Alt. 330 m.

Cette butte, de superficie très réduite, est la plus au nord des buttes calcaires du bassin de Brive. Elle ne semble pas avoir été prospectée botaniquement.

Pente marneuse :

Carex distans

Hieracium lactucella

Butte sommitale calcaire (quelques dizaines de m²) :

Argyrolobium zanonii

Cerastium pumilum subsp. *pumilum*

Linum suffruticosum

Fumana procumbens

subsp. *suffruticosum*

- **Uzerche** (16-07-2002), gare S.N.C.F., friches caillouteuses le long des voies de marchandises. Alt. 320 m.

Cerastium semidecandrum, abondant

Chaenorrhinum minus, abondant

Tragus racemosus, localisé ; espèce méridionale, nouvelle pour le Limousin

Herniaria hirsuta, localisé

Euphorbia maculata, localisé

- **Saint-Merd-les-Oussines** (21-08-2002), étang de Bournel. Alt. 865 m.

J'ai visité cet étang actuellement à sec, sur indication de Laurent CHABROL, pour observer les très belles populations de *Drosera intermedia* et de *Lycopodiella inundata*. Cela m'a permis de noter en outre, dans les parties encore recouvertes de quelques centimètres d'eau :

Eleogiton fluitans (= *Scirpus fluitans*)

Ranunculus ololeucos

- **Monestier-Merlines** (27-07-2002).

Une sortie dans la vallée du Chavanon en aval de la Cellette (alt. 620 m.) me conduit à enrichir la riche flore de ce site des espèces suivantes :

Aethusa cynapium subsp. *elata*, rare en bord de chemin

Knautia arvernensis, commun

Agrimonia procera, en ourlet

Lysimachia nummularia, rare, taillis humide près du pont de l'ancien

Galium pumilum, sur talus-ourlet

arrêt de la Cellette.

Et sur les rochers près de la Cellette :

Festuca arvernensis, localement abondant

Sedum telephium

subsp. *maximum*, rare

- **Soursac** (01-07-2002), environs du barrage de l'Aigle. Alt. 280-480 m.

Aux nombreuses espèces intéressantes observées le 26-08-1994 (cf. BRUNERYE 1998), on peut ajouter :

- sur le talus rocheux de la route descendant au barrage

Allium oleraceum *Rhamnus cathartica*
Allium sphaerocephalon

- dans la charmaie, au fond du ravin du ruisseau du Pont-Aubert :

Carex depauperata *Melica nutans*
Carex digitata

► **Gouilles** (07-05-2002), gorges de la Cère. Ait. 380-400m.

Le fond des gorges de la Cère est souvent difficilement accessible. J'ai pu y parvenir en quelques points, au sud du Teulet et d'Escabroux, notant un certain nombre d'espèces qui n'avaient pas encore été signalées dans la partie corrèzienne de ces gorges :

<i>Adoxa moschatellina</i>	<i>Lathraea clandestina</i>
<i>Carex brizoides</i>	<i>Poa chaixii</i>
<i>Chaerophyllum aureum</i>	<i>Ranunculus auricomus</i>
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	<i>Ribes alpinum</i>
<i>Geranium phaeum</i>	<i>Saxifraga granulata</i>
<i>Hesperis matronalis</i>	<i>Stellaria neglecta</i>
<i>Hypericum hirsutum</i>	<i>Symphytum tuberosum</i>
<i>Lamium maculatum</i>	<i>Turritis glabra</i>

ainsi qu'une nouvelle localité de *Saxifraga rotundifolia*, déjà signalé à Camps.

Bibliographie

- BRUGEL, E., BRUNERYE, L., VILKS, A., 2001 - *Plantes et végétation en Limousin ; Atlas de la flore vasculaire*. Saint-Gence, Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin. 863 p.
- BRUNERYE, L., 1990 - Espèces intéressantes observées dans le département de la Corrèze. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, N. S., **21** : 147-163.
- BRUNERYE, L., 1998 - Espèces intéressantes observées dans le département de la Corrèze. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, N. S., **29** : 45-56.
- FOURNIER, P., 1961 - *Les quatre flores de la France*. Lechevalier, Paris : 1 105 p.
- JAUZEIN, P., 1995 - *Flore des champs cultivés*. INRA, Paris : 898 p.
- LE GENDRE, C., 1922 - *Catalogue des plantes du Limousin*. Imprimerie A. Bonptemps, Limoges, II : 410 p.
- RUPIN, E., 1884 - *Catalogue des plantes qui croissent dans le département de la Corrèze*. Extrait du *Bull. Soc. Sci. Hist. Archéol. Corrèze*, **I, II, III, IV, V** : 377 p.
- SCHOTSMAN, D. H., 1967 - *Les Callitriches. Espèces de France et taxa nouveaux d'Europe*. Lechevalier, Paris : 152 p.
- TUTIN, T. G., HEYWOOD, V. H. et col., 1964-1980 - *Flora Europaea*. Cambridge University Press : 5 volumes.