

**Compte rendu de la sortie botanique  
du 16 juin 2002  
au bois de la Boucherie  
et en forêt de Secondigny (Deux-Sèvres)**

Gaëtan ROBERT \*  
et François-Jean ROUSSELOT \*\*

**Herborisation du matin**

Le bois de la Boucherie d'une superficie modeste est une annexe de la forêt domaniale de Secondigny. Il est situé à un kilomètre environ à l'ouest de cette dernière. Il repose sur des roches anciennes (schistes du cambrien) et est orienté nord-sud avec un dénivelé de quarante mètres environ.

Sur les bords du parking, nous notons *Rumex sanguineus* subsp. *viridis* (Sm.) Arcang. et *Oenanthe pimpinelloides*.

Nous suivrons l'allée principale en partant de la route du Beugnon au nord pour rejoindre au sud la partie basse à la cote 192.

La strate arborescente est composée pour les essences feuillues de :

<i>Quercus robur</i> (= <i>Q. pedunculata</i> ) très présent	<i>Castanea sativa</i> abondant
<i>Populus tremula</i>	<i>Prunus avium</i>
<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Corylus avellana</i>
<i>Alnus glutinosa</i>	<i>Carpinus betulus</i>
<i>Frangula alnus</i>	<i>Ilex aquifolium</i>

La partie sud-est du bois est en partie enrésinée, *Abies alba* est très présent avec quelques pieds de *Picea abies* (= *P. excelsa*). Le Douglas (*Pseudotsuga menziesii*) occupe les pentes en compagnie de quelques *Pinus strobus* ou Pin Weymouth.

Les espèces printanières sont déflouries mais néanmoins très présentes :

<i>Anemone nemorosa</i>	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>
<i>Primula vulgaris</i> quelques pieds, mais plante fréquente en Gâtine	<i>Viola reichenbachiana</i>
<i>Asphodelus albus</i> en partie basse du bois	<i>Allium ursinum</i> quelques pieds

\* G. R. : 28 rue du Grand-Puits, 79180 CHAURAY.

\*\* F.-J. R. : La Pommeraie, 79380 MONTIGNY.

Sur les bords de l'allée principale nous noterons :

<i>Potentilla sterilis</i>	<i>Veronica chamaedrys</i>
<i>Veronica serpyllifolia</i>	<i>Veronica montana</i>
<i>Lysimachia nemorum</i> abondante en stations plus humides	<i>Luzula pilosa</i>
<i>Mercurialis perennis</i> peu commune en Gâtine	<i>Luzula forsteri</i>
<i>Arum italicum</i>	<i>Rumex acetosa</i>
<i>Geum urbanum</i>	<i>Fragaria vesca</i>
<i>Ajuga reptans</i>	<i>Polygonatum multiflorum</i>
<i>Phyteuma spicatum</i>	<i>Lapsana communis</i>
	<i>Silene vulgaris</i>
	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i>

Parmi les sylvatiques :

<i>Stachys sylvatica</i>	<i>Milium effusum</i>
<i>Aquilegia vulgaris</i>	<i>Lathyrus montanus</i>
<i>Melica uniflora</i>	<i>Carex sylvatica</i>

Nous quittons l'allée centrale pour prospecter sur notre droite une petite aulnaie où coule un ruisseau. Cette station est intéressante par ses fougères, certaines peu communes dans le département :

<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	<i>Pteridium aquilinum</i>
<i>Dryopteris filix-mas</i>	<i>Athyrium filix-femina</i>
<i>Dryopteris carthusiana</i>	<i>Dryopteris dilatata</i>
<i>Blechnum spicant</i>	

Mais nous ne verrons pas *Dryopteris* × *deweveri* (J. Jansen) Jansen et Wachter mentionné par Émile CONTRÉ en 1979 et confirmé par Rémy PRELLI.

Nous revenons sur l'allée principale et nous nous dirigeons vers la partie basse du bois plus humide.

<i>Scrophularia nodosa</i>	<i>Stachys officinalis</i>
<i>Epilobium montanum</i>	<i>Brachypodium sylvaticum</i>
<i>Hypericum pulchrum</i>	<i>Hypericum humifusum</i>
<i>Holcus mollis</i> en sous-bois	<i>Poa nemoralis</i> en clairière
<i>Carex pallescens</i>	<i>Stellaria uliginosa</i>
<i>Trifolium dubium</i>	<i>Cynosurus cristatus</i>

Nous notons *Aphanes microcarpa* sur la partie centrale de l'allée entre les passages de roues des véhicules.

Nous arrivons dans une petite clairière au bas de l'allée, c'est une zone humide près du ruisseau de la Rourie. Nous y notons :

<i>Filipendula vulgaris</i>	<i>Juncus effusus</i>
-----------------------------	-----------------------

*Juncus tenuis* et *Euphorbia hyberna*, ces deux dernières abondantes.

Trois pieds d'*Heracleum sphondylium* à fleurs blanc jaunâtre et feuilles supérieures à lobes étroits, blanc grisâtre, tomenteuses en dessous attirent notre attention. Nous pensons à *H. lecoltii* Gren. et Godron mais nous ne sommes pas dans son aire de répartition ?

Nous terminerons la promenade matinale par une brève prospection de la lisière du Bois Pichot tout proche mais non domanial avec trois nouvelles fougères :

*Polypodium interjectum*  
*Polystichum aculeatum*  
*Lychnis flos-cuculi*

*Polystichum setiferum*  
*Veronica beccabunga*

### Herborisation de l'après-midi

Une petite partie seulement des participants se rendra en forêt de Secondigny pour prospector les rives du ruisseau du Gâtineau en partant de la route du Retail. Nous y retrouverons des espèces vues le matin à la Boucherie.

Certaines sont particulièrement abondantes :

*Angelica sylvestris* *Carex pendula*

D'autres le sont moins :

*Helleborus viridis* quelques pieds *Carex remota*  
*Carex pallescens* *Carex vesicaria*  
*Carex demissa* *Stachys officinalis*  
*Stachys sylvatica* *Prunella vulgaris*  
*Silene dioica* *Juncus tenuis*  
*Juncus effusus*

Nous notons encore :

- *Chrysosplenium oppositifolium*, petite station parmi les rochers en bordure de ruisseau ;
- *Lysimachia nemorum* ; la plante est ici très présente comme au Bois de la Boucherie.

Dans une prairie abandonnée nous retrouvons les nitrophiles habituelles des milieux humides :

*Eupatorium cannabinum* *Lythrum salicaria*

Ainsi que :

*Hypericum tetrapterum* *Lychnis flos-cuculi*  
*Lycopus europaeus*

Sur le coteau bordant la rive gauche du ruisseau nous observons une belle futaie de *Quercus petraea*

et en sous-bois :

*Asphodelus albus* *Digitalis purpurea*  
*Teucrium scorodonia* *Luzula pilosa*  
*Hypericum pulchrum* *Allium ursinum*

Entre les rochers bordant le ruisseau :

*Stellaria uliginosa* *Hypericum humifusum*  
*Isopyrum thalictroides*

Dans les zones où le courant est plus lent :

*Ranunculus flammula* *Glyceria fluitans*

Une nouvelle fougère, *Blechnum spicant*, caractéristique des sols de Gâtine et du Bocage est ici remarquable par son abondance.

Parmi les feuillus il faut noter la présence des essences suivantes :

*Alnus glutinosus* *Mespilus germanica*

*Quercus petraea*

*Viburnum opulus*

*Ilex aquifolium*

et *Fraxinus excelsior* (en futaie dans une dépression humide)

*Cytisus scoparius*

*Sorbus torminalis*

*Pyrus cordata*

Une partie du coteau en rive gauche est plantée en conifères (*Pinus strobus*).

Une agréable journée qui nous a permis de voir une partie de la flore particulière de la Gâtine, de retrouver des amis venus parfois de loin et que l'on a toujours plaisir à revoir.