

Liste des taxons notés le mercredi 23 septembre 2026

Etat imprimé le 4 octobre 2026 par Benoît BOCK

Nomenclature: Base de Données Nomenclaturales de la Flore de France (B. BOCK & al.)

Un groupe de 9 participants a fait la boucle de l'étang Neuf. Nous avons longé le ruisseau dans un vallon encore un peu humide malgré la sécheresse. Nous avons d'ailleurs pu trouver de nombreux champignons le long de notre parcours et plus d'une flore assez riche avec quelques espèces rares en Eure-et-Loir, mais plus fréquentes dans la forêt de Rambouillet comme par exemple *Agrimonia procera*. Ci-contre, le groupe, champignons à la main !



mercredi 23 septembre 2026

France - 78 : Gambaiseuil - Boucle de l'étang Neuf

avec : PETIT Alain, MORICE Patrick, QUITARD Fanny, LEVY Dominique, BIGOT Chantal, GOURRET Isabelle, ESTREGUIL Philippe, ESTREGUIL Nathalie & BOCK Benoît



Lichens - Champignons

■ *Amanita excelsa* (Fr.) Bertill. [Amanitaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209246>

■ *Amanita muscaria* (L.: Fr.) Lamarck [Amanitaceae]

Amanite tue-mouche

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209286>

Chapeau d'abord ovoïde puis convexe à étalé, généralement rouge à rouge orangé, de 8 à 20 cm, orné de nombreuses verrues ou flocons blancs provenant du voile général, souvent partiellement lessivés par la pluie. Lames libres, serrées, blanches à légèrement jaunâtres, spores blanches. Pied blanc, assez robuste (environ 10-20 cm), muni d'un large anneau blanc supérieur et se terminant à la base par un bulbe entouré de bourrelets ou plaques de volve. Chair blanche, de saveur douce, sans odeur très marquée.

Toxique, parfois hallucinogène, contenant notamment muscimole et acide iboténique ; l'intoxication est rarement mortelle mais peut provoquer troubles neurologiques, confusion, agitation et nausées. A fait l'objet d'usages rituels ou chamaniques dans certaines cultures nord-asiatiques et alimente de nombreuses représentations symboliques (contes, iconographie du "champignon des sorcières")

■ *Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Link [Amanitaceae]

Amanite phalloïde

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209308>

Principal responsable des accidents mortels en France. Provoque une fois ingéré des hémorragies intracrâniennes et des septicémies voire un arrêt cardiaque jusqu'à deux semaines après l'ingestion.

■ *Amanita rubescens* Pers. [Amanitaceae]

Amanite rougissante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209335>

Comestible à condition de la cuire à plus de 75°C pour détruire les hémolysines, substances toxiques qui détruisent les hématies. Organoleptiquement les avis sont partagés et son goût varierait selon les régions.

■ *Boletus aereus* Bull. [Boletaceae]

Cèpe bronzé

<https://www.google.fr/search?q=Boletus+aereus+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ *Collybia fusipes* (Bull.) Quél. [Marasmiaceae]

Collybie à pied en fuseau

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2214950>

Chapeau de 3 à 9 cm, hémisphérique puis étalé, bosselé ou mamelonné, brun-roux pâle à ocracé, souvent moucheté de tâches plus foncées, hygrophane (variable selon humidité). Lames espacées, épaisses, blanc-rosé puis envahies de rouille à la maturité. Pied très allongé, 8 à 14 cm, en fuseau, tordu et fortement strié longitudinalement, crème en haut, brun-roux ou noir vers la base, souvent radicant (prolongement en pointe dans le sol ou le bois). Chair ferme, blanche, peu putrescible, peu épaisse, à odeur discrète et saveur douce.

Capacité remarquable de survie en périodes de sécheresse : les sporophores paraissent secs mais "ressuscitent" après la pluie, phénomène rare dans les Agaricales. La chair est coriace, peu agréable et la consommation est déconseillée, bien que non toxique, mais la reviviscence favorise le développement bactérien

■ *Desarmillaria tabescens* (Scop.) R.A.Koch & Aime []

Armillaire sans anneau

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208304>

■ *Fomes fomentarius* (L.) Fr. [Polyporaceae]

Polypore amadouvier

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2212282>

On tire de ce champignon l'amadou qui sert à allumer le feu et qui était utilisé dans les briquets à amadou.

■ *Hypomyces chrysospermus* (Bull.) Tul. & C.Tul.

[Hypocreaceae]

hypo = sous, myces = champignon, chryso = doré, spermus = graine

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2203525>

Ascomycètes de la famille des Hypocreacées. Ce champignon est un mycoparasite cosmopolite qui infecte certains Bolets en les recouvrant d'un duvet blanc à orange

■ *Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) S.F.Gray [Russulaceae]

Lactaire délicieux

<https://www.google.fr/search?q=Lactarius+deliciosus+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ *Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray [Boletaceae]

Bolet rude du chêne

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209737>

■ *Lentinus tigrinus* (Bull.) Fr. [Lentinaceae]

Lentin tigré

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2212042>

■ *Paxillus involutus* (Batsch) Fr. [Paxillaceae]

Paxille enroulé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209890>

Chapeau charnu, 4-15 cm, d'abord convexe puis rapidement déprimé en entonnoir, brun ocre à brun roux, parfois olivâtre, souvent un peu visqueux à l'humide, avec marge longtemps nettement enroulée. Lames très serrées, crème à jaune-ocracé puis brun rouille, nettement décourantes et anastomosées (reliées par des veines), facilement détachables du chapeau en les grattant avec l'ongle (caractéristique des boletales). Pied trapu, plutôt court, concolore ou un peu plus clair que le chapeau, se tachant de brun rouille au frottement ; chair épaisse, jaune pâle, brunissant à l'air, à odeur faible et saveur douce ou légèrement acide.

Toxique et parfois mortel, (notamment cru) en particulier à la suite d'ingestions répétées (réactions immuno-hémolytiques graves décrites), même s'il a été longtemps considéré comme comestible dans certaines régions.

■ *Phaeolus schweinitzii* (Fr.) Pat. [Polyporaceae]

Polypore des teinturiers

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2212323>

■ *Piptoporus betulinus* (Bull.) P.Karst. [Fomitopsidaceae]

Polypore du Bouleau

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211796>

Chapeau moyen à large (6 à 25cm), d'abord ovoïde puis étalé, beige à brun clair, à surface lisse et marge épaisse, attaché latéralement au bois. Pores fins, blancs à crème, couvrant toute la face inférieure. Pied absent ou réduit à un court point d'attache latéral. Chair blanche, molle chez le jeune, vite coriace et subéreuse. Odeur acidulée discrète, saveur douce ou acidulée.

Provoque une pourriture brune du bois chez son hôte

■ *Pleurotus ostreatus* (Jacq.) P.Kumm. [Pleurotaceae]

<https://www.google.fr/search?q=Pleurotus+ostreatus+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ *Russula chloroides* (Krombh.) Bres. [Russulaceae]

Russule à lames glauques

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213607>

■ *Russula lepida* Fr. [Russulaceae]

Russule jolie

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213780>

Sporée crème. Chapeau est épais et très ferme, convexe puis étalé et légèrement déprimé, de 4 à 12 cm, rouge vif à rouge carmin se décolorant parfois vers le jaunâtre, avec une cuticule mate, veloutée, non séparable, pouvant se crevasser en plaques laissant apparaître des zones blanchâtres. Les lames sont assez espacées, blanches à crème, parfois à arêtes rosées, et le pied, blanc lavé de rose à rouge par endroits, est typiquement dur et plein, ne s'écrasant pas entre les doigts. La chair blanche, très ferme, dégagerait une odeur fruitée à mentholée et une saveur douce mais mentholée, parfois légèrement amère.

Cassé comme non comestible en raison de sa saveur désagréable malgré l'absence de toxicité grave connue.

■ *Russula sardonia* Fr. [Russulaceae]

Russule sardoine

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213986>

Chapeau violacées à centre plus sombre. Chair piquante, blanche mais rouge sous la cuticule. Lames jaunes (jaunissant parfois après la récolte). Pied violet. Uniquement sous les pins sur sol non calcaire.

Confusion possible : *R. torulosa*, *R. fuscorubra*, *R. fuscorubroides*, *R. cavipes*

■ *Suillellus queletii* (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi

[]

Bolet de Quelet

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209657>

■ *Suillus bovinus* (L.) Roussel [Suillaceae]

Bolet des Bouviers

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209936>

Très médiocre comestible

■ *Suillus luteus* (L.) Roussel [Suillaceae]

Nonnette voilée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209949>

Seul *Suillus* à anneau poussant sous les pins et ayant des pores fins et serrés. Chapeau brun à brun-jaune. Voile blanc sous le chapeau dont les lambeaux sont souvent collés aux pores.

Ce bolet est un bon comestible à consommer avec modération, car comme beaucoup de *Suillus*

il contient un sucre laxatif à une certaine dose et même toxique, voire mortel, à très forte dose. Retirer la cuticule élimine une grande partie de ce sucre. IL concentre aussi particulièrement le césium 137.

■ *Trametes gibbosa* (Pers.) Fr. [Polyporaceae]

Tramète bossue

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2212374>

Chapeau en éventail à demi-circulaire, souvent de 5 à 15-20 cm, épais vers le point d'attache et aminci vers la marge, zoné concentriquement, d'abord blanc à crème puis grisâtre, se couvrant souvent d'algues verdâtres avec l'âge. Face inférieure à pores blancs à crème, nettement allongés radialement, souvent sinueux à presque lamelliformes vers la marge; chair blanche, épaisse, coriace à liégeuse.

Considéré comme non comestible en raison de sa chair très dure et coriace, sans intérêt culinaire.

■ *Xerocomellus chrysenteron* (Bull.) Šutara []

Bolet à chair jaune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209775>

Chapeau, généralement de 3 à 8 cm, brun gris à brun olivâtre, sec et finement velouté, se gerce vite en fines craquelures laissant apparaître par endroits une chair sous-jacente rosée à rougeâtre, caractère typique de l'espèce. Les pores et tubes sont d'abord jaunes puis olivâtres, bleuissant peu ou pas au toucher, et le pied, élancé, jaunâtre, est nettement strié ou tacheté de rouge vineux surtout au milieu, avec une chair jaunâtre ne bleuissant que très faiblement à la coupe.

Comestible de qualité moyenne seulement (chair mince, rapidement vermoulue), ce bolet reste toutefois consommable après bonne cuisson, à condition de l'identifier avec certitude et de trier les vieux spécimens ramollis ou altérés.



Ptéridophytes

■ *Athyrium filix-femina* (L.) Roth [Athyriaceae]

Fougère-femelle commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7466>

■ *Dryopteris borrieri* (Newman) Kinahan [Dryopteridaceae]

Fougère-mâle de Borrier

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7372>

■ *Equisetum arvense* L. [Equisetaceae]

Prêle des champs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7397>

Tiges fertiles non chlorophylliennes vite disparues et des tiges stériles vertes et ramifiées. Le premier article des rameaux est plus long que la gaine correspondante (différence avec *E. palustre*). La section des rameaux est en forme de +

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn subsp. *aquilinum* [Pteridaceae]

Fougère-aigle d'Europe

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7369>

Grande espèce vivace (> 1m) poussant en colonie. Frondes triangulaires développées à partir d'un long rhizome traçant profondément enterré. Se flétrissent en hiver. Quasiment toujours stérile en France. Sores marginaux, recouverts par le bord replié du limbe, celui-ci prolongé en une fausse indusie membraneuse toujours présente.

Utilisée comme litière pour les animaux dans certaines régions (Pays Basque)



Gymnospermes

■ *Pinus sylvestris* L. [Pinaceae]

Pin sylvestre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7288>

Conifère à petits cônes, tronc orange dans le haut et aiguilles courtes et glauques

Les vertus expectorantes, antiseptiques et calmantes des bourgeons sont utilisées en phytothérapie pour traiter les maladies des voies respiratoires telles que rhume, sinusite, laryngite, catarrhes bronchiques, grippe, affections pulmonaires chroniques.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - cône, aiguille, bourgeon, écorce, jeune pousse



Angiospermes Monocotylédones

■ *Agrostis* sp. [Poaceae]

Agrostis

<https://www.google.fr/search?q=Agrostis+sp.+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ *Alisma plantago-aquatica* L. [Alismataceae]

Alisme commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5785>

■ *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [Poaceae]

Brachypode des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6674>

■ *Carex elongata* L. [Cyperaceae]

Carex allongé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5898>

■ *Carex hirta* L. [Cyperaceae]

Carex hérissé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5919>

■ *Carex pendula* Huds. [Cyperaceae]

Carex pleureur

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5958>

■ *Convallaria majalis* L. [Asparagaceae]

Muguet de mai

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6297>

Ses hétérosides et une saponine provoquent des troubles digestifs, mais surtout cardiaques très graves. Même boire l'eau d'un verre ayant servi de vase pour quelques brins peut provoquer la mort !

■ *Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv. [Poaceae]

Borgou pied-de-coq

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9891>

■ *Eleocharis multicaulis* (Sm.) Desv. [Cyperaceae]

Éléocharis multicaule

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6017>

■ *Iris pseudacorus* L. [Iridaceae]

Iris des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6103>

Plante robuste pouvant dépasser 1 m de haut, formant des colonies denses et importantes au bord des eaux, à larges feuilles (15 à 20 mm) glauques et à tiges portant plusieurs fleurs pédonculées d'un jaune vif.

La fleur aurait inspiré le blason des rois de France sous le nom de fleur de Lys (soit en relation avec la rivière Lys, soit par déformation de fleur de Louis porté par le roi Louis VII notamment sur son sceau).

■ *Juncus tenuis* Willd. [Juncaceae]

Jonc ténu

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6162>

Espèce américaine pacifico-atlantique introduite en Europe à la suite vraisemblablement d'un mélange de ses graines au lest des navires vers 1820 et en France depuis plusieurs années avant 1885.

■ *Molinia caerulea* (L.) Moench subsp. *caerulea* [Poaceae]

Molinie bleue

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12705>

■ *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. [Poaceae]

Roseau commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7063>

■ *Potamogeton polygonifolius* Pourr. [Potamogetonaceae]

Potamot à feuilles de renouée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7237>

■ *Scirpus sylvaticus* L. [Cyperaceae]

Scirpe des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6061>



Angiospermes Dicotylédones

■ *Acer campestre* L. [Sapindaceae]

Érable champêtre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8522>

Arbuste en général peu élevé (moins de 5 m, sauf exception), à feuilles de taille moyenne (10 cm max.), à 5 lobes arrondis et profonds et à samares aux ailes disposées en ligne droite.

Vit jusqu'à 200 ans. Parfois, comme les ormes, les rameaux développent parfois une couche de liège. Peut être utilisé comme un bois d'œuvre et comme arbre d'ornement. Mais la faible largeur du tronc rend son bois rare.

■ *Achillea millefolium* L. [Asteraceae]

Achillée millefeuille au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8527>

Composée vivace, odorante, rampante (pouvant former des colonies très denses et étendues), à fleurs blanches ou rosées disposées en corymbe de capitules. Feuilles longues, étroites et finement divisées en lobe de 0,2-0,6 mm, mucronées.

Plante médicinale astringente permettant de stopper les hémorragies. En infusion elle réduit les spasmes digestifs et utérins, et est aussi anti-inflammatoire.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes - thuyone (alpha et bêta), camphre, eucalyptol à surveiller

■ *Achillea ptarmica* L. subsp. *ptarmica* var. *ptarmica* [Asteraceae]

Achillée ptarmique

<https://www.google.fr/search?q=Achillea+ptarmica+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ *Agrimonia procera* Wallr. [Rosaceae]

Aigremoine odorante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4631>

Grande rosacée (jusqu'à 1 m de haut) vivace à tige munie uniquement de poils longs (dans le haut) mêlés de poils glanduleux, à feuilles divisées en folioles séparées à odeur de pomme (glandes jaunes collées à la face inférieure des f.), à fleurs jaunes en longues grappes, et à curieux fruits surmontés de nombreux crochets à son extrémité et à hypanthium plus court que les crochets et sillonné sur au plus la moitié de leur longueur.

■ *Ajuga reptans* L. [Lamiaceae]

Bugle rampante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3519>

Vivace herbacée munie de très longs stolons, feuilles glabres et luisantes, à fleurs, sans casque, d'un bleu intense groupées en grappes courtes au sommet des tiges.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes en floraison

■ *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. [Betulaceae]

Aulne glutineux

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1321>

En symbiose avec un actinomycète du genre Frankia fixateur d'azote atm.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - écorce, feuille, bourgeon de feuille.

■ *Angelica sylvestris* L. [Apiaceae]

Angélique des prés au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8614>

■ *Betula pendula* Roth [Betulaceae]

Bouleau verruqueux au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1325>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, écorce, bourgeon, sève - salicylate de méthyle à surveiller - L'étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'emploi aux personnes souffrant d'allergie aux dérivés salicylés

■ *Bidens tripartita* L. [Asteraceae]

Bident cornuet

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=508>

■ *Calluna vulgaris* (L.) Hull [Ericaceae]

Callune commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2651>

Sous-arbrisseau ligneux à rameaux souvent tortueux, dressés ou prostrés, portant de très petites feuilles persistantes, linéaires et imbriquées en quatre rangs longitudinaux. Fleurs en grappes irrégulières, de couleur rose à violette, en clochettes à quatre lobes, floraison longue de juillet à septembre/octobre. Fructification en capsule globuleuse velue, très discrète.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - tige en floraison. Plante mellifère. En Écosse, les jeunes pousses étaient parfois utilisées, mélangées à l'orge ou au malt, pour aromatiser la bière ("heather ale"), mais cet usage est aujourd'hui très rare et d'ordre folklorique.

■ *Carpinus betulus* L. [Betulaceae]

Charme commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1328>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, bourgeon de feuille

■ *Circaea lutetiana* L. [Onagraceae]

Circée de Paris

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30044>

■ *Cirsium palustre* (L.) Scop. [Asteraceae]

Cirse des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=684>

■ *Corylus avellana* L. var. *avellana* f. *avellana* [Betulaceae]

Noisetier commun sauvage

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=44317>

■ *Erica cinerea* L. [Ericaceae]

Bruyère cendrée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2657>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fleur, sommité fleurie

■ *Erica tetralix* L. [Ericaceae]

Bruyère des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2662>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fleur

■ *Erigeron canadensis* L. [Asteraceae]

Vergette du Canada

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=700>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - jeune feuille. Nord américaine mentionnée pour la première fois en 1655 à Blois.

■ *Eupatorium cannabinum* L. [Asteraceae]

Eupatoire chanvrine au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=786>

Mellifère

■ *Euphorbia amygdaloides* L. subsp. *amygdaloides* [Euphorbiaceae]

Euphorbe des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2682>

■ *Euphrasia stricta* D.Wolff ex J.F.Lehm. [Orobanchaceae]

Euphrase raide

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5343>

Annuelle à fleurs violet pâle de 7-11 mm taché de jaune sur le lèvre inférieure, sans poils glanduleux. Inflorescence assez dense (bractées dépassant les entrenœuds vers le milieu de la grappe), et bractées à dents inférieures moins étalées.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

■ *Fagus sylvatica* L. [Fagaceae]

Hêtre commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30122>

■ *Filipendula ulmaria* var. *denudata* (J.Presl & C.Presl) Maxim. [Rosaceae]

Reine-des-prés Grande dénudée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4741>

Plante herbacée très haute (plus de 1 m), à feuilles divisées en 3 à 5 paires de grandes folioles (6 x 3 cm) et à fleurs blanches, nombreuses, en corymbes amples. Fleurs à odeur de miel peu sucré. Face inférieure des feuilles vertes.

■ *Fragaria vesca* L. [Rosaceae]

Fraisier des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4745>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, fruit

■ *Frangula alnus* Mill. [Rhamnaceae]

Bourdaine commune au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30129>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - écorce - dérivés hydroxyanthracéniques à surveiller - L'étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'emploi aux enfants de moins de 12 ans, aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu'une mention déconseillant l'usage prolongé.

■ *Fraxinus excelsior* L. subsp. *excelsior* var. *excelsior* [Oleaceae]

Frêne élevé de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30618>

Diurétique, hypotensive, antirhumatismal, antilithiasique.

■ *Galium palustre* L. [Rubiaceae]

Gaillet des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5063>

■ *Geum urbanum* L. [Rosaceae]

Benoîte commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4758>

Vivace en touffe à nombreuses racines la rendant difficile à déterrer, à odeur de clou de girofle. Feuilles basales pétiolées, à limbe à 1-3 paires de segments latéraux de taille très inférieure au terminal, indivis et très inégaux. Feuilles caulinaires 4 à 8 de taille très inférieure aux feuilles basales à plusieurs segments de taille différente. Stipules très développées. Inflorescence divariquée à 3-9 fleurs dressées. Calice à 5 sépales rabattus dès la fin de l'anthèse accompagné d'un calicule. Corolle bien épanouie à l'anthèse, à 5 pétales peu ou pas supérieurs aux sépales, jaune citrin. Réceptacle, ovaires et parfois base des styles hérissés de poils non glanduleux de 1-2 mm. Akènes très nombreux (80 à 140) longs de 3-5 mm, à reste de style de 4-6 mm.

La racine séchée a longtemps été utilisée pour ses propriétés, en remplacement du clou de girofle dont elle a d'ailleurs l'odeur. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

■ *Gnaphalium uliginosum* L. [Asteraceae]

Gnaphale des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30147>

■ *Hydrocotyle vulgaris* L. [Araliaceae]

Hydrocotyle commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=197>

- ***Lathyrus linifolius* f. *montanus*** (Bernh.) Bässler [Fabaceae]
Gesse des montagnes commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2951>
- ***Lotus pedunculatus*** Cav. [Fabaceae]
Lotier des fanges
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3004>
- ***Lycopus europaeus*** L. [Lamiaceae]
Lycopée d'Europe
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3576>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes - coumarines, alcaloïdes à surveiller
- ***Lysimachia nummularia*** L. [Primulaceae]
Lysimachie nummulaire
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4349>
- ***Lysimachia vulgaris*** L. [Primulaceae]
Lysimachie commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30227>
- ***Lythrum salicaria*** L. [Lythraceae]
Salicaire commun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3792>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - sommité fleurie
- ***Mentha aquatica*** L. [Lamiaceae]
Menthe aquatique
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3584>
- ***Mentha arvensis*** L. [Lamiaceae]
Menthe des champs
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3586>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, sommité fleurie - pulégone, menthofurane à surveiller
- ***Mentha arvensis*** L. [Lamiaceae]
Menthe des champs
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3586>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, sommité fleurie - pulégone, menthofurane à surveiller
- ***Nuphar lutea*** (L.) Sm. [Nymphaeaceae]
Nuphar jaune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3867>
Médicinal
- ***Oxalis stricta*** L. [Oxalidaceae]
Oxalis des fontaines
<https://www.google.fr/search?q=Oxalis+stricta+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>
Originaire d'Amérique du Nord
- ***Persicaria hydropiper*** (L.) Delarbre [Polygonaceae]
Persicaire poivre-d'eau
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4230>
Annuelle à tige dressée ou couchée, rameuse. Plante à saveur poivrée (la seule de ce genre). Feuilles lancéolées, atténuées aux 2 extrémités à largeur maximum vers la base, à pétiole court. Ochrées presque glabres avec quelques cils de 0,2 à 3 mm au bord. Fleurs verdâtres rarement roses ou blanches en épis grêles, lâches, généralement arqués-pendants. Péricône à 4 divisions, densément ponctué de glandes.
- ***Peucedanum gallicum*** Latourr. [Apiaceae]
Peucedan de France
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=247>
- ***Peucedanum gallicum*** Latourr. [Apiaceae]
Peucedan de France
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=247>
- ***Plantago major*** L. subsp. ***major*** [Plantaginaceae]
Plantain majeur de Linné
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13305>
Espèce toujours reconnaissable à ses très larges feuilles (5 à 10 cm), glabres et pétioles, un peu dentées, souvent cordiformes et à ses inflorescences très longues (pouvant dépasser 10 cm)
- ***Populus tremula*** L. [Salicaceae]
Peuplier tremble
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5131>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - écorce, bourgeon de feuille
- ***Potentilla erecta*** (L.) Rausch. [Rosaceae]
Potentille tormentille
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13466>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - rhizome, racine
- ***Potentilla sterilis*** (L.) Garcke [Rosaceae]
Potentille stérile
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4822>
- ***Prunus spinosa*** L. [Rosaceae]
Prunellier commun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4847>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, feuille, fleur

- ***Quercus robur*** L. [Fagaceae]
Chêne pédonculé
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30308>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - écorce, feuille, bourgeon de feuille, graine
- ***Ranunculus flammula*** L. [Ranunculaceae]
Renoncule flammette
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30311>
Vivace poussant en touffes à tiges ramifiées, à feuilles simples, lancéolées, dentées et à fleurs jaunes, à pétales de 8 mm, en inflorescences diffuses.
- ***Salix cinerea*** L. [Salicaceae]
Saulle cendré
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5149>
- ***Scorzoneroïdes autumnalis*** (L.) Moench [Asteraceae]
Faux-Liondent d'automne
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=999>
- ***Scrophularia nodosa*** L. [Scrophulariaceae]
Scrofolaire noueuse
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5464>
- ***Scutellaria galericulata*** L. [Lamiaceae]
Scutellaire Grande
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3656>
- ***Scutellaria minor*** Huds. [Lamiaceae]
Scutellaire Petite
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3658>
- ***Solanum dulcamara*** L. [Solanaceae]
Morelle douce-amère
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5570>
- ***Sorbus aucuparia*** L. [Rosaceae]
Sorbier des oiseaux
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4986>
Vit jusqu'à 150 ans. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, fleur, fruit
- ***Sorbus torminalis*** (L.) Crantz [Rosaceae]
Alier torminal
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4996>
- ***Succisa pratensis*** Moench [Caprifoliaceae]
Succise des prés
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2624>
- ***Teucrium scorodonia*** L. [Lamiaceae]
Germandrée scorodaine
TEUCRI = sorte de germandrée ; SCOROD = ail
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30402>
- ***Ulex europaeus*** L. [Fabaceae]
Ajonc d'Europe au sens large
ULEX = sort de plante d'Espagne ;
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14869>
- ***Verbena officinalis*** L. [Verbenaceae]
Verveine officinale
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5710>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes
- ***Vicia sepium*** L. [Fabaceae]
Vesce des haies
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3266>
Mellifère



Oiseaux

- ***Casmerodius albus*** [Ardeidae]
Grande Aigrette
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=11003432>



Amphibiens

- ***Rana temporaria*** Linnaeus [Ranidae]
Grenouille rousse
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12000136>



Insectes - Lépidoptères

- ***Gonepteryx rhamni*** Linnaeus []
Le Citron du Nerprun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14001659>
Les plantes hôtes de la chenille sont des Rhamnus, dont le Nerprun purgatif sur calcaire et l'Alaterne en région méditerranéenne, et des Frangula, dont la bourdaine sur terrain acide.