Sortie du mercredi 11 novembre 2026

Etat imprimé le 12 novembre 2026 par Benoît BOCK

Nomenclature: Base de Données Nomenclaturales de la Flore de France (B.BOCK & al.)


Nous avons été très surpris par la diversité mycologique dès le début de notre balade en forêt de Dreux avec l'observation de nombreuses espèces dont certaines rarement observées, comme le Marasme à odeur d'ail, la Russule à odeur de topinambour,…. Nous n'avons par contre pas trouvé l'Hygrophore russule, peut-être pas sorti cette année. Certains sont rentrés avec des paniers de bolets baies agrémentés de quelques trompettes cendrées et de chanterelles. Moi j'ai mangé une belle golmote (= Amanite rougissante) bien cuite que Fanny a trouvée (photo ci-contre), et je suis toujours en bonne forme !



mercredi 11 novembre 2026

France - 28 : Sorel Moussel - Forêt de Dreux

avec : GALAND Christian, PETIT Alain, BIGOT Chantal, LALLEMENT Nicole, QUITARD Fanny, BILLARD Pascale, GUERZA Zineb, ESTREGUIL Philippe, MORICE Patrick & BOCK Benoît



Lichens - Champignons

- ***Agaricus sylvaticus*** Schaeff. [Agaricaceae]

  Agaric des forêts
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2204210

- ***Amanita citrina*** Pers. [Amanitaceae]

  Amanite citrine
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209223
  En forêts. Chapeau jaune citron clair (parfois blanche) avec présence de plaques de voile concolores ou plus brunes . Stipe à bulbe nettement marginé. Forte odeur, de pomme de terre crue. Spores globuleuses ou presque, 7,5-9,5 µm.

- ***Amanita citrina*** f. ***alba*** (Price) Quél. [Amanitaceae]

  Amanite citrine forme blanche
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209224
  Forme blanche, toujours avec une odeur de pomme de terre crue

- ***Amanita muscaria*** (L.: Fr.) Lamarck [Amanitaceae]

  Amanite tue-mouche
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209286
  Chapeau d'abord ovoïde puis convexe à étalé, généralement rouge à rouge orangé, de 8 à 20 cm, orné de nombreuses verrues ou flocons blancs provenant du voile général, souvent partiellement lessivés par la pluie. Lames libres, serrées, blanches à légèrement jaunâtres, spores blanches. Pied blanc, assez robuste (environ 10–20 cm), muni d'un large anneau blanc supérieur et se terminant à la base par un bulbe entouré de bourrelets ou plaques de volve. Chair blanche, de saveur douce, sans odeur très marquée.
  Toxique, parfois hallucinogène, contenant notamment muscimole et acide iboténique ; l'intoxication est rarement mortelle mais peut provoquer troubles neurologiques, confusion, agitation et nausées. A fait l'objet d'usages rituels ou chamaniques dans certaines cultures nord-asiatiques et alimente de nombreuses représentations symboliques (contes, iconographie du "champignon des sorcières")

- ***Amanita pantherina*** (DC.) Krombh. [Amanitaceae]

  Amanite panthère
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209303

- ***Amanita phalloides*** (Vaill. ex Fr.) Link [Amanitaceae]

  Amanite phalloïde
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209308
  Principal responsable des accidents mortels en France. Provoque une fois ingéré des hémorragies intracrâniennes et des septicémies voire un arrêt cardiaque jusqu'à deux semaines après l'ingestion.

- ***Amanita rubescens*** Pers. [Amanitaceae]

  Amanite rougissante
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209335
  Comestible à condition de la cuire à plus de 75°C pour détruire les hémolysines, substances toxiques qui détruisent les hématies. Organoleptiquement les avis sont partagés et son goût varierait selon les régions.

- ***Armillaria mellea*** (Vahl) Kummer [Tricholomataceae]

  Armillaire couleur de miel
  mel = miel
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208301
  Chapeau de couleur jaune miel à brun rougeâtre, de 1 à parfois 15 cm, parsemé de méchules plus foncées au centre. Pied long, robuste, souvent courbé, portant un anneau blanc ou jaune clair, très fibreux et coriace en vieillissant. Lames inégales, blanches à jaunâtres, légèrement décurrentes, parfois tachées de brun sur la fin. Odeur faible, parfois de savon ; saveur douce à légèrement amère.
  Lignicole très polymorphe, parasite et saprophyte, surtout connu pour sa capacité à causer la pourriture blanche sur une vaste gamme de plantes ligneuses (causant la mort d'arbres et de plantes, particulièrement destructeur en vergers et forêts). Produit des rhizomorphes (cordons mycéliens) pouvant parcourir de grandes distances sous terre et coloniser plusieurs hectares. Chapeaux comestibles à condition de les consommer très jeunes !

- ***Calocera viscosa*** (Pers.) Fr. [Dacrymycetaceae]

  Calocère visqueuse
  kalo = beau, keras = corne
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2210140
  Petit buisson peu ramifié et peu charnu, de 3-10 cm, très visqueux par temps humide puis sec et coriace, jaune à jaune orangé. Pied : non délimité. Chair : jaune, très coriace et élastique (difficile à déchirer !). Saveur douce, odeur faible.
  Spores : 8-12 × 3,5-4,5 µm, elliptiques, lisses et incolores. Basides typiquement avec 2 gros stérigmates qui leur donnent une allure de diapason. Hyphes non bouclées.
  La Calocère visqueuse se reconnaît facilement à sa belle couleur et à sa chair très coriace : par temps de pluie, la récolter tient du tour de force tant elle est visqueuse ! Certaines clavaires peuvent lui ressembler, mais leur chair est toujours fragile.

- ***Chlorociboria aeruginascens*** (Nyl.) Kanouse [Helotiaceae]

  Pézize turquoise
  chloro = vert, ciboria = coupe
  http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2201799
  Ascomycète à disque de 0,2-0,7 cm de diamètre, entièrement bleu-vert ou vert turquoise à pied très court. Chair : mince. Saveur et odeur sans particularités. Spores : 5-7 × 1-2 µm, fusoïdes étroites, lisses et incolores. Asques à sommet amyloïde.
  Mycelium imprégnant les bois d'un pigment vert turquoise, la xylindéine qui aurait été utilisé pour la marqueterie, une pratique appelée "bois d'elfe" ou "bois turquoise". Espèce la plus fréquente du genre.

■ ***Clitocybe nebularis*** (Batsch) P.Kumm. [Tricholomataceae]

Clitocybe nébuleux
clito = pente, cybe = tête
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208585
Chapeau large, convexe puis étalé (5 à 20 cm), gris pâle à gris-brun, souvent mamelonné, marge enroulée chez les jeunes sujets. Lames crème blanches, densément disposées et faiblement décurrentes. Pied trapu, blanc à grisâtre, fibreux, souvent épaissi à la base. Odeur forte, fruitée, parfois de farine ou amande amère ; chair blanche épaisse et immuable.
Traditionnellement réputé comestible dans certaines régions (Jura, Suisse, Espagne), mais désormais déconseillé : des troubles digestifs nombreux signalés (nausées, vomissements), surtout chez sujets sensibles (1 personne sur 10000 ne possède pas une enzyme nécessaire à sa digestion). Contient des substances bioactives comme la nébularine, étudiée pour ses propriétés antifongiques, antibiotiques et autres effets thérapeutiques potentiels.Peut accumuler des polluants, métaux lourds et synthétiser davantage de toxines sous certains climats ; existe possiblement des formes plus toxiques.

■ ***Clitopilus prunulus*** (Scop.) Kummer [Entolomataceae]

Meunier
https://www.google.fr/search?q=Clitopilus+prunulus+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c
Blanc à chaire cassante, lames rosés, pied non centré et odeur de farine mouillée

■ ***Collybia fusipes*** (Bull.) Quél. [Marasmiaceae]

Collybie à pied en fuseau
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2214950
Chapeau de 3 à 9 cm, hémisphérique puis étalé, bosselé ou mamelonné, brun-roux pâle à ochracé, souvent moucheté de tâches plus foncées, hygrophane (variable selon humidité). Lames espacées, épaisses, blanc-rosé puis envahies de rouille à la maturité. Pied très allongé, 8 à 14 cm, en fuseau, tordu et fortement strié longitudinalement, crème en haut, brun-roux ou noir vers la base, souvent radicant (prolongement en pointe dans le sol ou le bois). Chair ferme, blanche, peu putrescible, peu épaisse, à odeur discrète et saveur douce.
Capacité remarquable de survie en périodes de sécheresse : les sporophores paraissent secs mais "ressuscitent" après la pluie, phénomène rare dans les Agaricales. La chair est coriace, peu agréable et la consommation est déconseillée, bien que non toxique, mais la reviviscence favorise le développement bactérien

■ ***Coprinus picaceus*** (Bull.) Gray [Psathyrellaceae]

Coprin pie
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2207571
Chapeau de 3–7 cm, d'abord ovoïde comme un œuf, puis campanulé à conique, brun à brun noir recouvert d'un voile blanc qui se déchire en flocons irréguliers et persistants, dessinant une mosaïque noire et blanche. Lames très serrées, d'abord blanches, devenant rosées puis noires et se liquéfiant en encre (espèce nettement déliquescente), avec sporée noire. Pied long et fin, 10–25 cm, blanc, creux, finement floconneux, légèrement bulbeux à la base, sans anneau. Chair mince, blanchâtre, devenant grisâtre à brunâtre, à odeur lourde, bitumineuse ou désagréable.
Attention les spores peuvent être pathogènes pour l'Homme. Aucun intérêt culinaire.

■ ***Cortinarius elatior*** Fr. [Cortinariaceae]

Cortinaire élevé
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2205103

Cortinarius sp. [Cortinariaceae]

Cortinaire
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2204439
Chair filamenteuse. Chapeau et pied lisses, fibrilleux, feutrés, avec des mèches ou visqueux. Haut du pied avec présence de cortine, parfois très ténu. Sporée brun rouillé à spores verruqueuses. Cystides en général absentes, mais poils souvent bien différenciés sur l'arête des lames.
Cet énorme genre (sans doute plus de 2 000 espèces en Europe, dont beaucoup sont encore inconnues!), pose de très nombreux problèmes aux mycologues. L'identification de la majorité des espèces est très délicate et exige une très solide expérience. Encore plus avec les cortinaires qu'avec les autres genres de champignons, il est très important d'étudier des exemplaires en parfait état et à tous les stades de développement.

■ ***Cortinarius torvus*** (Fr.) Fr. [Cortinariaceae]

Cortinaire à pied tordu
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2206477

■ ***Craterellus cinereus*** (Pers.) Fr. [Cantharellaceae]

https://www.google.fr/search?q=Craterellus+cinereus+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c

■ ***Craterellus tubaeformis*** (Fr.) Quél. [Cantharellaceae]

Chanterelle en tube
https://www.google.fr/search?q=Craterellus+tubaeformis
Chapeau 2–7 cm, convexe puis rapidement en entonnoir, souvent percé au centre, brun à brun-fauve avec des nuances grisâtres, marge d'abord enroulée puis ondulée et lobée. Hyménium sans vraies lames : des plis épais, fourchus, plus ou moins décurrents, jaune grisâtre à gris argenté. Pied long, mince, flexueux, jaune vif à jaune ochracé, creux, souvent relié au chapeau par un canal central ; chair mince, élastique, à odeur légère, agréablement fruitée et saveur douce.
Excellent comestible, très apprécié séché ou en mélange avec d'autres chanterelles ; attention toutefois aux confusions possibles avec Leotia lubrica, gélatineuse et dépourvue de plis qui est toxique.

■ ***Galerina marginata*** (Batsch) Kühner [Cortinariaceae]

Galère marginée
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2206682
Mortel

■ ***Galerina marginata*** (Batsch) Kühner [Cortinariaceae]

Galère marginée
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2206682
Mortel

■ ***Gymnopus dryophilus*** (Bull.) Murrill [Marasmiaceae]

Dryophilus" signifie "amoureux du chêne", mais il est devenu ubiquiste
https://www.google.fr/search?q=Gymnopus+dryophilus
Chapeau convexe puis étalé, 2 à 6 cm, brun-roux à ochracé, souvent brillant, hygrophane, pâlissant à crème avec le temps. Lames blanches à crème, minces et serrées, faiblement adnées ou libres avec l'âge, marges peu dentelées. Pied élancé, souple et fibreux, 2 à 8 cm, élargi à la base, brun ou crème, dépourvu d'anneau serré. Chair mince, blanche, sans odeur distinctive ; saveur douce, parfois noisette. Trace de rhizomorphes blancs à la base du pied dans la litière.
Signalé comme comestible dans certains guides, mais beaucoup d'auteurs le déconseillent : il peut provoquer des troubles digestifs et la chair est très mince et peu intéressante.

Hebeloma sp. [Hymenogasteraceae]

Hébélome
https://www.google.fr/search?q=Hebeloma+sp.+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c

■ ***Hygrophoropsis aurantiaca*** (Wulfen) R.Maire [Hygrophoropsidaceae]

Fausse girolle
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209853
Chapeau 3–8 cm, d'abord convexe puis étalé et souvent un peu en entonnoir, jaune orangé à orangé vif, plus foncé au centre, marge mince et longtemps enroulée. Lamelles vraies, minces mais nombreuses, très décurrentes, fourchues et ramifiées, jaune pâle à orange vif, facilement séparables du chapeau (au contraire des plis des vraies chanterelles). Pied mince, souvent un peu plus foncé que le chapeau, plein puis plus ou moins creux, de consistance molle, chair orangé pâle, flasque, à odeur faible et saveur un peu amère ou insignifiante.
Longtemps donnée comme comestible médiocre, elle est aujourd'hui plutôt classée comme indigeste ou légèrement toxique en raison d'intoxications rapportées ; la prudence conduit à déconseiller sa consommation et à ne pas la confondre avec les vraies girolles (Cantharellus cibarius)

■ ***Hymenopellis radicata*** (Relhan) R.H.Petersen [Physalacriaceae]

Collybie radicante
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2215614

■ ***Hypholoma fasciculare*** (Huds.) P.Kumm. [Strophariaceae]

Hypholome en touffes
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208137
Chapeau 3 à 7 cm, hémisphérique puis convexe et enfin étalé, jaune soufre à brun orangé au centre. Lames très serrées, d'abord jaune vif, puis jaune verdâtre à gris olive, foncant à maturité par les spores brun-noir ; caractéristique essentielle pour la reconnaissance.Pied élancé, fibreux, souvent torsadé ou courbé, jaune à brun roux vers la base, sans anneau persistant, parfois un léger voile fugace chez les jeunes exemplaires. Chair jaune, mince, élastique, à odeur faible ou nulle et saveur très amère, ce qui le rend impropre à la consommation. Pousse en bouquets denses, pieds soudés à la base
Toxicité certaine et bien documentée : ingestion provoque des troubles digestifs sévères (diarrhées, vomissements, douleurs abdominales), mais difficilement mangeable tellement il est amer !

■ ***Imleria badia*** (Fr.) Vizzini [Boletaceae]

Bolet bai
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209773
Chapeau brun rouge à brun foncé, lisse, largement convexe, de 5 à 15cm de diamètre ; couleur caractéristique "baie" qui lui donne son nom. Pied cylindrique, brun-roux strié, de largeur variable (1 à 4cm), 4 à 12 cm de haut, sans anneau. Pores et tubes jaune à jaune-verdâtre, bleuissant nettement à la pression, mais chair très faiblement bleuissante à la coupe. Chair blanche, ferme ; odeur douce et saveur agréable.
Excellent comestible, souvent comparé au cèpe de Bordeaux, moins sujet aux attaques d'insectes mais accumulateur réputé de métaux lourds notamment le cesium 137

■ ***Infundibulicybe gibba*** (Pers.) Harmaja [Tricholomataceae]

Clitocybe en entonnoir
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208432
Champignon de 5 à 10 cm, à lames très décurrentes, à chapeau de couleur crême, à chaire peu épaisse, et à sommet ombiliqué. Pousse sous feuillus ou sous conifères.

■ ***Inocybe geophylla*** var. ***violacea*** (Patouillard) Sacc. [Inocybaceae]

https://www.google.fr/search?q=Inocybe+geophylla+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c

■ ***Laccaria laccata*** (Scop.) Cooke [Hydnangiaceae]

Laccaire laqué
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211088
Chapeau généralement 2–6 cm, convexe puis s'aplatissant, parfois un peu ombiliqué ou irrégulier, hygrophane (brun-roux, orangé ou rosé à l'humide, devenant très pâle à presque blanchâtre en séchant), à surface lisse à fibrilleuse. Lames assez épaisses et espacées, souvent intercalées de lamelles plus courtes, de couleur proche de celle du chapeau chez les jeunes exemplaires puis pâlissant, prenant une teinte rosée ou crème blanchâtre sous l'effet de la sporulation blanche. Pied long, mince, souvent torsadé ou un peu comprimé, de couleur similaire au chapeau, fibreux et coriace, devenant creux avec l'âge. Chair mince, de même teinte que la surface, sans odeur ni saveur marquées.
Classiquement indiqué comme comestible mais de faible valeur, et surtout très trompeur en raison de sa variabilité et de la ressemblance avec d'autres petits champignons à lames claires ; la prudence conduit souvent à ne pas le récolter à des fins culinaires.

■ ***Lactarius chrysorrheus*** Fr. [Russulaceae]

Lactaire à lait doré

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213357

Chapeau de 4 à 10 cm, convexe puis déprimé, orangé pâle à rose, marqué de zones concentriques plus foncées ou de taches, parfois strié en marge. Lames blanchâtres puis crème ou orangé pâle, serrées et adnées. Pied épais, blanc à crème orangé, entier puis vite creux, souvent atténué à la base. Lait blanc abondant qui vire au jaune citron à l'air et sur le mouchoir (caractère clé pour différencier des autres lactaires). Chair blanche, odeur faible à fruitée, saveur très âcre et piquante, surtout en bouche.

Non comestible, toxicité digestive fréquente : ingestion provoque troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, douleurs), parfois sévères. Plusieurs lactaires à lait blanc existent, mais seul L. chrysorrheus a ce virage jaune intense et rapide sous chêne.

■ ***Lepista nuda*** (Bull.) Cooke [Tricholomataceae]

Pied-bleu

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208588

Chapeau convexe puis étalé ou déprimé, 5 à 15 cm, lisse, lilas à violet puis brunissant, marge enroulée. Lames serrées, échancrées, violet clair à lilas, devenant brunâtres en vieillissant, se détachant facilement du pied. Pied cylindre, robuste, lilas à violet blanchâtre au sommet, pruineux, strié de fibrilles blanchâtres. Chair épaisse, tendre, bleu-lilas, dégageant une odeur fruitée caractéristique et une saveur douce

Bon comestible dans la plupart des guides, goût et parfum appréciés ; se cuisine en poêlée, soupe, omelette, etc., mais comme beaucoup de champignons saprophytes, peut accumuler des métaux lourds ou polluants du sol, privilégier les récoltes loin des zones urbaines ou industrielles.

■ ***Lycoperdon perlatum*** Pers. [Lycoperdaceae]

Vesse-de-loup perlée

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211491

Carpophore piriforme à massuiforme, en général 2–5 cm de diamètre pour 3–9 cm de haut, avec une base un peu resserrée simulant un pied. Surface blanche puis crème à brunâtre, couverte de petites épines coniques ou « perles » facilement détachables; après leur chute, la surface montre de petites cicatrices ou un réseau très fin; intérieur (gleba) blanc et ferme chez les jeunes, devenant jaune□olive puis brun et poudreux avec la maturité, un pore s'ouvrant à l'apex pour l'émission des spores.

Comestible uniquement au stade jeune lorsque la chair interne est entièrement blanche et homogène; dès que la gleba jaunit ou verdit, le champignon n'est plus consommable. La principale confusion dangereuse est avec de jeunes amanites encore entièrement enfermées dans leur volve (aspect de petit œuf blanc) : il ne faut consommer que les vesses□de□loup coupées en deux montrant l'intérieur totalement blanc, sans ébauche de chapeau ni de lames.

■ ***Macrolepiota mastoidea*** (Fr.) Singer [Secotiaceae]

Lépiote mamelonnée

https://www.google.fr/search?q=Macrolepiota+mastoidea

■ ***Marasmius rotula*** (Scop.) Fr. [Marasmiaceae]

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2215125

Le Marasme petite-roue est vraiment facile à reconnaître, avec son chapeau pâle en forme de petit parachute (sans tâche noire) et son pied sombre greffé sur le bois.

■ ***Megacollybia platyphylla*** (Pers.) Kotl. & Pouzar [Mycenaceae]

Collybie à larges lames

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2215284

■ ***Morganella pyriformis*** (Schaeff.) Kreisel & D.Krüger [Agaricaceae]

Vesse-de-loup en poire

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2204243

■ ***Mycena galericulata*** (Scop.) S.F.Gray [Mycenaceae]

Mycène en casque

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2215383

Chapeau de l'ordre de 1,5 à 5 cm (parfois un peu plus), d'abord conique puis campanulé à convexe, souvent avec un petit mamelon, hygrophane, brun à brun gris au centre, plus pâle vers la marge, radialement strié par transparence. Lames blanchâtres à gris rosé, assez espacées, présentant de nombreuses arêtes interveinées; pied fin (souvent 4–8 cm), élastique, creux, blanchâtre vers le sommet, plus brun vers la base, avec mycélium blanc. Aurait une odeur de bougie !

Considéré sans intérêt culinaire, classé comme non recommandé voire à éviter, notamment en raison d'un risque de confusion avec d'autres petites mycènes parfois toxiques.

■ ***Mycena rosea*** Gramberg [Mycenaceae]

Mycène rose

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2215483

Chapeau petit (2 à 6 cm), conique puis étalé, rose vif à rose vineux plus foncé au centre, pâlissant vers la marge et souvent strié. Lames blanc rosé à adnées, assez larges et épaisses pour une mycène. Pied élancé, blanc rosé ou rose pâle, non renflé à la base, chair rosée sous la cuticule mais blanche à l'intérieur. Odeur typique de radis (raphanoïde) surtout en froissant le pied, saveur douce ou légèrement piquante.

Espèce toxique, contient de la muscarine : ingestion entraîne troubles digestifs et muscariniens (nausées, vomissements, diarrhée, sueurs, bradycardie), potentiellement dangereux chez les sujets fragiles.

■ ***Mycetinis alliaceus*** (Jacq.) Earle ex A.W.Wilson & Desjardin []

Marasme à odeur d'ail

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2215069

■ ***Panellus stipticus*** (Bull.) P.Karst. [Mycenaceae]

Panelle styptique

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2215555

Petits chapeaux latéraux de 0,5–3(4) cm, en éventail ou en rein, beige à brun ochracé, secs à finement veloutés, souvent superposés en touffes sur souches ou bûches. Lamelles serrées, pâles à ocre brun, descendant légèrement sur un très court pied excentré. Chair mince, tenace, de saveur d'abord douce puis très astringente, ce qui explique l'épithète « stipticus » et le classe comme non comestible. Champignon saprophyte, provoquant une pourriture blanche du bois de feuillus, visible presque toute l'année.

Lignivore et bioluminescent chez la variété américaine uniquement

■ ***Paralepista inversa*** (Scop.) Raithelh. []

Clitocybe inversé des feuillus

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208577

■ ***Paxillus involutus*** (Batsch) Fr. [Paxillaceae]

Paxille enroulé

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209890

Chapeau charnu, 4–15 cm, d'abord convexe puis rapidement déprimé en entonnoir, brun ocre à brun roux, parfois olivâtre, souvent un peu visqueux à l'humide, avec marge longtemps nettement enroulée. Lames très serrées, crème à jaune-ochracé puis brun rouille, nettement décurrentes et anastomosées (reliées par des veines), facilement détachables du chapeau en les grattant avec l'ongle (caractérisique des bolétales). Pied trapu, plutôt court, concolore ou un peu plus clair que le chapeau, se tachant de brun rouille au frottement ; chair épaisse, jaune pâle, brunissant à l'air, à odeur faible et saveur douce ou légèrement acide.

Toxique et parfois mortel, (notamment cru) en particulier à la suite d'ingestions répétées (réactions immuno□hémolytiques graves décrites), même s'il a été longtemps considéré comme comestible dans certaines régions.

■ ***Pholiota lenta*** (Pers.) Singer [Strophariaceae]

Pholiote gluante

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208196

■ ***Piptoporus betulinus*** (Bull.) P.Karst. [Fomitopsidaceae]

Polypore du Bouleau

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211796

Chapeau moyen à large (6 à 25 cm), d'abord ovoïde puis étalé, beige à brun clair, à surface lisse et marge épaisse, attaché latéralement au bois. Pores fins, blancs à crème, couvrant toute la face inférieure. Pied absent ou réduit à un court point d'attache latéral. Chair blanche, molle chez le jeune, vite coriace et subéreuse. Odeur acidulée discrète, saveur douce ou acidulée.

Provoque une pourriture brune du bois chez son hôte

■ ***Pluteus cervinus*** (J.C.Sch.?) Kummer [Pluteaceae]

Plutée couleur de cerf

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211643

Chapeau de 40-130(150) mm de diamètre, conique-campanulé au début puis convexe à aplani, souvent umboné et bosselé au centre. Surface lisse, soyeuse-mate à mate, non glabre, brun ocre foncé à brun rouge ou brun noir, le centre le plus souvent foncé à noir. Marge aiguë.
Lames blanches, devenant grises à rose carné, larges, à peine adnées ou libres, à arêtes finement frangées et blanches sous la loupe. Sporée ocre rougeâtre.
Stipe de 50-100(120) x 7-20 mm, cylindrique, légèrement épaissi à la base, plein, cassant, fibreux, cortiqué. Surface lisse à légèrement striée longitudinalement, ornée de fibrilles longitudinales gris noir sur fond blanchâtre. Sans anneau.
Chair blanche, mince. Odeur légèrement raphanoïde (de rave) ou de pomme de terre. Saveur douce à un peu amarescente.
Microscopie
Spores largement ellipsoïdales, lisses, gris rose, 6,1-8,6 x 4,2-6,4 µm. Basides cylindriques-ventrues, tétrasporiques, non bouclées. Cheilocystides clavées à piriformes, entremêlées de nombreuses cystides de type pleurocystide à parois épaisses, munies ou non de crochets. Pleurocystides à parois épaisses, prolongées à l'apex par (0-)3(-4) crochets. Cuticule formée d'hyphes couchées, parallèles, larges, à pigment brun clair, à cloisons non bouclées.

Sans intérêt culinaire

■ ***Ramaria stricta*** (Pers.) Quél. [Ramariaceae]

Ramaire stricte

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2210939

Fructification buissonnante, 4–10(15) cm de haut, composée de nombreux rameaux parallèles, droits, issus d'une base commune peu épaisse ; rameaux ocre-jaune à ocre brun, souvent brunissant au froissement, se terminant en petites pointes aiguës plutôt que ramifiées en massue. Chair élastique, coriace, blanchâtre à pâle, sans odeur marquée ou parfois avec une légère note anisée, mais à saveur amère ou désagréable.

À déconseiller toute consommation.

■ ***Rhodocollybia butyracea*** (Bull.) Lennox []

Collybie beurrée

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2214934

Chapeau de taille moyenne (4 à 9 cm), convex puis étalé avec un mamelon central souvent plus sombre, brun à brun ochracé, gras et lisse au toucher, marge pâlissante au sec. Lames blanchâtres à gris rosâtre, assez serrées, adnées, devenant rosées puis brunâtres avec le temps. Pied long (8 à 15 cm), cylindrique, blanchâtre à brun pâle, fibreux et creux, parfois couvert de fins cordonnets à la base. Chair mince, blanche à brun pâle, sans odeur marquée, saveur douce.

Se reconnait facilement avec son chapeau gras au toucher et son mamelon sombre central. Aucun intérêt culinaire marqué.

■ ***Rickenella fibula*** (Bull.) Raithelh. [Tricholomataceae]

Omphale épingle

http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208799

Minuscule champignon orangé inféodé aux mousses à chapeau de moins de 1 cm de diamètre (souvent 2 à 10 mm), d'abord convexe puis déprimé au centre, jusqu'à devenir ombiliqué ou infundibuliforme. Sa surface est lisse à très finement pruineuse à la loupe, hygrophane, translucide-striolée, de couleur orange à jaune orangé, parfois plus claire vers la marge. Lames assez espacées, pâles, crème à orangé pâle, nettement décurrentes le long du stipe, ce qui donne l'aspect « omphale ». Le stipe est long et très fin (jusqu'à 1,5–4,5 cm pour 0,5–2 mm d'épaisseur), fragile, creux à maturité, de couleur proche du chapeau, paraissant hérissé de poils (cystides émergentes).

Sans intérêt gastronomique, du fait de sa taille et de sa chair insignifiante

- ***Russula amoenolens*** Romagn. [Russulaceae]

Russule à odeur de topinambour
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213540

- ***Russula cavipes*** Britzelm. [Russulaceae]

Russule à pied creux
https://www.google.fr/search?q=Russula+cavipes+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c

- ***Russula chloroides*** (Krombh.) Bres. [Russulaceae]

Russule à lames glauques
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213607

- ***Russula lepida*** Fr. [Russulaceae]

Russule jolie
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213780
Sporée crème. Chapeau est épais et très ferme, convexe puis étalé et légèrement déprimé, de 4 à 12 cm, rouge vif à rouge carmin se décolorant parfois vers le jaunâtre, avec une cuticule mate, veloutée, non séparable, pouvant se crevasser en plaques laissant apparaître des zones blanchâtres. Les lames sont assez espacées, blanches à crème, parfois à arêtes rosées, et le pied, blanc lavé de rose à rouge par endroits, est typiquement dur et plein, ne s'écrasant pas entre les doigts. La chair blanche, très ferme, dégagerait une odeur fruitée à mentholée et une saveur douce mais mentholée, parfois légèrement amère.
Cassé comme non comestible en raison de sa saveur désagréable malgré l'absence de toxicité grave connue.

- ***Russula vesca*** Fr. [Russulaceae]

Russule comestible
https://www.google.fr/search?q=Russula+vesca+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c
Chapeau de 5–10 cm, d'abord convexe puis s'aplatissant, parfois légèrement déprimé au centre, de couleur vieux rose à brun rosé, souvent plus clair ou crème au centre, la cuticule ne va pas tout à fait jusqu'au bord, ce qui laisse dépasser l'extrémité des lames (« montre les dents »). Lames serrées, blanches à crème, dépassant un peu du bord du chapeau à maturité ; sporée blanche. Pied blanc, cassant, 4–10 cm, parfois un peu spongieux à l'intérieur et légèrement teinté de rose ou taché de brun à la base. Chair blanche, ferme mais cassante, brunissant parfois à la base du pied ou aux blessures, odeur faible ou douce, saveur douce avec un net parfum de noisette, jamais âcre.
Bon comestible, apprécié pour sa chair tendre et son goût de noisette ; se prête bien aux cuissons rapides (poêlée, sautée) et peut se consommer seule ou en mélange avec d'autres espèces douces, toujours cuite

- ***Scleroderma citrinum*** Pers. [Sclerodermataceae]

Scléroderme commun
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209923

- ***Sparassis brevipes*** Krombh. [Sparassidaceae]

Sparassis lamelleux
https://www.google.fr/search?q=Sparassis+brevipes+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c

- ***Stereum hirsutum*** (Willd.) Pers. [Stereaceae]

Stérée hirsute
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2212509
Carpophore en consoles ou en croûtes plus ou moins réfléchies, souvent imbriquées, de 0,5 à quelques cm, coriaces, persistant tout l'année sur le bois. Face supérieure zonée, brun orangé à brun verdâtre, nettement hirsute ou velue, surtout chez les jeunes exemplaires ; face inférieure (hyméniale) lisse, jaune à orangé vif puis brun orangé, ne portant pas de pores ni de lames.
Non comestible, parfois étudiée pour ses enzymes ligninolytiques et ses métabolites (intérêt en biotechnologie, biodégradation et éventuellement en bioremédiation).

- ***Stropharia aeruginosa*** (Curtis) Quél. [Strophariaceae]

Strophaire vert-de-gris
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2208269

- ***Trametes versicolor*** (L.) Lloyd [Polyporaceae]

Tramète versicolore
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2212387
Petits chapeaux en éventail ou en rosette, en général 2 à 8 cm de large, très minces, sans pied distinct, souvent en tuiles superposées sur le bois. Face supérieure finement veloutée, zonée de bandes concentriques de couleurs variables (blanc, crème, brun, roux, gris, parfois bleuâtres ou verdies par les algues); face inférieure blanche puis jaunissante, couverte de très petits pores ronds.
En 2011, une équipe de scientifiques du Queensland University of Technology ont découvert que ce champignon pouvait soigner le cancer de la prostate. Des tests sur des souris ont montré que la tumeur régressait de manière spectaculaire. De plus, aucun effet secondaire ne s'est manifesté. Considéré comme non comestible en tant que champignon de table, sa chair étant coriace et fibreuse.

- ***Tremella aurantia*** Schw. [Tremellaceae]

Trémelle orangée
TREME = trembler ; AURANTI = orange
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2214423
Gélatineux de couleur jaune à jaune orangé vif, souvent en forme de petite "cervelle" plissée de 2 à 10 cm de diamètre, à consistance molle et tremblotante.
Considérée comme sans intérêt culinaire, sans toxicité sérieuse connue mais quasiment insipide.

- ***Xerocomellus chrysenteron*** (Bull.) Šutara []

Bolet à chaire jaune
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209775
Chapeau, généralement de 3 à 8 cm, brun gris à brun olivâtre, sec et finement velouté, se gerce vite en fines craquelures laissant apparaître par endroits une chair sous-jacente rosée à rougeâtre, caractère typique de l'espèce. Les pores et tubes sont d'abord jaunes puis olivâtres, bleuissant peu ou pas au toucher, et le pied, élancé, jaunâtre, est nettement strié ou tacheté de rouge vineux surtout au milieu, avec une chair jaunâtre ne bleuissant que très faiblement à la coupe.
Comestible de qualité moyenne seulement (chair mince, rapidement vermoulue), ce bolet reste toutefois consommable après bonne cuisson, à condition de l'identifier avec certitude et de trier les vieux spécimens ramollis ou altérés.

- ***Xylaria hypoxylon*** (L.ex Fr.) Greville [Xylariaceae]

Xylaire du bois
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2204072
Avec ses petits rameaux noirs à extrémités blanches aplaties comme les bois d'un minuscule élan. Pas de vrai chapeau ni de pied distinguable mais stroma dressé, parfois fourchu, évoquant de petits bois de cervidés. Chair blanche, dure à coriace, sans odeur ni saveur. Sa détermination ne prête guère à confusion.
Lors de la phase asexuée, les fructifications sont saupoudrées de blanc à l'extrémité, des conidies, qui sont dispersées pour assurer la multiplication végétative du champignon. Quand le champignon atteint la maturité sexuelle, l'ensemble du stroma devient noir, et les spores sexuées (ascospores) sont produites dans des périthèces immergés dans la masse du stroma

Angiospermes Dicotylédones

- ***Betonica officinalis*** L. [Lamiaceae]

Bétoine officinale au sens large
https://www.google.fr/search?q=Betonica+officinalis+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

- ***Sorbus domestica*** L. [Rosaceae]

Cormier domestique
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4990

- ***Succisa pratensis*** Moench [Caprifoliaceae]

Succise des prés
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2624

Amphibiens

- ***Bufo bufo*** (Linnaeus) [Bufonidae]

Crapaud commun
http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12000096